

Programme Québécois de Dépistage du Cancer du Sein

TABLEAU DE BORD
Indicateurs de performance du PQDCS
En date du 27 janvier 2025

Faits saillants sur les nouveaux résultats :

- Le **taux de détection des cancers infiltrants et *in situ*** est de 6,9 cancers détectés par 1 000 mammographies (6,9 ‰) en 2023*.
- La **valeur prédictive positive du dépistage** pour l'ensemble des mammographies est de 6,5 % en 2023.
- Le **taux de cancers d'intervalle infiltrants dans les 12 mois suivant un dépistage négatif** a atteint son point le plus bas avec une valeur de 6,2/10 000 pour les dépistages réalisés en 2022. On observe également une baisse des cancers d'intervalle dans les 13 à 24 mois suivant un épisode de dépistage négatif avec une mesure de 11,2/10 000 pour les dépistages réalisés en 2021.
- Les proportions de femmes ayant un **délai diagnostique respectant les cibles** ont diminué en 2023*. On observe que 64,7 % des femmes dépistées en 2023 ont obtenu un diagnostic dans un délai de 5 semaines ou moins lorsqu'aucune biopsie n'a été nécessaire et que 48,4% ont obtenu un diagnostic dans un délai de 7 semaines ou moins lorsqu'une biopsie était nécessaire.
- L'**intervalle diagnostique médian, qui est lié à l'indicateur précédent**, était de 4,1 semaines pour l'ensemble des mammographies anormales en 2023 et de 5,4 semaines pour les diagnostics malins.

* La mesure de cet indicateur inclut les données concernant les mammographies réalisées jusqu'au 30 septembre 2023.

Tableau de bord - Indicateurs de performance du PQDCS (27 janvier 2025)

Indicateur	Cible ¹	Année du dépistage											Résumé	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 ans	10 ans
Nombre de mammographies		340 101	340 698	349 578	362 846	347 387	363 769	349 063	249 544	365 912	324 259	351 930	1 640 708	3 404 986
- mammographies initiales		59 377	54 989	54 584	56 845	50 604	51 452	50 572	28 402	51 586	50 309	51 172	232 041	500 515
- mammographies subséquentes		280 724	285 709	294 994	306 001	296 783	312 317	298 491	221 142	314 326	273 950	300 758	1 408 667	2 904 471
Taux de couverture (%)		75,4	74,4	74,0	74,0	73,7	72,4	72,4	66,6	66,4	69,3	70,2		
Taux de participation (%)	≥ 70 %	64,8	64,2	64,3	64,7	65,1	65,1	65,6	59,7	60,0	63,4	64,3		
Taux de fidélisation (%)		79,5	81,0	80,4	80,0	78,1	57,3	68,3	77,7				71,9	75,8
- mammographies initiales	≥ 75 %	65,3	65,7	64,8	64,5	60,0	39,6	51,3	57,8				54,5	60,4
- mammographies subséquentes	≥ 90 %	82,7	84,2	83,5	83,2	81,5	60,5	71,5	80,5				75,0	78,9
Taux de référence (%)		11,9	11,6	11,3	11,6	10,8	10,7	10,8	10,4	11,4	10,8	10,5	10,8	11,0
- mammographies initiales	< 7 %	21,1	21,2	21,3	22,8	22,0	22,5	22,8	21,9	23,6	22,3	22,4	22,7	22,3
- mammographies subséquentes	< 5 %	9,9	9,7	9,4	9,5	8,9	8,8	8,8	9,0	9,3	8,7	8,5	8,9	9,1
Taux de détection des cancers infiltrants (‰)		5,0	5,1	5,1	5,2	5,1	4,9	5,1	5,2	5,2	5,9	5,6*	5,4*	5,2*
- mammographies initiales	> 5,0 ‰	5,2	5,7	5,7	6,1	6,5	6,1	6,6	6,8	6,4	7,5	7,2*	6,9*	6,4*
- mammographies subséquentes	> 3,0 ‰	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9	4,7	4,8	5,0	5,0	5,6	5,3*	5,2*	5,0*
Taux de détection des cancers infiltrants <i>et in situ</i> (‰)		6,3	6,4	6,5	6,5	6,6	6,4	6,5	6,6	6,8	7,4	6,9*	6,8*	6,7*
- mammographies initiales	> 5,0 ‰	6,8	7,7	7,5	8,0	8,6	8,3	8,7	9,0	8,6	9,6	9,1*	9,0*	8,5*
- mammographies subséquentes	> 3,5 ‰	6,2	6,2	6,3	6,3	6,2	6,1	6,1	6,3	6,4	7,0	6,5*	6,5*	6,3*
Valeur prédictive positive du dépistage (%)		5,3	5,6	5,8	5,6	6,1	6,0	6,0	6,3	5,9	6,9	6,5*	6,3*	6,0*
- mammographies initiales	≥ 5,0 %	3,2	3,6	3,5	3,5	3,9	3,7	3,8	4,1	3,7	4,3	4,1*	4,0*	3,8*
- mammographies subséquentes	≥ 6,0 %	6,2	6,4	6,7	6,6	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9	8,1	7,7*	7,3*	7,0*
Taux de biopsies chirurgicales bénignes (‰)		1,3	1,3	1,4	1,3	1,2	1,2	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0*	1,0*	1,2*
- mammographies initiales	< 5,0 ‰	2,3	2,3	2,7	2,7	2,2	2,9	2,2	2,2	2,5	2,0	2,2*	2,2*	2,4*
- mammographies subséquentes	< 3,5 ‰	1,1	1,1	1,2	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	0,7	0,9	0,7*	0,8*	0,9*
Cancers détectés de type <i>in situ</i> (%)		20,2	20,9	20,4	19,6	21,6	21,8	19,6	18,1	18,9	15,7		19,1*	19,8*
- mammographies initiales	> 10 %	22,6	24,8	22,5	21,6	23,0	24,9	21,4	21,3	22,0	17,4		21,6*	22,3*
- mammographies subséquentes		19,6	20,0	19,9	19,1	21,2	21,1	19,2	17,5	18,3	15,3		18,5*	19,3*
Cancers détectés infiltrants de petites tailles (≤1 cm)(%)	> 30 %	37,3	41,0	35,5	38,1	39,0							38,1	37,2
Cancers détectés infiltrants sans envahissement ganglionnaire (%)	> 70 %	74,4	77,3	76,0	78,0	78,4							76,9	75,8
Taux de cancers d'intervalle infiltrants (‰)														
- dans les 1 à 12 mois suivant un épisode de dépistage négatif	< 6,0 ‰	8,8	8,7	7,5	7,6	7,5	8,3	6,9	8,6	7,1	6,2		7,4	7,7
- dans les 13 à 24 mois suivant un épisode de dépistage négatif	< 12,0 ‰	11,7	12,6	11,2	11,4	12,4	10,9	12,3	11,6	11,2			11,7	11,7
Sensibilité du dépistage (%)		85,9	86,2	87,8	87,9	87,8	86,4	88,7	86,6	88,7	91,0		88,4	87,7
Spécificité du dépistage (%)		88,7	89,0	89,3	89,0	89,8	89,9	89,8	90,2	89,3	89,9		89,8	89,5
Délais diagnostiques respectant la cible (%)														
- sans biopsie, 5 semaines ou moins	≥ 90 %	67,8	68,5	71,3	68,8	68,8	70,6	71,7	78,4	75,0	72,2	64,7*	72,6*	71,0*
- avec biopsie, 7 semaines ou moins	≥ 90 %	38,9	41,7	43,6	45,7	47,4	50,4	47,6	53,7	53,1	50,2	48,4*	50,5*	48,0*
Intervalle diagnostique médian (semaine)		4,0	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	3,3	3,6	3,9	4,1*	3,9*	3,9*
- bénin		4,0	3,9	3,7	3,9	4,0	3,9	3,9	3,3	3,6	3,7	4,1*	3,7*	3,9*
- cancer		6,1	6,0	5,9	5,6	5,9	5,6	5,7	5,0	5,1	5,1	5,4*	5,3*	5,6*

¹ Cibles du cadre de référence, sinon (en italique) cibles canadiennes.

* Les données utilisées pour le calcul de cet indicateur étaient disponibles jusqu'au 30 septembre 2023.

 : La variabilité associée à la mesure de cet indicateur est importante ou très importante. Vous pouvez consulter les Analyses Statutaires pour obtenir son intervalle de confiance.

Nouveaux résultats en violet.