


# ALGORITHMES CLINIQUES POUR LA PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS À *N. GONORRHOEAE*

Extrait du guide de pratique [Prise en charge clinique des tests d'amplification des acides nucléiques pharyngés positifs pour \*Neisseria gonorrhoeae\*](#)

**Définitions** **Prélèvement initial**: prélèvement effectué lors de la visite initiale ; **Test de contrôle**: prélèvement effectué pour vérifier l'efficacité du traitement; **Résultat préliminaire**: résultat émis par le laboratoire du réseau, avant l'envoi au LSPQ; **Résultat de confirmation**: résultat du TAAN effectué au LSPQ à partir du même prélèvement que celui associé au résultat préliminaire.

**Prélèvement initial : algorithme de prise en charge de la personne atteinte lorsque le résultat préliminaire est positif et que l'échantillon est acheminé au LSPQ pour confirmation**  
(pour la prise en charge d'un test de contrôle positif, consulter l'algorithme spécifique)



\* Cette situation survient habituellement dans un contexte de dépistage selon les facteurs de risque (personne asymptomatique)

\*\* Cette situation peut survenir dans les contextes suivants :

1. Lors d'un syndrome clinique (par exemple, cervicite, urétrite ou rectite);
2. Suite à la notification par un partenaire infecté;
3. Lorsqu'un dépistage initial positif avait été limité aux sites anogénitaux et, qu'au moment de traiter, un prélèvement pharyngé est effectué.

**Définitions** **Prélèvement initial**: prélèvement effectué lors de la visite initiale ; **Test de contrôle**: prélèvement effectué pour vérifier l'efficacité du traitement; **Résultat préliminaire**: résultat émis par le laboratoire du réseau, avant l'envoi au LSPQ; **Résultat de confirmation**: résultat du TAAN effectué au LSPQ à partir du même prélèvement que celui associé au résultat préliminaire.

## Prélèvement pour test de contrôle : algorithme de prise en charge lorsque le résultat préliminaire est positif et que l'échantillon est acheminé au LSPQ pour confirmation

Ces recommandations tiennent pour acquis que :

1. Le prélèvement pour TAAN a été réalisé au moins deux semaines après la fin du traitement.
2. Le test de contrôle par culture était négatif ou le test de contrôle n'incluait pas de culture pharyngée.
3. La personne est informée qu'un test de confirmation est à venir et un counseling approprié est effectué.

