


Analyse de drogues dans l'urine et réduction des méfaits – Résultats 2023

Projet suprarégional d'analyse de drogues dans l'urine de personnes qui consomment au Québec

Collecte septembre-octobre 2023

1140 participant(e)s – 59 organismes – 11 régions



Des substances consommées sans le savoir



36 % des participant(e)s chez qui on a détecté du **fentanyl** l'ont consommé **sans le savoir**


Les surdoses sont fréquentes



17 % des participant(e)s ont vécu une **surdose** dans les 6 derniers mois

Il y a **autant** de surdoses d'opioïdes que de surdoses de stimulants

Substances détectées dans l'urine des participant(e)s




Autres substances d'intérêt

- Analogues du fentanyl..... 5 %
- Benzodiazépines non-autorisées au Canada 4 %
- Nitazènes 2 %
- Xylazine..... 1 %
- Héroïne..... 1 %



La consommation de **stimulants** (*uppers*) est beaucoup plus répandue que celle de **dépresseurs** (*downers*)



Pour réduire les risques de décès par surdose

Consomme en présence de quelqu'un

Seulement **4/10** consomment souvent ou toujours en présence de quelqu'un



La présence d'autres personnes diminue le risque de décès en cas de surdose

Procure-toi une trousse de naloxone

Seulement **42 %** ont une trousse de naloxone



29 % n'en ont pas mais voudraient en avoir une

29 % n'en veulent pas



La naloxone renverse temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes

Appelle le 911 si tu es témoin d'une surdose

Seulement **6/10** ont appelé le 911 lorsqu'ils ont été témoins d'une surdose



La Loi sur les bons samaritains protège les témoins de surdose qui appellent le 911

Consulte ton intervenant pour connaître les résultats de ta région ou de ton organisme

Québec

Un projet de l'Institut national de santé publique du Québec et de la Direction de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal