

# Surveillance des troubles anxio-dépressifs au Québec : prévalence, mortalité et profil d'utilisation des services

**Louis Rochette** 

5 Novembre 2015



Secteur surveillance des troubles mentaux et des maladies neurologiques







Titre et date de la conférence : Nom du conférencier :Louis Rochette

La surveillance des troubles mentaux à partir des données du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ) – 5 novembre 2015

### FORMULAIRE DE DIVULGATION DE CONFLITS D'INTÉRÊT POTENTIELS

#### Déclaration de la personne ressource

J'ai actuellement, ou j'ai eu au cours des deux dernières années, une affiliation ou des intérêts financiers ou intérêts de tout ordre avec une société commerciale ou je reçois une rémunération ou des redevances ou des octrois de recherche d'une société commerciale :

non 💢

#### Si oui, précisez:

	Type d'affiliation:	Nom de la compagnie :	Période :
-		-	-
-		-	-
_		_	_

# Définition de cas

- •Pour être considéré comme étant atteint de la maladie, un individu âgé de un an et plus devait avoir reçu au cours de l'année financière:
  - Un diagnostic de troubles anxio-dépressifs au fichier des services médicaux

#### OU

- Un diagnostic de troubles anxio-dépressifs au fichier des hospitalisations
- Codes Cim-9: 296, 300, 311. Codes Cim-10: F30-F48
   F68

# Indicateurs retenus

### Prévalence annuelle:

- Personnes ayant répondu à la définition de cas au cours de l'année
- Permet de mieux représenter le fardeau sur les services de santé



# Résultats

centre d'expertise et de référence

actieuses promotion de sa
santé environnementale

toxicologie prévention des maladies chroniques

santé au travail

developpement des personnes et des communautés

www.inspq.qc.ca

la l'état de santé de la population

microbiologie


sécurité et prévention des traumatismes

recherche

santé au tra Institut national


de santé publique

Prévalence annuelle standardisée selon l'âge des troubles anxio-dépressifs diagnostiqués selon le sexe et au total, Québec, 2000-2001 à 2013-2014






Prévalence annuelle des troubles anxio-dépressifs diagnostiqués selon le sexe et l'âge, Québec 2000-2001 et 2013-2014






Prévalence annuelle standardisée des troubles anxiodépressifs diagnostiqués selon la région, Québec, 2013-2014



# Espérance de vie à 20 ans selon l'atteinte de troubles mentaux et selon le sexe, basée sur les taux de mortalité de 2001-2002 à 2010-2011


Nombre moyen d'années restant à vivre au-delà de l'âge de 20 ans pour les	Espérance de vie à 20 ans (années)		promotion de sali
individus soumis aux conditions de mortalité de cas traités et actifs	Hommes	Femmes	maladies chroniques
Québec (population générale)	59	64	pact des politiques pub
Troubles mentaux	51	59	et des communautés cherche
Troubles anxio-dépressifs	55	65	
Troubles schizophréniques	48	54	impact des province toxicologie
Troubles de la personnalité du groupe B	46	55	microbiologie pror des traumatismes
			canté au tr

Proportion (%) des causes de décès des personnes atteintes ou non de troubles anxio-dépressifs, Québec, 2000-2009






Rapport de taux de mortalité standardisés selon l'âge des personnes avec troubles anxio-dépressifs selon la cause de décès et le sexe, Québec, 2000-2009






Profil d'utilisation des services de santé mentale chez les personnes atteintes de TP du groupe B, troubles anxio-dépressifs et schizophrénie,

Québec, 2011-2012






# Profil hiérarchique d'utilisation des services en santé mentale (TP du groupe B, troubles anxio-dépressifs et schizophrénie), Québec, 2011-2012



Profil hiérarchique d'utilisation des services de santé mentale chez les personnes atteintes de troubles anxio-dépressifs selon la région sociosanitaire, Québec, 2013-2014



de santé publique