

# Décès attribuables à une intoxication aux opioïdes au Québec

## 2016


Les données suivantes portent sur les décès attribuables à une intoxication aux opioïdes au Québec pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Le nombre de décès rapportés ci-dessous est sous-estimé puisque 8 % des investigations des causes de décès par les coroners pour l'année 2016 étaient encore en cours au moment de l'obtention des données. Il est probable que le nombre de décès rapportés soit légèrement plus élevé lorsque les causes de décès auront été déterminées au terme de ces investigations. Les données associées aux décès sont donc aussi appelées à changer légèrement lors des mises à jour à venir.


Source de données : Bureau du coroner.

Mise à jour : 28 février 2019

### Décès attribuables à une intoxication aux opioïdes au Québec, 2016




### Décès attribuables à une intoxication aux opioïdes au Québec selon le groupe d'âge et le mode de décès, 2016




Le nombre de décès le plus élevé était observé dans le groupe d'âge des 40 à 49 ans et dans celui des 50 à 59 ans.

### Décès attribuables à une intoxication aux opioïdes au Québec selon le sexe et le mode de décès, 2016




### Présence de fentanyl ou de ses analogues\* dans les cas de décès attribuables aux opioïdes au Québec, 2016




\* Les analogues du fentanyl sont des substances appartenant à la même famille chimique que le fentanyl (p. ex., carfentanyl, acétyl-fentanyl).

### Présence d'autres médicaments ou drogues dans les cas de décès attribuables aux opioïdes au Québec selon le mode de décès, 2016



### Décès attribuables à une intoxication aux opioïdes au Québec selon le mode de décès par trimestre, 2016



Parmi l'ensemble des décès attribuables à une intoxication aux opioïdes, 67 % des décès étaient non intentionnels (166 sur 248), 29 % étaient intentionnels (71 sur 248) et 4 % (11 sur 248) étaient de mode indéterminé. Les décès non-intentionnels étaient les plus fréquents, et ce pour chacun des trimestres.

	janvier-mars	avril-juin	juillet-septembre	octobre-décembre	Total
Non-intentionnels et absence de fentanyl ou de ses analogues	35	33	32	28	128
Intentionnels et absence de fentanyl ou de ses analogues	13	13	16	19	66
Indéterminés et absence de fentanyl ou de ses analogues	0	3	5	1	9
Non-intentionnels et présence de fentanyl ou de ses analogues	13	10	10	5	38
Intentionnels et présence de fentanyl ou de ses analogues	2	2	3	3	10
Indéterminés et présence de fentanyl ou de ses analogues	0	1	1	0	2

Le fentanyl ou ses analogues étaient présents pour 23 % des décès non intentionnels (38 sur 166), 14 % des décès intentionnels (10 sur 71) et 18 % (2 sur 11) des décès dont le mode était indéterminé.