

Syphilis

Depuis notre dernière rencontre, un professionnel de la santé m'a dit que j'ai la syphilis. C'est une infection transmissible sexuellement. Tu as peut-être cette infection toi aussi.

Tu peux avoir cette infection même si tu n'as pas de symptômes. C'est important que tu consultes rapidement un médecin ou une infirmière pour passer un test de dépistage et, si nécessaire, recevoir un traitement. Le traitement est simple et gratuit.

Non traitée, la syphilis peut causer des dommages importants au cœur, au cerveau, aux os et au foie. Les femmes enceintes qui ont la syphilis peuvent avorter spontanément, accoucher prématurément, ou accoucher d'un bébé mort-né ou ayant des malformations. La syphilis augmente le risque d'attraper ou de transmettre le VIH.

En attendant de savoir si tu as la syphilis ou de recevoir un traitement, évite d'avoir des relations sexuelles. Si tu ne peux pas attendre, utilise un condom pour toute relation sexuelle vaginale ou anale. Pour les relations orales, utilise un condom ou un carré de latex. De cette façon, tu éviteras de transmettre l'infection.

Pour savoir où aller pour passer un test de dépistage et te faire traiter, tu peux consulter :

- › **le service Info-Santé, en téléphonant au 811.**

Pour avoir des renseignements supplémentaires, tu peux consulter :

- › sante.gouv.qc.ca (site grand public) ;
- › itss.gouv.qc.ca (site jeunes).

Je trouve important de t'annoncer cette nouvelle, car ta santé me tient à cœur.

Fiche d'information sur la syphilis

PRÉVENTION	MODES DE TRANSMISSION	SYMPTÔMES	DÉPISTAGE	TRAITEMENT
<p>Le condom est la meilleure protection contre les infections transmissibles sexuellement.</p> <p>L'utilisation du condom lors du partage de jouets sexuels diminue le risque de transmission (changer de condom entre chaque partenaire).</p> <p>Le carré de latex (découpé dans un gant ou dans un condom de latex non lubrifié) diminue le risque de transmission pendant les relations orales (contact de la bouche avec la vulve ou l'anus).</p>	<p>Transmission sexuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> > contact du pénis avec la vulve, le vagin ou l'anus avec ou sans éjaculation ; > contact de la bouche avec le pénis, la vulve, le vagin ou l'anus; > frottement des organes génitaux ; > partage de jouets sexuels ; > contact direct avec les lésions d'une personne infectée. <p>Transmission d'une mère infectée à son bébé pendant la grossesse ou l'accouchement.</p> <p>Transmission sanguine :</p> <ul style="list-style-type: none"> > contact avec le sang d'une personne infectée (rare). 	<p>Parfois, pas de symptômes. Lorsqu'ils sont présents, les symptômes varient selon le stade de l'infection.</p> <p>Stade 1</p> <p>Les symptômes peuvent apparaître jusqu'à 3 mois après la transmission.</p> <p>Ces symptômes peuvent être :</p> <ul style="list-style-type: none"> > une ou plusieurs lésions (ulcères) non douloureuses au pénis, à la vulve, au vagin, à l'anus, à la bouche ou à la gorge. <p>Ces lésions disparaissent sans traitement après quelques semaines. Toutefois, la syphilis est toujours présente dans le corps.</p> <p>Stade 2</p> <p>Les symptômes apparaissent jusqu'à six mois après la transmission.</p> <p>Ces symptômes peuvent être :</p> <ul style="list-style-type: none"> > des symptômes semblables à ceux de la grippe : fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs aux muscles, enflure des ganglions (bosses), > des rougeurs ou des boutons sur la paume des mains, la plante des pieds ou ailleurs sur le corps. <p>Ces symptômes disparaissent sans traitement après plusieurs semaines. Toutefois, la syphilis est toujours présente dans le corps.</p>	<p>Prise de sang</p>	<p>Les antibiotiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> > guérissent la syphilis et évitent des complications ; > sont gratuits pour les personnes infectées et leurs partenaires, qui doivent avoir une prescription et présenter leur carte d'assurance maladie à la pharmacie.
<p>→ En attendant d'avoir la confirmation que tu n'as pas la syphilis ou de recevoir un traitement préventif, évite d'avoir des relations sexuelles ou utilise un condom pour toute relation sexuelle vaginale ou anale. Pour les relations orales, utilise un condom ou un carré de latex.</p>	<p>→ On peut attraper la syphilis plus d'une fois.</p>	<p>Stade de latence</p> <p>Aucun symptôme. Toutefois, la syphilis est toujours présente dans le corps. Ce stade peut durer plusieurs années.</p>	<p>→ Tu peux avoir la syphilis et la transmettre même si tu n'as pas de symptômes</p>	<p>→ Parce que tu as été en contact avec une personne qui a la syphilis, tu dois consulter rapidement un médecin ou une infirmière pour passer un test de dépistage et, dans certains cas, te faire traiter.</p>