




QUI OFFRE LE SERVICE DE DÉPISTAGE ET DE PRÉVENTION DES ITSS?

Il existe près de chez vous, dans un centre de santé et de services sociaux, un service intégré de dépistage et de prévention des ITSS (SIDEP). Celui-ci offre des tests de dépistage ainsi que la consultation avant et après les tests, la vaccination, l'orientation vers d'autres ressources ainsi que du soutien. Ces services de santé sont offerts au même endroit par des professionnels de la santé, en toute confidentialité et dans le respect de la personne qui consulte et de ses besoins.



OUVREZ LES YEUX



AU MOINS UNE PERSONNE INFECTÉE SUR TROIS IGNORE SA SITUATION, PASSEZ UN TEST DE DÉPISTAGE DES ITSS ET DU VIH.

- Appeler Info-Santé en composant le 8-1-1, pour connaître les endroits où passer un test de dépistage;
- consulter un médecin.

www.sante.gouv.qc.ca



OUVREZ LES YEUX



LE DÉPISTAGE DES ITSS ET DU VIH, ÇA CONCERNE TOUT LE MONDE !

Santé
et Services sociaux
Québec 

UN
QUÉBEC
POUR TOUS

Québec 



OUVREZ LES YEUX

Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) peuvent être présentes sans signes ou symptômes apparents, surtout chez une personne récemment infectée. Ainsi, les personnes atteintes peuvent transmettre une infection sans le savoir.

UN TEST DE DÉPISTAGE, CE N'EST PAS COMPLIQUÉ ET C'EST RAPIDE

Un échantillon d'urine suffit pour plusieurs des tests de dépistage d'une ITSS alors que, pour certains autres, une prise de sang sera nécessaire.



LES ITSS, C'EST QUOI ?

ON APPELLE AINSI

- La chlamydia, les condylomes, la gonorrhée, l'herpès génital, la lymphogranulomatose vénérienne, la syphilis le VIH ainsi que les hépatites A, B et C.

ELLES PEUVENT SE TRANSMETTRE :

- par une relation sexuelle – anale, vaginale ou orale – sans condom;
- par le contact direct ou indirect avec le sang d'une personne infectée;
- par le partage de matériel d'injection ou d'inhalation de drogues ou de stéroïdes;
- de la mère à son enfant pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement.

Ces infections et les complications qu'elles entraînent sont évitables et peuvent pour la plupart être traitées.



AVANT TOUT, IL FAUT PASSER UN TEST DE DÉPISTAGE!



LES RAISONS POUR LESQUELLES DEMANDER UN TEST DE DÉPISTAGE DES ITSS

LES ITSS TOUCHENT UN GRAND NOMBRE D'INDIVIDUS !

A-Vous ou votre partenaire avez eu des relations sexuelles sans condom avec :

- un nouveau ou une nouvelle partenaire;
- une personne qui a eu plusieurs partenaires;
- un nouveau ou une nouvelle partenaire pendant un voyage;
- un nouveau ou une nouvelle partenaire originaire d'un pays où le VIH est très répandu;
- un homme ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes;
- une personne infectée par le VIH;
- une personne qui a présentement une ITSS ou qui en a déjà eu une;
- un travailleur ou une travailleuse du sexe;
- une personne qui a pris soit des drogues par injection ou par inhalation, soit des stéroïdes.

B-Vous avez partagé du matériel d'injection ou d'inhalation de drogues ou de stéroïdes, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie.

C-Vous vous êtes fait faire des tatouages ou un perçage (piercing) avec des aiguilles et du matériel non stériles.

D-Vous avez une relation de couple stable et vous souhaitez cesser d'utiliser le condom.

E-Vous craignez d'avoir contracté une infection.