

Décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues au Québec

juillet 2017 à septembre 2018

Les données présentées portent sur les décès présumés non intentionnels pour lesquels une intoxication aux opioïdes ou autres drogues était suspectée, pour la période du 1^{er} juillet 2017 au 30 septembre 2018, au Québec. Les causes de décès étaient encore sous investigation par les coroners au moment de l'obtention des données. Il est probable que le nombre de décès rapporté sera plus faible lorsque les causes de décès auront été déterminées au terme des investigations. Les données présentées seront donc appelées à varier dans le temps. Ces graphiques seront mis à jour lorsque de nouvelles données seront diffusées.

Source de données : Bureau du coroner.

Mise à jour : décembre 2018


Décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues au Québec, juillet 2017 à septembre 2018



Pour la période de juillet 2017 à septembre 2018, il y a eu 480 décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues.


Les données ne peuvent être comparées avec les données de 2016, puisqu'elles portaient sur les décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes et autres drogues, alors que les données de 2016 portent sur les décès attribuables à une intoxication confirmée aux opioïdes.

Décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues au Québec, par trimestre, juillet 2017 à septembre 2018



Pour la période de juillet 2017 à septembre 2018, le nombre de décès le plus élevé était observé au 2^e trimestre de 2018.


Décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues au Québec selon le groupe d'âge, par trimestre, juillet 2017 à septembre 2018




Pour la période de juillet 2017 à septembre 2018, le nombre de décès le plus élevé était observé dans les groupes d'âge des 30 à 39 ans, 40 à 49 ans et 50 à 59 ans.

Décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues au Québec selon le sexe, par trimestre, juillet 2017 à septembre 2018

Pour la période de juillet 2017 à septembre 2018, la majorité des personnes décédées par intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues (76 %, 366 sur 480) était des hommes.



Substances présentes dans le cas de décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues au Québec, par trimestre, juillet 2017 à septembre 2018



Pour la période de juillet 2017 à septembre 2018, le fentanyl ou ses analogues ont été détectés dans 14 % des décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues (57 sur 407 décès*).

* Le nombre de décès rapportés dans la figure ci-dessus est sous-estimé pour le premier, deuxième et troisième trimestre de 2018 puisque les analyses toxicologiques n'étaient pas toutes complétées au moment de l'obtention des données (complétée à 95 % pour le 1^{er} trimestre de 2018, 85 % pour le 2^e trimestre de 2018 et 66 % pour le 3^e trimestre de 2018). Le nombre de décès rapportés pour ces trimestres sera appelé à augmenter pour chacune des catégories lors de la mise à jour des données.