

Annexe R26 – Histoire antérieure de dépistage du cancer du col, d’ITSS ou de cancer chez les adolescentes selon leur statut vaccinal VPH (au moins une dose)

| Histoire antérieure de | Statut vaccinal VPH (au moins 1 dose) | | | | Valeur de p ¹ |
|---|---------------------------------------|------|---------------|------|--------------------------|
| | Vaccinées | | Non vaccinées | | |
| | n | % | n | % | |
| Test de Pap | | | | | |
| Oui | 148 | 83,6 | 29 | 16,4 | 0,164 |
| Non | 827 | 79,1 | 219 | 20,9 | |
| Test de Pap anormal² | | | | | |
| Oui | 8 | 88,9 | 1 | 11,1 | 0,641 |
| Non | 136 | 82,5 | 28 | 17,1 | |
| D’infection transmissible sexuellement³ | | | | | |
| Oui | 11 | 73,3 | 4 | 26,7 | 0,369 |
| Non | 383 | 82,4 | 82 | 17,6 | |
| De cancer | | | | | |
| Oui | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0,847 |
| Non | 915 | 80,2 | 226 | 19,8 | |

¹Les comparaisons ont été faites par un test de khi-carré de Pearson.

²Seules les participantes ayant déclaré avoir passé un test de Pap sont incluses (n=177).

³Seules les participantes ayant déclaré avoir eu des relations sexuelles sont incluses (n=527).

Source : Enquête auprès des adolescentes – Printemps 2010.