

Liste des municipalités à risque d'acquisition de la maladie de Lyme – Juin 2016

Les critères utilisés pour définir les niveaux de risque ont fait l'objet d'un consensus entre le ministère de la Santé et des Services sociaux, les Directions de santé publique (DSP) concernées et l'Institut national de santé publique du Québec.

Ces niveaux de risque d'acquisition de la maladie de Lyme à la suite d'une piqûre de tique permettent de soutenir les DSP dans leur gestion des risques et dans leur classification des cas déclarés de maladie de Lyme.

Les niveaux de risque intègrent les données de surveillance des cas humains acquis localement et déclarés à la santé publique entre 2004 et 2015, celles de la surveillance active (tiques recueillies dans le cadre d'activités de collecte standardisée sur le terrain à l'aide d'une flanelle) de 2010 à 2012 et de 2014 à 2015, et celles de la surveillance passive (tiques retrouvées sur des humains ou des animaux et transmises au Laboratoire de santé publique du Québec volontairement par les médecins ou les vétérinaires) entre 2009 et 2015.

Il est important de mentionner que le risque est inconnu pour certaines municipalités, étant donné le manque d'information provenant de la surveillance passive et active. Les noms de ces municipalités ne figurent pas sur cette liste.

Légende des niveaux de risque

Risque faible	Municipalités où au moins une tique a été identifiée par des activités de surveillance active confirmant la présence de tiques.
Risque modéré	Municipalités où les trois stades de la tique (larve, nymphe, adulte) ont été identifiés par des activités de surveillance active et où au moins une nymphe était infectée par la bactérie. Les municipalités à risque modéré peuvent aussi être des endroits où au moins trois cas de maladie de Lyme ont acquis leur infection depuis 2004.
Risque élevé	Municipalités où les trois stades de la tique ont été identifiés par des activités de surveillance active et où la bactérie a été détectée chez plus de 20 % des tiques, dont au moins une nymphe.
Risque possible	Municipalités où la présence des tiques dans l'environnement est présumée, étant donné les résultats de la surveillance passive (plusieurs tiques retrouvées chez un même individu ou animal ou encore, présence de nymphes, une forme immature de la tique). Les municipalités à risque possible peuvent aussi être des endroits qui présentent des caractéristiques environnementales favorables à l'établissement des tiques, mais où les activités de surveillance active n'ont pas permis de mettre en évidence leur présence.

Municipalités à risque d'acquisition de la maladie de Lyme

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016
Bas-Saint-Laurent	Mont-Joli	de La Mitis	Possible
Saguenay-Lac-Saint-Jean	Saint-Félicien	du Domaine-du-Roy	Possible
Capitale-Nationale	Beaupré	de Québec-Nord	Possible
	L'Ancienne-Lorette	de Québec-Sud	Possible
	L'Ange-Gardien	de Québec-Nord	Possible
	Neuville	de Portneuf	Possible
	Québec	de Québec-Sud/de Québec-Nord	Possible
	Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	de Québec-Nord	Possible
	Saint-Léonard-de-Portneuf	de Portneuf	Possible
	Saint-Pierre-de-L'Île-d'Orléans	de Québec-Nord	Possible
	Stoneham-et-Tewkesbury	de Québec-Nord	Possible
Mauricie et Centre-du-Québec	Baie-du-Febvre	de Bécancour - Nicolet-Yamaska	Possible
	Bécancour	de Bécancour - Nicolet-Yamaska	Possible
	Drummondville	de Drummond	Modéré
	La Tuque	du Haut-Saint-Maurice	Possible
	L'Avenir	de Drummond	Possible
	Lefebvre	de Drummond	Faible
	Maddington	d'Arthabaska - de l'Érable	Faible
	Nicolet	de Bécancour - Nicolet-Yamaska	Faible
	Notre-Dame-du-Bon-Conseil	de Drummond	Possible
	Pierreville	de Bécancour - Nicolet-Yamaska	Possible
	Saint Narcisse	de la Vallée de la Batiscan	Possible
	Saint-Albert	d'Arthabaska - de l'Érable	Faible
	Saint-Alexis-des-Monts	de Maskinongé	Possible
	Saint-Cyrille-de-Wendover	de Drummond	Possible

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016
Mauricie et Centre-du-Québec (suite)	Sainte-Anne-du-Sault	d'Arthabaska - de l'Érable	Possible
	Saint-Edmond-de-Grantham	de Drummond	Possible
	Sainte-Eulalie	de Bécancour - Nicolet-Yamaska	Faible
	Sainte-Marie-de-Blandford	de Bécancour - Nicolet-Yamaska	Possible
	Sainte-Monique	de Bécancour - Nicolet-Yamaska	Possible
	Sainte-Thècle	de la Vallée de la Batiscan	Possible
	Saint-Eugène	de Drummond	Possible
	Saint-François-du-Lac	de Bécancour - Nicolet-Yamaska	Possible
	Saint-Germain-de-Grantham	de Drummond	Possible
	Saint-Léonard-d'Aston	de Bécancour - Nicolet-Yamaska	Possible
	Saint-Louis-de-Blandford	d'Arthabaska - de l'Érable	Faible
	Saint-Majorique-de-Grantham	de Drummond	Possible
	Saint-Mathieu-du-Parc	du Centre-de-la-Mauricie	Possible
	Saint-Pierre-les-Becquets	de Bécancour - Nicolet-Yamaska	Possible
	Saint-Stanislas	de la Vallée de la Batiscan	Possible
	Sainte-Ursule	de Maskinongé	Possible
	Trois-Rivières	de Trois-Rivières	Faible
	Victoriaville	d'Arthabaska - de l'Érable	Faible
Warwick	d'Arthabaska - de l'Érable	Possible	
Estrie	Bedford (Canton)	de la Pommeraie La DSP de l'Estrie recommande d'envisager la prophylaxie post-exposition suite à une piqûre de tique dans ce RLS. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site suivant : www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladie-lyme.php	Faible
	Bolton-Ouest		Possible
	Brigham		Modéré
	Brome		Faible
	Cowansville		Modéré
	Dunham		Faible
	East Farnham		Faible
	Farnham		Élevé ^(a)

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016
Estrie (suite)	Lac-Brome	de la Pommeraiie La DSP de l'Estrie recommande d'envisager la prophylaxie post-exposition suite à une piqûre de tique dans ce RLS. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site suivant : www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladie-lyme.php	Possible
	Pike River		Faible
	Saint-Armand		Modéré
	Sainte-Brigide-d'Iberville		Faible
	Sainte-Sabine		Possible
	Stanbridge East		Faible
	Stanbridge Station		Faible
	Sutton		Modéré
	Bromont		de la Haute-Yamaska La DSP de l'Estrie recommande d'envisager la prophylaxie post-exposition suite à une piqûre de tique dans ce RLS. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site suivant : www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladie-lyme.php
	Granby	Modéré	
	Roxton Pond	Faible	
	Saint-Alphonse-de-Granby	Possible	
	Sainte-Cécile-de-Milton	Faible	
	Saint-Joachim-de-Shefford	Faible	
	Saint-Paul-d'Abbotsford	Faible	
	Shefford	Possible	
	Waterloo	Possible	
	Ascot Corner	du Haut-Saint-François	
	Austin	de Memphrémagog	Faible
	Barnston-Ouest	de Coaticook	Faible
	Bolton-Est	de Memphrémagog	Possible
	Coaticook	de Coaticook	Possible
	Compton	de Coaticook	Possible
	Cookshire-Eaton	du Haut-Saint-François	Possible
	Danville	d'Asbestos	Modéré
	Dixville	de Coaticook	Possible
	Eastman	de Memphrémagog	Possible
Hatley (Municipalité)	de Memphrémagog	Possible	
La Patrie	du Haut-Saint-François	Possible	

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016
Estrie (suite)	Lac-Mégantic	du Granit	Possible
	Magog	de Memphrémagog	Faible
	Maricourt	de Val Saint-François	Possible
	North Hatley	de Memphrémagog	Possible
	Notre-Dame-des-Bois	du Granit	Possible
	Orford	de Memphrémagog	Possible
	Potton	de Memphrémagog	Possible
	Saint-Adrien	d'Asbestos	Possible
	Saint-Benoit-du-Lac	de Memphrémagog	Possible
	Saint-Camille	d'Asbestos	Possible
	Saint-François-Xavier-de-Brompton	de Val Saint-François	Possible
	Saint-Herménégilde	de Coaticook	Possible
	Sherbrooke	de Sherbrooke	Possible
	Stanstead (Ville)	de Memphrémagog	Faible
	Stoke	de Val Saint-François	Possible
	Stukely-Sud	de Memphrémagog	Possible
	Ulverton	de Val Saint-François	Possible
Valcourt (Canton)	de Val Saint-François	Faible	
Montréal	Beaconsfield	de Pierrefonds - Lac Saint-Louis	Possible
	Côte Saint-Luc	de Côte-Saint-Luc - NDG - Montréal-Ouest	Possible
	Montréal	de Pierrefonds - Lac Saint-Louis	Faible
		de Rivière-des-Prairies - Anjou - Montréal-Est	
	Pointe-Claire	de Pierrefonds - Lac Saint-Louis	Possible
	Kirkland	de Pierrefonds - Lac Saint-Louis	Possible
	Sainte-Anne-de-Bellevue	de Pierrefonds - Lac Saint-Louis	Possible
Senneville	de Pierrefonds - Lac Saint-Louis	Possible	
Outaouais	Cantley	Les Collines-de-l'Outaouais	Possible
	Chelsea	Les Collines-de-l'Outaouais	Possible

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016
Outaouais (suite)	Duhamel	de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation	Possible
	Gatineau	de Grande-Rivière - Hull - Gatineau	Faible
	La Pêche	Les Collines-de-l'Outaouais	Possible
	Pontiac	Les Collines-de-l'Outaouais	Possible
	Montebello	de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation	Possible
	Plaisance	de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation	Faible
	Waltham	Du Pontiac	Possible
Gaspésie-Île-de-la-Madeleine	Gaspé	De la Côte-de-Gaspé	Possible
Chaudière-Appalaches	Lévis	Alphonse-Desjardins	Possible
	Sainte-Agathe-de-Lotbinière	Alphonse-Desjardins	Possible
	Saint-Elzéar	Alphonse-Desjardins	Possible
	Sainte-Praxède	de la région de Thetford	Faible
	Saint-Jules	de Beauce	Possible
	Saint-Louis-de-Gonzague	Des Etchemins	Possible
	Saints-Anges	Alphonse-Desjardins	Possible
	Ste-Lucie-de-Bearegard	de Montmagny-L'Islet	Possible
	St-Georges	de Beauce	Possible
	St-Philémon	Alphonse-Desjardins	Possible
Laval	Laval	de Laval	Faible
Lanaudière	Chertsey	de Lanaudière-Nord	Possible
	Joliette	de Lanaudière-Nord	Possible
	Lac-des-Dix-Milles	de Lanaudière-Nord	Faible
	Lanoraie	de Lanaudière-Nord	Faible
	L'Assomption	de Lanaudière-Sud	Faible
	Mascouche	de Lanaudière-Sud	Possible
	Rawdon	de Lanaudière-Nord	Faible
	Repentigny	de Lanaudière-Sud	Possible
	Saint-Ambroise-de-Kildare	de Lanaudière-Nord	Possible
	Saint-Charles-Borromée	de Lanaudière-Nord	Possible
Sainte-Béatrix	de Lanaudière-Nord	Possible	

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016
Lanaudière (suite)	Sainte-Julienne	de Lanaudière-Nord	Possible
	Sainte-Marie-Salomé	de Lanaudière-Nord	Possible
	Saint-Gabriel	de Lanaudière-Nord	Possible
	Terrebonne	de Lanaudière-Sud	Possible
Laurentides	Blainville	de Thérèse-De Blainville	Possible
	Boisbriand	de Thérèse-De Blainville	Possible
	Brownsburg-Chatham	d'Argenteuil	Possible
	Deux-Montagnes	de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud	Possible
	Grenville-sur-la-Rouge	d'Argenteuil	Possible
	Kiamika	d'Antoine-Labelle	Possible
	Lachute	d'Argenteuil	Possible
	Lorraine	de Thérèse-De Blainville	Possible
	Mirabel	de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud	Possible
	Mont-Tremblant	des Laurentides	Possible
	Morin-Heights	des Pays-d'en-Haut	Possible
	Oka	de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud	Faible
	Prévost	de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord	Possible
	Rosemère	de Thérèse-De Blainville	Possible
	Saint-Adolphe-d'Howard	des Pays-d'en-Haut	Possible
	Saint-André-d'Argenteuil	d'Argenteuil	Possible
	Sainte-Anne-des-Plaines	de Thérèse-De Blainville	Possible
	Sainte-Sophie	de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord	Possible
	Saint Faustin du Lac Carré	des Laurentides	Possible
	Saint-Joseph-du-Lac	de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud	Possible
	Ste-Adèle	des Pays-d'en-Haut	Possible
	St-Eustache	de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord	Possible
St-Jérôme	de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord	Faible	
Val-David	des Laurentides	Possible	
Val-Morin	des Laurentides	Possible	

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016
Montérégie	Acton Vale	de Richelieu-Yamaska	Possible
	Boucherville	Pierre-Boucher	Possible
	Carignan	du Haut-Richelieu - Rouville	Modéré ^(b)
	Chambly	du Haut-Richelieu - Rouville	Faible
	Châteauguay	de Jardins-Roussillon	Faible
	Coteau-du-Lac	de Vaudreuil-Soulanges	Possible
	Dundee	du Haut-Saint-Laurent	Modéré
	Elgin	du Haut-Saint-Laurent	Possible
	Franklin	du Haut-Saint-Laurent	Faible
	Godmanchester	du Haut-Saint-Laurent	Modéré
	Havelock	du Haut-Saint-Laurent	Faible
	Hemmingford (ville et canton)	de Jardins-Roussillon	Modéré
	Henryville	du Haut-Richelieu - Rouville	Modéré
	Hinchinbrooke	du Haut-Saint-Laurent	Modéré
	Huntingdon	du Haut-Saint-Laurent	Possible
	Kahnawake	de Jardins-Roussillon	Faible
	La Prairie	de Jardins-Roussillon	Possible
	La Présentation	de Richelieu-Yamaska	Possible
	Lacolle	du Haut-Richelieu - Rouville	Modéré
	Les Cèdres	de Vaudreuil-Soulanges	Faible
	Longueuil	Pierre-Boucher & de Champlain	Modéré ^(b)
	Marieville	du Haut-Richelieu - Rouville	Modéré ^(b)
	Maple Grove (Beauharnois)	du Suroît	Possible
	Mercier	de Jardins-Roussillon	Faible
	Mont Saint-Hilaire	de Richelieu-Yamaska	Faible
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot	de Vaudreuil-Soulanges	Possible	
Noyan	du Haut-Richelieu - Rouville	Modéré	

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016
Montérégie (suite)	Ormstown	du Haut-Saint-Laurent	Faible
	Richelieu	du Haut-Richelieu - Rouville	Modéré
	Rigaud	de Vaudreuil-Soulanges	Faible
	Rougemont	du Haut-Richelieu - Rouville	Faible
	Roxton Falls	de Richelieu-Yamaska	Faible
	Saint-Anicet	du Haut-Saint-Laurent	Modéré
	Saint-Bernard-de-Lacolle	de Jardins-Roussillon	Modéré
	Saint-Blaise-sur-Richelieu	du Haut-Richelieu - Rouville	Faible
	Saint-Bruno-de-Montarville	de Richelieu-Yamaska	Modéré
	Saint-Chrysostome	du Haut-Saint-Laurent	Faible
	Saint-Cyprien-de-Napierville	de Jardins-Roussillon	Faible
	Saint-Dominique	de Richelieu-Yamaska	Modéré
	Sainte-Angèle-de-Monnoir	du Haut-Richelieu - Rouville	Faible
	Sainte-Catherine	de Jardins-Roussillon	Faible
	Sainte-Clotilde	de Jardins-Roussillon	Faible
	Saint-Damase	de Richelieu-Yamaska	Faible
	Saint-Édouard	de Jardins-Roussillon	Possible
	Sainte-Julie	Pierre-Boucher	Possible
	Sainte-Justine-de-Newton	de Vaudreuil-Soulanges	Faible
	Saint-Étienne-de-Beauharnois	du Suroît	Modéré
	Sainte-Victoire-de-Sorel	Pierre-De Saurel	Possible
	Saint-Hyacinthe	de Richelieu-Yamaska	Possible
	Saint-Jacques-le-Mineur	de Jardins-Roussillon	Faible
	Saint-Jean-Baptiste	de Richelieu-Yamaska	Faible
	Saint-Jean-sur-Richelieu	du Haut-Richelieu - Rouville	Faible
	Saint-Lazare	de Vaudreuil-Soulanges	Possible
	Saint-Liboire	de Richelieu-Yamaska	Faible
Saint-Louis-de-Gonzague	du Suroît	Possible	
Saint-Mathias-sur-Richelieu	du Haut-Richelieu - Rouville	Faible	

Régions sociosanitaires	Municipalités	Réseaux locaux de services (RLS)	Niveaux de risque en 2016
Montérégie (suite)	Saint-Michel	de Jardins-Roussillon	Possible
	Saint-Patrice-de-Sherrington	de Jardins-Roussillon	Possible
	Saint-Polycarpe	de Vaudreuil-Soulanges	Faible
	Saint-Roch-de-Richelieu	Pierre-De Saurel	Faible
	Saint-Simon	de Richelieu-Yamaska	Faible
	Saint-Stanislas-de-Kostka	du Suroît	Faible
	Saint-Valentin	du Haut-Richelieu - Rouville	Modéré
	Saint-Valérien-de-Milton	de Richelieu-Yamaska	Possible
	Salaberry-de-Valleyfield	du Suroît	Modéré
	Très-Saint-Sacrement	du Haut-Saint-Laurent	Faible
	Venise-en-Québec	du Haut-Richelieu - Rouville	Modéré
	Verchères	Pierre-Boucher	Possible

- (a) Le site qui a été échantillonné à Farnham et qui respecte l'ensemble des critères associés à un risque élevé est celui du Centre d'entraînement des Forces armées canadiennes. Ce site est clôturé et l'accès y est contrôlé. Les boisés qui entourent le centre d'entraînement des Forces armées canadiennes ont été échantillonnés en 2015 et aucune tique *Ixodes scapularis* n'a été retrouvée.
- (b) Carignan, Longueuil et Marieville sont des municipalités qui ont été identifiées dans l'avis scientifique de l'INSPQ (2014) comme présentant des sites avec des populations de tiques *Ixodes scapularis* établies et infectées par *B.burgdorferi*. Cette information a été intégrée dans la présente liste et c'est la raison pour laquelle ces municipalités ont un niveau de risque modéré.