



DÉMARCHE : Recommander la levée de l'isolement

Ce que vous devez communiquer à la personne sous investigation.

Personne sous investigation (PSI)

- Attendre la confirmation d'un résultat négatif avant de cesser les mesures.
- Si exposition à risque élevé ou modéré avec cas confirmé : compléter la période d'isolement préventif recommandée (14 jours).
- Si test de dépistage est négatif MAIS qu'il est fort probable que la personne soit atteinte de la COVID-19 même s'il n'y a pas de diagnostic : suivre consignes d'un cas confirmé symptomatique (voir page suivante).



DÉMARCHE : Recommander la levée de l'isolement

Ce que vous devez communiquer à un cas suspect ou un cas confirmé non hospitalisés.

Cas suspect ou cas confirmé symptomatique

Selon l'évaluation du médecin et de la Direction régionale de santé publique (DRSP), l'ensemble des facteurs suivants doivent être pris en considération avant de lever les mesures :

Maladie légère :

- *période d'au moins 10 jours écoulée depuis le début de la maladie aiguë ou date du prélèvement si asymptomatique ET*
- *absence de fièvre depuis 48 heures sans prise de médicaments contre la fièvre ET*
- *amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant l'anosmie, l'agueusie et la toux résiduelle qui peuvent persister).*

Pour les personnes ayant eu une maladie sévère (ex hospitalisé aux soins intensifs) :

- *période d'au moins 21 jours écoulée depuis le début de la maladie aiguë ou date du prélèvement si asymptomatique ET*
- *absence de fièvre depuis 48 heures sans prise de médicaments contre la fièvre ET*
- *amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant l'anosmie, l'agueusie et la toux résiduelle qui peuvent persister).*





DÉMARCHE : Recommander la levée de l'isolement

Ce que vous devez communiquer à un cas suspect ou un cas confirmé non hospitalisés (suite).

Cas suspect ou cas confirmé symptomatique (suite)

Pour les personnes immunosupprimées :

- *période d'au moins 28 jours écoulée depuis le début de la maladie aiguë ou date du prélèvement si asymptomatique ET*
- *absence de fièvre depuis 48 heures sans prise de médicaments contre la fièvre ET*
- *amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant l'anosmie, l'agueusie et la toux résiduelle qui peuvent persister).*
- *Par contre les mesures d'isolement pourraient être cessées chez un usager pour lequel on aurait obtenu 2 résultats de TAAN (PCR) négatifs entre le jour 21 et 28.*

- Cas suspect : si un prélèvement est indiqué voir PSI.

- Si pas de prélèvement : consignes du cas confirmé symptomatique.

- Si autre cause, compléter la période d'isolement comme contact. Les personnes hospitalisées qui retournent dans un milieu regroupant des personnes vulnérables (RPA, RI-RTF, CHSLD) devront être testées et isolées pendant 14 jours à leur retour dans leur milieu.





DÉMARCHE : Recommander la levée de l'isolement

Ce que vous devez communiquer au contact asymptomatique d'un cas confirmé.

Contact asymptomatique d'un cas confirmé

Il s'agit d'une personne ayant été en contact avec un cas confirmé, mais qui n'a pas développé de symptômes.

Si le contact est à risque élevé ou modéré :

- Isolement préventif 14 jours à partir du dernier jour d'exposition à risque avec le cas.

Pour les personnes vivant au domicile du cas :

Si le cas et le contact :

- appliquent les mesures : levée de l'isolement préventif 14 jours après que les mesures aient été mises en place;
- n'appliquent pas les mesures et continuent à s'exposer : levée de l'isolement préventif 14 jours après que le cas ne sera plus considéré contagieux.

Si devient symptomatique : un prélèvement est indiqué (M7) voir PSI; sinon voir cas confirmé symptomatique.

Contact domiciliaire asymptomatique d'un cas suspect :

- pas d'isolement, autosurveillance des symptômes.

