

L'Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire : 1998-2002

Tendances et résultats




Jacynthe Loiselle
Bertrand Perron

Institut de la statistique du Québec -
Direction Santé Québec

De 1998 à 2002, la lutte au tabagisme marque des points


Usage global de la cigarette selon le sexe



Institut de la statistique du Québec -
Direction Santé Québec

Entre 1998 et 2002, la baisse est significative chez tous les types de fumeurs

Évolution des types de fumeurs



Institut de la statistique du Québec -
Direction Santé Québec

Résultats sont à la fois...

Encourageants

- Considérant les efforts consentis dans la lutte au tabagisme

Étonnants

- L'ampleur du mouvement (7 points de pourcentage depuis 1998)

Concordants

- Ampleur de la baisse est concordante avec celle observée chez des populations comparables (Ontario, Alberta)


Révélateurs de la fonction de monitoring

- Confirment un mouvement pressenti au T2 de l'enquête
- Illustrent la sensibilité de la mesure des fumeurs utilisée dans l'enquête

Institut de la statistique du Québec -
Direction Santé Québec

Confirmation d'un mouvement amorcé en 2000 : la non initiation au tabagisme


Évolution des non-fumeurs : 1998-2002



Institut de la statistique du Québec -
Direction Santé Québec

Le tabagisme en baisse seulement dans les 3 premières secondaires

L'usage de la cigarette selon l'année d'études



Institut de la statistique du Québec -
Direction Santé Québec

Les habitudes des fumeurs n'ont pas changé

Quantité de cigarettes consommées quotidiennement



Institut de la statistique du Québec -
Direction Santé Québec

Quantité de cigarettes fumées quotidiennement selon la catégorie de fumeurs et le sexe, 2002


	2 ou moins	3 à 5	6 à 10	11 et plus
	%			
Catégorie de fumeurs				
Fumeurs quotidiens	6,0 *	27,5	40,2	26,3
Fumeurs occasionnels	44,1	38,6	12,5 *	4,7 **
Fumeurs débutants	92,1	7,0 *	0,9 **	-
Sexe				
Garçons	47,2	19,8	18,1	14,9
Filles	41,8	24,5	22,8	10,9

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Institut de la statistique du Québec -
Direction Santé Québec

Fréquence de consommation de cigarettes



Institut de la statistique du Québec -
Direction Santé Québec


Autres facettes du comportement demeurés stables

- Âge moyen à la 1re cigarette est 12 ans
- Plus de filles que de garçons fument la cigarette
- Influence des pairs et de la fratrie demeure importante
- Les lieux et moments de prédilection pour fumer sont les mêmes (*party, fin de semaine, cour d'école*)

Institut de la statistique du Québec -
Direction Santé Québec

Changements dans l'accessibilité

Achat de cigarettes dans un commerce



Parmi ceux qui ont acheté, combien se sont fait refuser la vente



Institut de la statistique du Québec -
Direction Santé Québec

Principaux constats

- La diminution du tabagisme liée à la non initiation
- Les comportements des fumeurs sont demeurés stables (sexe, quantité, fréquence, influence des pairs, lieux d'usage, etc.)
- L'accessibilité aux produits du tabac demeure préoccupante
- Avancées significatives quant à l'exposition à la fumée de tabac dans l'environnement

Institut de la statistique du Québec -
Direction Santé Québec

Limites

- Impossibilité de documenter les trajectoires des fumeurs
- Limite dans la capacité de comprendre certains phénomènes (ex: la différence entre les sexes)
- Pas de données régionales
- Ne permet pas l'établissement de relations causales
- Comparaison avec les autres provinces limitée par les différences dans les systèmes scolaires

Institut de la statistique du Québec -
Direction Santé Québec

Forces

- Baromètre provincial
- Délai de récurrence favorise une analyse de tendance à court terme
- Enquête conçue pour le Québec et par les acteurs de la lutte au tabagisme
- Mesure du tabagisme sensible
- Disponibilité rapide des résultats

Institut de la statistique du Québec -
Direction Santé Québec

Une parenthèse pour conclure

- L'utilité d'une enquête de surveillance pour la prise de décisions réside dans sa capacité à détecter les changements
- Toute modification à la méthodologie limite les comparaisons (ex: CTUMS et ESCC)
- 2 enquêtes de surveillance du tabagisme chez les jeunes : Québec, Canada
- Enquêtes menées en simultanément avec Presque la même population, Presque les mêmes indicateurs, Presque la même méthodologie
- Comparaisons possibles entre 2 enquêtes différentes mais pas dans une perspective de surveillance rigoureuse
- Reconduction de l'*Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire* : automne 2004