


*Atelier : Agir contre les inégalités sociales de santé, une donnée à la fois!*  
**Journées annuelles de santé publique – 27 novembre 2019**

**Mise en contexte sur le tabagisme**

On observe au Québec une diminution du tabagisme depuis plusieurs années. La proportion de fumeurs n'est cependant pas distribuée de manière égale entre les différents groupes sociaux et suit généralement un gradient socioéconomique dans les pays industrialisés. En effet, les personnes appartenant à certains groupes sociaux sont plus susceptibles de fumer que celles d'autres groupes, ce qui conduit à une inégalité sociale de santé. À titre d'exemple, l'Outil de données sur les inégalités en santé à l'échelle du Canada de l'Agence de la santé publique du Canada, montre que des inégalités en matière de tabagisme sont observées au Québec selon plusieurs variables sociales, dont le revenu, la scolarité, la profession, l'origine culturelle/raciale, etc.



**Données à utiliser pour l'atelier**

Bien qu'il existe plusieurs variables pour analyser la proportion de fumeurs selon différents groupes sociaux, nous proposons d'en utiliser une seule pour ne pas alourdir l'atelier. Le tableau suivant présente les proportions de fumeurs selon le niveau de scolarité et les différentes mesures d'inégalité issues du Système de surveillance des inégalités sociales de santé du Québec (voir l'Aide-mémoire pour les définitions des mesures d'inégalité).

Période		2003	2013-2014	Évolution temporelle
Variable de position	Sans diplôme d'études secondaires (DES)	32%	35%	8% ↑
	Diplôme d'études secondaires	30%	29%	4% ↓
	Diplôme d'études collégiales	27%	22%	18% ↓
	Diplôme d'études universitaires	18%	12%	31% ↓
	TOUS	27%	25%	8% ↓
Différence (Sans DES – Études universitaires)	(Fumeurs pour 100)	15	22,8	↑
Ratio (Sans DES / Études universitaires)		1,85	2,89	↑
Indice de concentration (% tiré)	(%)	7	14	↑
Fraction attribuable à la scolarité	(%)	36	48	↑
Nombre de cas attribuables à la scolarité	(Nombre de fumeurs)	536 100	638 700	↑

Légende: ↓ Diminution statistiquement significative    ↑ Augmentation statistiquement significative

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada

**Consignes pour l'atelier :**

**Étape 1 :** Formation de groupes de 6 personnes et choix d'un porte-parole. Celui-ci prendra des notes et fera un éventuel retour en plénière.

**Étape 2 :** Travail en groupe pour répondre aux trois questions (20 minutes au total).

**Étape 3 :** Retour volontaire en plénière, maximum 10 groupes (2 minutes par groupe, 20 minutes au total).

Tous les groupes, dont ceux à distance, sont invités à laisser sur place la feuille de réponses ou à la numériser et nous la transmettre par courriel ([carmen.baciu@msss.gouv.qc.ca](mailto:carmen.baciu@msss.gouv.qc.ca)). Les résultats des travaux des groupes seront utilisés pour un retour à tous les participants.

**Répondez aux 3 questions suivantes à partir des données du tableau présenté au recto.**

1. **Formulez un court message** (2 à 3 lignes) pour un partenaire intersectoriel au sujet de la présence ou de l'évolution temporelle d'inégalités sociales en matière de tabagisme. Incluez dans votre message la mesure d'inégalité privilégiée.

---

---

---

---

2. Selon le message formulé, **priorisez une action** qui pourrait contribuer à la réduction des inégalités sociales en matière de tabagisme.

---

---

---

---

3. Nommez **un défi en lien avec la communication** du message et **un défi en lien avec l'action** à réaliser.

---

---

---

---

---

Optionnel - prise de notes effectuée par : \_\_\_\_\_