



Surveillance
des infections
transmissibles
sexuellement
et par le sang

ANALYSE DES CAS DÉCLARÉS D'INFECTION GÉNITALE À
CHLAMYDIA TRACHOMATIS, D'INFECTION GONOCOCCIQUE
ET DE SYPHILIS AU QUÉBEC PAR ANNÉE CIVILE

1993-2008 (ET PROJECTIONS 2009)

ANALYSE DES CAS DÉCLARÉS D'INFECTION GÉNITALE À
CHLAMYDIA TRACHOMATIS, D'INFECTION GONOCOCCIQUE
ET DE SYPHILIS AU QUÉBEC PAR ANNÉE CIVILE

1993-2008 (ET PROJECTIONS 2009)

Direction des risques biologiques et de la santé au travail

Novembre 2009

AUTEURS

Karine Blouin

Direction des risques biologiques et de la santé au travail
Institut national de santé publique du Québec

Raymond Parent

Direction des risques biologiques et de la santé au travail
Institut national de santé publique du Québec

Unité de recherche en santé des populations, Centre de recherche, Centre hospitalier affilié
universitaire de Québec, Hôpital du Saint-Sacrement

AVEC LA COLLABORATION DE

Sylfreed Minzunza

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

RÉVISION

Isabelle Petillot, agente administrative

Direction des risques biologiques et de la santé au travail

Ce document est disponible intégralement en format électronique (PDF) sur le site Web de l'Institut national de santé publique du Québec au : <http://www.inspq.qc.ca>.

Les reproductions à des fins d'étude privée ou de recherche sont autorisées en vertu de l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur. Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation du gouvernement du Québec qui détient les droits exclusifs de propriété intellectuelle sur ce document. Cette autorisation peut être obtenue en formulant une demande au guichet central du Service de la gestion des droits d'auteur des Publications du Québec à l'aide d'un formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante : <http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/autorisation.php>, ou en écrivant un courriel à : droit.auteur@cspq.gouv.qc.ca.

Les données contenues dans le document peuvent être citées, à condition d'en mentionner la source.

DÉPÔT LÉGAL – 1^{er} TRIMESTRE 2010

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA

ISSN : 1917-9979 (VERSION IMPRIMÉE)

ISSN : 1920-924X (PDF)

ISBN : 978-2-550-57915-1 (VERSION IMPRIMÉE)

ISBN : 978-2-550-57916-8 (PDF)

©Gouvernement du Québec (2010)

REMERCIEMENTS

Nous aimerions remercier :

- les personnes qui se chargent d'alimenter et de gérer le système des maladies à déclaration obligatoire dans chacune des directions régionales de la santé publique;
- la direction du Laboratoire de santé publique du Québec, Institut national de santé publique du Québec (LSPQ/INSPQ) ainsi que les personnes associées à la gestion du fichier des maladies à déclaration obligatoire du LSPQ/INSPQ;
- monsieur Sylfreed Minzunza qui a produit les tableaux et les graphiques et qui nous a fourni les données complémentaires dont nous avons besoin;
- madame Myrto Mondor (Unité de recherche en santé des populations, Centre hospitalier affilié universitaire de Québec) qui a aidé à la conception, au développement et à la programmation du cadre d'analyse initial.

AVANT-PROPOS

Nous évaluons dans le présent rapport l'ampleur du problème des infections génitales à *Chlamydia trachomatis*, des infections gonococciques et des syphilis au Québec. L'analyse de la distribution des cas aide à orienter les interventions et à planifier les ressources pour lutter contre le problème.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) est responsable du programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (MADO). Plusieurs partenaires tels les médecins traitants, les laboratoires déclarants et les directions régionales de la santé publique y collaborent. Ces directions régionales assurent la collecte, la saisie et le transfert des informations. Le MSSS se charge de la tabulation et de la production des graphiques. L'analyse des données a été faite à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Nous nous adressons ici aux responsables régionaux de la lutte contre les ITSS, particulièrement à ceux qui œuvrent en santé publique. Nous espérons aussi être utiles à leurs partenaires communautaires et institutionnels.

FAITS SAILLANTS

Au Québec, 17 020 cas d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, d'infection gonococcique et de syphilis infectieuse ont été déclarés en 2008.

Les cas de granulome inguinal et de chancre mou sont restés très rares. Le nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne (LGV) a atteint 22 cas en 2005 et 47 cas en 2006 pour ensuite diminuer à 9 cas par année en 2007 et en 2008.

Infection génitale à *Chlamydia trachomatis*

Avec 15 002 cas déclarés, cette infection compte pour 47,2 % des 31 817 cas de MADO déclarés en 2008.

Des cas ont été déclarés dans chacune des 18 régions sociosanitaires du Québec. La région de Montréal a déclaré le plus grand nombre de cas (4 191 des 15 002 cas déclarés en 2008; 28 %).

Le taux d'incidence de l'infection génitale à *C. trachomatis* est demeuré stable entre 2004 et 2006 pour ensuite augmenter en 2007 et en 2008. Il était de 195,6 par 100 000 en 2008, et sera d'environ 212,1 par 100 000 en 2009 si le rythme de déclaration observé durant les 43 premières semaines de l'année se maintient.

Les jeunes de 15 à 24 ans restent les plus touchés. Les augmentations les plus prononcées du taux d'incidence ont d'ailleurs été observées chez les 15-19 ans.

Infection gonococcique

Chacune des 18 régions sociosanitaires du Québec a rapporté au moins un cas en 2008.

C'est dans la région de Montréal qu'on observe le plus de cas, soit 820 des 1 649 cas déclarés en 2008 (50 %). Contrairement à ce qui a été observé pour l'infection génitale à *C. trachomatis*, cette proportion est nettement plus élevée que le poids démographique de la région (24 %; 1 877 693/7 750 504).

Une brusque augmentation du taux d'incidence a été observée au Nunavik entre 2007 et 2008. Le taux est passé de 565,2 par 100 000 (60 cas) à 1 779,9 par 100 000 (191 cas) lors de cette période, soit une augmentation de 215 %.

Le taux d'incidence de l'infection gonococcique a augmenté au Québec depuis la fin des années 90 jusqu'en 2002, avant de se stabiliser pendant quelques années à environ 11 par 100 000.

Une augmentation du taux a de nouveau été observée à 18,4 par 100 000 en 2007, puis à 21,5 par 100 000 en 2008. Les projections pour l'année 2009 suggèrent une augmentation à 25,0 par 100 000. Cette augmentation touche davantage les femmes que les hommes.

Cependant, les hommes démontrent de façon constante des taux supérieurs à ceux des femmes (27,8 vs. 15,3 par 100 000 en 2008).

La proportion de souches de *N. gonorrhoeae* résistantes à la ciprofloxacine est passée de 4 % en 2004 à 18 % en 2005, pour atteindre son maximum à 25 % en 2006. Elle a ensuite diminué en 2007 (23 %) et en 2008 (10 %). Il semblerait que la proportion de souches résistantes à la ciprofloxacine tende à se stabiliser.

Syphilis

L'incidence québécoise de syphilis infectieuse diminuait depuis plusieurs années lorsque l'épidémie actuelle s'est déclarée chez les HARSAH.

En 2008, Montréal demeurait la région où étaient déclarés près du trois quart des cas (261/369, 71 %). Le taux d'incidence y était alors de 13,6 par 100 000 (27,4 par 100 000 chez les hommes et 0,3 par 100 000 chez les femmes). Le taux provincial de 4,8 par 100 000 pour 2008 demeure toutefois près de 100 fois plus élevé que les taux observés dans les années précédant l'épidémie (0,05 par 100 000 en 1998, par exemple). Si le rythme de déclaration observé jusqu'à maintenant se maintient, un taux provincial d'environ 4,1 par 100 000 devrait être observé en 2009.

Les taux les plus élevés et les plus grands nombres de cas ont été observés chez les hommes de 30 à 49 ans. La majorité des cas ont été déclarés chez les 40 ans et plus (211/359, 59 %).

Le nombre de cas de syphilis infectieuse chez les femmes est demeuré relativement stable depuis 2005. Sept et huit cas ont été observés en 2007 et en 2008, respectivement. La syphilis congénitale demeure donc une menace sur notre territoire.

Conclusion

Les ITS bactériennes représentent un problème actuel de santé publique, non seulement au Québec, mais également ailleurs au Canada et dans le monde. Les efforts de surveillance et de prévention de la transmission des ITS doivent donc être maintenus.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX	IX
LISTE DES FIGURES.....	XI
1 INTRODUCTION	1
2 RÉSULTATS	3
2.1 ITS rares.....	3
2.2 Infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i>	3
2.2.1 Canada	3
2.2.2 Québec	4
2.3 Infection gonococcique	6
2.3.1 Canada	6
2.3.2 Québec	6
2.4 Syphilis	9
2.4.1 Classification des cas	9
2.4.2 Syphilis infectieuses	10
2.4.3 Syphilis non infectieuse	12
3 DISCUSSION	13
3.1 Limites et portée de l'analyse	13
4 CONCLUSION.....	15
5 BIBLIOGRAPHIE	17
TABLEAUX ET FIGURES	21

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Caractéristiques des cas déclarés d'ITS selon l'âge et le sexe, province de Québec, 2004-2008	24
Tableau 2	Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008	25
Tableau 3	Nombre de cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008	54
Tableau 4	Nombre de cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008	64
Tableau 5	Nombre de cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008	74
Tableau 6	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008	84
Tableau 7	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008	94
Tableau 8	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008	104
Tableau 9	Nombre de cas déclarés d'infection à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le type chez les moins d'un an, province de Québec, 1993 à 2008	133
Tableau 10	Nombre de cas déclarés d'infection à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le type chez les moins d'un an, province de Québec hors Montréal, 1993 à 2008	133
Tableau 11	Nombre de cas déclarés d'infection à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le type chez les moins d'un an, Montréal, 1993 à 2008	133
Tableau 12	Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008	153
Tableau 13	Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008	163
Tableau 14	Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008	173
Tableau 15	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008	183
Tableau 16	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008	193
Tableau 17	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008	203

Tableau 18	Nombre de cas déclarés et proportion (%) d'infection à gonococcique selon le site de la maladie chez les hommes, province de Québec, 1993 à 2008.....	232
Tableau 19	Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008.....	251
Tableau 20	Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008.....	261
Tableau 21	Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008.....	271
Tableau 22	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008.....	281
Tableau 23	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008.....	291
Tableau 24	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008.....	301
Tableau 25	Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008.....	315
Tableau 26	Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008.....	325
Tableau 27	Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008.....	335

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Proportion du nombre de cas selon la catégorie de maladie, province de Québec, 2008	23
Figure 2	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, province de Québec, 1993 à 2008	35
Figure 3	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Bas-Saint-Laurent, 1993 à 2008.....	36
Figure 4	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1993 à 2008	37
Figure 5	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Québec, 1993 à 2008	38
Figure 6	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 1993 à 2008	39
Figure 7	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Estrie, 1993 à 2008	40
Figure 8	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Montréal, 1993 à 2008.....	41
Figure 9	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Outaouais, 1993 à 2008	42
Figure 10	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 1993 à 2008	43
Figure 11	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Côte-Nord, 1993 à 2008	44
Figure 12	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Nord-du-Québec, 1993 à 2008.....	45
Figure 13	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 1993 à 2008.....	46
Figure 14	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1993 à 2008	47
Figure 15	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Laval, 1993 à 2008	48
Figure 16	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Lanaudière, 1993 à 2008.....	49
Figure 17	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Laurentides, 1993 à 2008.....	50
Figure 18	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Montérégie, 1993 à 2008.....	51
Figure 19	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Nunavik, 1993 à 2008.....	52
Figure 20	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1993 à 2008	53

Figure 21	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, province de Québec, 1993 à 2008.....	114
Figure 22	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Bas-Saint-Laurent, 1993 à 2008	115
Figure 23	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1993 à 2008.....	116
Figure 24	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Québec, 1993 à 2008	117
Figure 25	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Mauricie et Centre-du-Québec, 1993 à 2008.....	118
Figure 26	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Estrie, 1993 à 2008.....	119
Figure 27	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Montréal, 1993 à 2008	120
Figure 28	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Outaouais, 1993 à 2008.....	121
Figure 29	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Abitibi-Témiscamingue, 1993 à 2008...	122
Figure 30	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Côte-Nord, 1993 à 2008	123
Figure 31	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Nord-du-Québec, 1993 à 2008	124
Figure 32	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 1993 à 2008.....	125
Figure 33	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Chaudière-Appalaches, 1993 à 2008 ..	126
Figure 34	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Laval, 1993 à 2008	127
Figure 35	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Lanaudière, 1993 à 2008	128
Figure 36	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Laurentides, 1993 à 2008	129
Figure 37	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Montérégie, 1993 à 2008	130
Figure 38	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Nunavik, 1993 à 2008	131
Figure 39	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1993 à 2008.....	132

Figure 40	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, province de Québec, 1993 à 2008	134
Figure 41	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Bas-Saint-Laurent, 1993 à 2008.....	135
Figure 42	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1993 à 2008	136
Figure 43	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Québec, 1993 à 2008	137
Figure 44	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 1993 à 2008	138
Figure 45	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Estrie, 1993 à 2008	139
Figure 46	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Montréal, 1993 à 2008.....	140
Figure 47	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Outaouais, 1993 à 2008	141
Figure 48	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 1993 à 2008	142
Figure 49	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Côte-Nord, 1993 à 2008	143
Figure 50	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Nord-du-Québec, 1993 à 2008.....	144
Figure 51	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 1993 à 2008.....	145
Figure 52	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1993 à 2008	146
Figure 53	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Laval, 1993 à 2008	147
Figure 54	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Lanaudière, 1993 à 2008.....	148
Figure 55	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Laurentides, 1993 à 2008.....	149
Figure 56	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Montérégie, 1993 à 2008.....	150
Figure 57	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Nunavik, 1993 à 2008.....	151
Figure 58	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1993 à 2008	152
Figure 59	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, province de Québec, 1993 à 2008	213
Figure 60	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Bas-Saint-Laurent, 1993 à 2008	214

Figure 61	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1993 à 2008.....	215
Figure 62	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Québec, 1993 à 2008.....	216
Figure 63	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Mauricie et Centre-du-Québec, 1993 à 2008.....	217
Figure 64	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Estrie, 1993 à 2008.....	218
Figure 65	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Montréal, 1993 à 2008.....	219
Figure 66	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Outaouais, 1993 à 2008.....	220
Figure 67	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Abitibi-Témiscamingue, 1993 à 2008.....	221
Figure 68	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Côte-Nord, 1993 à 2008.....	222
Figure 69	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Nord-du-Québec, 1993 à 2008.....	223
Figure 70	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 1993 à 2008.....	224
Figure 71	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Chaudière-Appalaches, 1993 à 2008.....	225
Figure 72	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Laval, 1993 à 2008.....	226
Figure 73	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Lanaudière, 1993 à 2008.....	227
Figure 74	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Laurentides, 1993 à 2008.....	228
Figure 75	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Montérégie, 1993 à 2008.....	229
Figure 76	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Nunavik, 1993 à 2008.....	230
Figure 77	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1993 à 2008.....	231
Figure 78	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, province de Québec, 1993 à 2008.....	233
Figure 79	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Bas-Saint-Laurent, 1993 à 2008.....	234
Figure 80	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1993 à 2008.....	235
Figure 81	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Québec, 1993 à 2008.....	236

Figure 82	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 1993 à 2008	237
Figure 83	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Estrie, 1993 à 2008	238
Figure 84	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Montréal, 1993 à 2008.....	239
Figure 85	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Outaouais, 1993 à 2008	240
Figure 86	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 1993 à 2008	241
Figure 87	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Côte-Nord, 1993 à 2008.....	242
Figure 88	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Nord-du-Québec, 1993 à 2008.....	243
Figure 89	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 1993 à 2008.....	244
Figure 90	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1993 à 2008	245
Figure 91	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Laval, 1993 à 2008.....	246
Figure 92	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Lanaudière, 1993 à 2008.....	247
Figure 93	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Laurentides, 1993 à 2008.....	248
Figure 94	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Montérégie, 1993 à 2008.....	249
Figure 95	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Nunavik, 1993 à 2008.....	250
Figure 96	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse, selon le groupe d'âge, province de Québec, 1993 à 2008	311
Figure 97	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse, selon le groupe d'âge, Québec, 1993 à 2008.....	312
Figure 98	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse, selon le groupe d'âge, Montréal, 1993 à 2008	313
Figure 99	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse, selon le groupe d'âge, Montérégie, 1993 à 2008	314

1 INTRODUCTION

Certaines infections transmissibles sexuellement (ITS) sont répertoriées dans le système québécois des maladies à déclaration obligatoire (MADO). Un système informatisé, implanté en 1989-1990, relie chacune des dix-huit régions sociosanitaires à une plate-forme commune d'enregistrement des cas déclarés située au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ/INSPQ). L'agrégation des données dépersonnalisées décrit l'épidémiologie des infections déclarées au Québec.

Nous traitons ici des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, d'infection gonococcique et de syphilis. Nous abordons aussi certaines ITS plus rarement observées, soit la lymphogranulomatose vénérienne, le granulome inguinal et le chancre mou.

Les données présentées ont été extraites le 10 juin 2009 et couvrent la période du 1^{er} janvier 1993 au 31 décembre 2008. À cela s'ajoutent les données 2009 disponibles le 5 novembre 2009, données dont nous nous servons pour projeter le nombre de cas qui pourraient être déclarés cette année.

Les dénominateurs des années 1991 à 2000 sont des estimations de la population du Québec selon la région sociosanitaire, le sexe et l'année d'âge, produites par le Service du développement de l'information (SDI) du ministère de la Santé et des Services sociaux (janvier 2005). Il est à noter que ces données sont ajustées à partir des données de Statistique Canada de février 2004. Les dénominateurs de 2001 à 2008 sont des projections de la population du Québec selon la région sociosanitaire (RSS), le sexe et l'année d'âge produites par l'Institut de la statistique du Québec (janvier 2005).

Nous présentons le sommaire de l'épidémiologie canadienne pour chacune des maladies. Ces données sont issues d'un exercice d'analyse récent fait à l'Agence de la santé publique du Canada et traitant des données recueillies jusqu'en 2007^[1, 2]. Certaines données pour 2008 étaient également disponibles via le site Web de l'Agence de la santé publique du Canada^[3].

2 RÉSULTATS

L'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, l'infection gonococcique et la syphilis infectieuse sont les ITS à déclaration obligatoire les plus fréquentes. En 2008, ces infections représentaient 53,5 % (17 020/31 817) des cas déclarés de MADO (figure 1, page 23). Dans l'ensemble, 56,5 % (74 401/131 680) des cas déclarés entre 2004 et 2008 sont des ITS (Sylfred Minzunza, communication personnelle).

Le tableau 1 (page 24) donne les caractéristiques d'âge et de sexe des patients atteints entre 2004 et 2008, données qui sont rarement manquantes. Plus des deux tiers des cas (70 %) touchaient des femmes. L'âge médian de celles-ci était de 21 ans, tandis qu'il était de 25 ans chez les hommes.

2.1 ITS RARES

Certaines ITS à déclaration obligatoire sont très peu fréquentes. Au Québec, deux cas de chancre mou et un seul cas de granulome inguinal ont été déclarés de 2004 à 2008.

Les sérotypes L1, L2 et L3 de *Chlamydia trachomatis* envahissent les systèmes lymphatiques et circulatoires lors du développement de la lymphogranulomatose vénérienne, une ITS qui était également très peu fréquente au Québec et au Canada jusqu'en 2005. Cinq cas seulement avaient été déclarés au Québec de 1993 à 2004. Une augmentation importante avait été observée en 2005 et 2006 (25 et 44 cas, respectivement), et la plupart des cas étaient des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HARSAH) de Montréal^[4]. L'incidence de lymphogranulomatose vénérienne semble stable pour l'instant, avec l'apparition de neuf nouveaux cas pour chacune des années 2007 et 2008 (tableau 2, page 25). Cette incidence demeure toutefois plus élevée qu'avant 2005, ce qui incite à la vigilance.

Au Canada^[5], la mise à jour disponible pour la lymphogranulomatose vénérienne couvre la même période que celle traitée lors de la dernière version du présent rapport^[6]. Au total, 88 cas, tous masculins, avaient été détectés entre novembre 2001 et novembre 2006. En date du 5 juillet 2006, la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario et le Québec étaient touchés.

2.2 INFECTION GÉNITALE À *CHLAMYDIA TRACHOMATIS*

2.2.1 Canada

Le taux d'incidence de l'infection génitale à *C. trachomatis*, qui était de 200,2 par 100 000 en 2004, a continué d'augmenter en 2005, 2006, 2007 et 2008 (205,6, 212,4, 224,4, et 237,2 par 100 000, respectivement)^[2, 3]. Entre 2007 et 2008, le taux d'incidence a augmenté dans toutes les provinces et territoires, à l'exception de l'Alberta. Abstraction faite des régions nordiques du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (où les taux d'incidence en 2008 étaient respectivement de 700,0, 2 010,0 et 4 254,6 par 100 000), les taux d'incidence les plus élevés pour l'année 2008 ont été observés au Manitoba (577,5 par 100 000) et en Saskatchewan (477,7 par 100 000), avec des augmentations respectives de

521 % et 655 % par rapport aux taux de 2004. Toutefois, l'augmentation observée au Manitoba est attribuable en bonne partie à l'utilisation d'un nouveau test diagnostique plus sensible et spécifique depuis juin 2007.

L'augmentation des taux d'incidence qui avait été observée entre 1997 et 2004 s'est poursuivie de façon constante, tant chez les hommes que chez les femmes^[1, 2]. Entre 1997 (21 cas) et 2004 (95 cas), les plus fortes augmentations des taux d'incidence avaient été observées chez les hommes de 60 ans et plus (de 1 à 3,8 par 100 000, une augmentation de 280 %). Dans ce groupe d'âge, le taux a continué d'augmenter, mais à un rythme moindre (5,2 par 100 000 en 2007, soit une augmentation de 38 % par rapport à 2004).

Entre 2004 et 2008, les plus importantes augmentations du taux d'incidence ont été observées au Manitoba (de 358,4 à 577,5 par 100 000, une augmentation de 61 %) et aux Territoires du Nord-Ouest (de 1 352,9 à 2 010,0 par 100 000, une augmentation de 49 %).

Chez les femmes, les taux les plus élevés pour l'année 2007 ont été observés parmi les 20 à 24 ans (1 656,1 par 100 000, une augmentation de 10 % par rapport à 2004) ainsi que parmi les 15 à 19 ans (1 472,0 par 100 000, une augmentation de 0,6 % par rapport à 2004).

Chez les hommes, les taux les plus élevés en 2007 ont été observés parmi les 20 à 24 ans (801,4 par 100 000, une augmentation de 13 % par rapport à 2004) ainsi que parmi les 25 à 29 ans (498,9 par 100 000, une augmentation de 20 % par rapport à 2004).

2.2.2 Québec

L'infection par *C. trachomatis* est la maladie à déclaration obligatoire la plus fréquemment observée au Québec. Avec 15 002 cas déclarés en 2008, cette infection représentait 47,2 % des 31 817 cas de MADO déclarés pour cette année (figure 1, page 23). Les projections pour l'année 2009 suggèrent qu'approximativement 16 351 infections génitales à *C. trachomatis* seront observées.

Des cas ont été déclarés dans chacune des 18 régions sociosanitaires du Québec (figures 2 à 20, pages 35 à 53). Le plus grand nombre de cas a été déclaré par la région de Montréal (4 191 des 15 002 cas déclarés en 2008; 28 %). Cette proportion correspond approximativement, selon les estimations de 2008, au poids démographique de la région (24 %; 1 877 693/7 750 504)^[7].

Les régions du Nunavik (2 916,8 par 100 000) et des Terres-Cries-de-la-Baie-James (1 627,7 par 100 000) sont celles qui observaient les taux d'incidence les plus élevés en 2008. Parmi les autres régions, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés pour la Côte-Nord (287,4 par 100 000), l'Outaouais (225,3 par 100 000), la région de Montréal (217,9 par 100 000) et la Mauricie et Centre-du-Québec (216,3 par 100 000).

Depuis 2006, le taux d'incidence de l'infection génitale à *C. trachomatis* a diminué dans cinq régions. Si certaines de ces diminutions étaient faibles, celles qui ont été observées dans les régions de Chaudière-Appalaches (10 %) et du Nord-du-Québec (55 %) étaient importantes.

En revanche, une augmentation de l'incidence a été observée dans les 13 autres régions, tout particulièrement dans l'Outaouais (33 %), la Montérégie (32 %) et l'Estrie (31 %).

Le taux d'incidence provincial de l'infection génitale à *C. trachomatis* avait diminué jusqu'en 1997 lorsqu'il avait atteint la valeur minimale de 88,5 par 100 000. La tendance s'est ensuite inversée et le taux avait doublé à 170,7 par 100 000 en 2004.

Les taux sont restés stables entre 2004 et 2006 (168,8 par 100 000 (12 835 cas) en 2006). Ils ont ensuite augmenté jusqu'à atteindre des valeurs de 176,3 par 100 000 (13 465 cas) en 2007 et de 195,6 par 100 000 (15 002 cas) en 2008, soit des augmentations respectives de 4 % et de 16 % par rapport à 2006. Les projections pour l'année 2009 suggèrent que le taux sera d'environ 212,1 par 100 000.

Chez les femmes, le taux d'incidence est passé de 233,6 par 100 000 (8 990 cas) en 2006, à 240,8 par 100 000 (9 308 cas) en 2007 et à 267,1 par 100 000 (10 368 cas) en 2008.

Chez les hommes, le taux d'incidence est passé de 101,4 par 100 000 (3 805 cas) en 2006, à 108,7 par 100 000 (4 101 cas) en 2007 et à 121,7 par 100 000 (4 610 cas) en 2008.

Le tableau 3 (page 54) présente la distribution des cas déclarés par âge et région sociosanitaire. Les tableaux 4 et 5 (pages 63 à 82) présentent la même distribution pour chacun des deux sexes, tandis que les tableaux 6 à 8 (pages 83 à 112) reprennent les mêmes données en termes de taux d'incidence.

On constate sur ces tableaux qu'en 2008, les femmes âgées de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans étaient celles qui présentaient les taux d'incidence les plus élevés, soit respectivement 1 615,3 et 1 573,2 par 100 000. Chez les hommes, les 20 à 24 ans présentaient le taux d'incidence le plus élevé en 2008 à 681,6 par 100 000.

Parmi les 15 à 34 ans, groupes d'âge les plus touchés, les augmentations les plus marquées entre 2005 et 2008 ont été observées chez les jeunes de 15 à 19 ans, soit de 18 % chez les jeunes femmes (de 1 369,8 par 100 000 en 2005 à 1 615,3 par 100 000 en 2008) et de 53 % chez les jeunes hommes (de 174,6 par 100 000 à 267,4 par 100 000).

Les figures 2 à 20 (pages 35 à 53) présentent l'évolution de l'incidence sous forme d'histogrammes, selon le sexe, pour l'ensemble de la province ainsi que pour chacune des régions sociosanitaires. Les figures 21 à 39 (pages 113 à 131) présentent l'évolution des taux d'incidence sous forme graphique pour les groupes d'âge les plus atteints, chez les femmes et chez les hommes, pour l'ensemble de la province ainsi que pour chacune des régions sociosanitaires.

Chez les enfants de moins d'un an, entre 2004 et 2008, 29 cas d'infections à *Chlamydia trachomatis* ont été déclarés dans la province de Québec (10 cas génitaux, 11 cas oculaires et huit cas pulmonaires) (tableau 9, page 132). Depuis les 40 cas observés en 1993 (14 cas génitaux, 21 cas oculaires et cinq cas pulmonaires), le plus faible nombre de cas a été observé en 2008 avec seulement 3 cas (une infection génitale, une infection oculaire et une infection pulmonaire). Ceci démontre bien la poursuite de la diminution du nombre de cas

d'infections depuis 1993. Les tableaux 10 et 11 (page 132) présentent ces mêmes données pour l'ensemble du Québec hors Montréal ainsi que pour la région de Montréal.

2.3 INFECTION GONOCOCCIQUE

2.3.1 Canada

Au Canada, le taux d'incidence de l'infection gonococcique était de 36,1 par 100 000 en 2007 et de 37,8 par 100 000 en 2008, soit des augmentations de 24 % et de 30 %, respectivement, par rapport à 2004 (29,1 par 100 000). En 2007, il était de 42,3 par 100 000 chez les hommes et de 29,8 par 100 000 chez les femmes. Entre 2004 et 2007, l'augmentation du taux d'incidence a été plus importante chez les femmes que chez les hommes (41 % vs. 14 %)^[2, 3].

En 2008, si on fait abstraction du Nunavut (1 154,3 par 100 000) et des Territoires du Nord-Ouest (690,8 par 100 000), les taux les plus élevés d'infection gonococcique ont été observés au Manitoba et en Saskatchewan, à 113,5 par 100 000 et à 127,8 par 100 000, respectivement^[3].

Comme dans le cas de l'infection génitale à *C. trachomatis*, les taux d'incidence de l'infection gonococcique augmentent depuis une douzaine d'années au Canada. À l'exception du Québec qui sera traité plus loin, les augmentations les plus importantes observées entre 2004 et 2008 l'ont été pour les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador (de 0,2 par 100 000 à 2,8 par 100 000, 1 300 %), du Nunavut (de 151,9 par 100 000 à 1 154,3 par 100 000, 660 %), du Nouveau-Brunswick (de 2,0 par 100 000 à 4,7 par 100 000, 135 %), des Territoires du Nord-Ouest (de 315,4 par 100 000 à 690,8 par 100 000, 119 %), de la Saskatchewan (de 63,2 par 100 000 à 127,8 par 100 000, 102 %) et de l'Île-du-Prince-Édouard (de 2,9 par 100 000 à 5,7 par 100 000, 97 %). Tout récemment, le Nunavut a subi une très forte augmentation de l'incidence de gonorrhée, soit de 496,0 par 100 000 à 1 154,3 par 100 000 entre 2007 et 2008^[1, 2].

Entre 1997 et 2004, les taux avaient augmenté à la fois chez les femmes et les hommes, mais de façon plus marquée chez ces derniers, en particulier chez les plus de 40 ans. Cependant, entre 2004 et 2007, l'augmentation a touché davantage les femmes de tous les groupes d'âge (des augmentations de 19 % chez les 15-19 ans à 93 % chez les 60 ans et plus)^[1, 2].

2.3.2 Québec

Évolution de l'incidence

Toutes les régions du Québec ont rapporté au moins un cas d'infection gonococcique en 2008 (figures 40 à 58, pages 133 à 151). C'est dans la région de Montréal qu'on en observe le plus, soit 820 des 1 649 cas déclarés en 2008 (50 %). Cette proportion est nettement plus élevée que le poids démographique de la région (24 %; 1 877 693/7 750 504).

Comme pour l'infection génitale à *C. trachomatis* au Québec, les taux d'incidence de gonorrhée les plus élevés en 2008 ont été observés dans les régions nordiques (Nunavik à 1 779,9 par 100 000 et Terres-Cries-de-la-Baie-James à 201,7 par 100 000). Viennent ensuite les régions de Montréal et de Laval avec des taux respectifs de 42,6 et de 21,4 par 100 000.

Il est important de souligner une brusque augmentation du taux d'incidence d'infections gonococciques observée au Nunavik entre 2007 et 2008. Le taux est passé de 565,2 par 100 000 (60 cas) à 1 779,9 par 100 000 (191 cas) lors de cette période, soit une augmentation de 215 %.

D'autres régions ont subi une augmentation de l'incidence de plus de 50 % entre 2006 et 2008, soit les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Québec, de l'Outaouais, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de Chaudière-Appalaches et de Laval.

Au Québec (figure 40, page 133), le taux d'incidence de l'infection gonococcique a évolué de façon alarmante au cours des dernières années :

1. Le taux a subi une augmentation importante entre 1998 et 2001 pour ensuite se stabiliser quelques années, jusqu'en 2004.
2. Une forte augmentation a été observée entre 2004 et 2006, le taux étant passé de 11,0 par 100 000 en 2004 à 16,8 par 100 000 en 2006, soit une augmentation de 53 %.

Durant cette période, le taux d'incidence a augmenté de façon plus marquée chez les femmes que chez les hommes, soit de 144 % chez les femmes (de 3,9 par 100 000 en 2004 à 9,5 par 100 000 en 2006) comparativement à 33 % chez les hommes (de 18,2 par 100 000 en 2004 à 24,2 par 100 000 en 2006).

3. Le taux a continué d'augmenter de façon constante à 18,4 par 100 000 en 2007, puis à 21,5 par 100 000 en 2008. Les projections pour l'année 2009 suggèrent que le taux d'incidence de l'infection gonococcique continuera d'augmenter à 25,0 par 100 000.

Chez les femmes en 2008, le nombre de cas déclarés et le taux correspondant étaient de 595 et de 15,3 par 100 000 tandis qu'ils étaient de 1 053 et de 27,8 par 100 000 chez les hommes. Par rapport aux taux de 2006, l'augmentation observée a été plus marquée chez les femmes (62 %) que chez les hommes (15 %).

Avec des hausses d'au moins 48 % observées chez les 15 à 59 ans, cette augmentation était particulièrement marquée chez les femmes de 35 à 39 ans (139 %) et de 50 à 59 ans (116 %). Chez les hommes, l'augmentation concernait principalement les 5-29 ans (39 %) et les 20-24 ans (54 %).

Pour davantage de détails sur l'évolution de l'infection gonococcique au Québec entre 1992 et 1998, consulter la version 2001-2006 du présent rapport^[6].

Les taux d'incidence observés chez les hommes en 2008 demeurent toujours de deux à dix fois plus élevés que ceux observés chez les femmes, sauf chez les moins de 25 ans où le ratio hommes/femmes oscille entre 0,5 et 1,2. Cependant, chez les 15-59 ans,

l'augmentation des taux observée chez les femmes était supérieure (de 2 à 9 fois) comparativement aux hommes.

Le tableau 12 (page 152) présente la distribution des cas déclarés par âge et région sociosanitaire. Les tableaux 13 et 14 (pages 162 à 181) présentent la même distribution pour chacun des deux sexes, tandis que les tableaux 15 à 17 (pages 182 à 211) reprennent les mêmes données en termes de taux d'incidence.

Chez les femmes en 2008, les 15 à 19 ans ainsi que les 20 à 24 ans présentaient les taux les plus élevés, soit de 81,5 et de 93,6 par 100 000, respectivement. Pour les mêmes groupes d'âge, ces taux étaient respectivement de 68,2 et 49,2 par 100 000 en 2007.

Chez les hommes en 2008, les groupes d'âge les plus touchés étaient les 20 à 24 ans et les 25 à 29 ans avec des taux d'incidence de 113,5 et de 85,6 par 100 000, respectivement. Les taux correspondants pour 2007 étaient de 85,7 et 67,0 par 100 000.

Les figures 40 à 58 (pages 133 à 151) présentent l'évolution de l'incidence sous forme d'histogrammes, selon le sexe, pour l'ensemble de la province ainsi que pour chacune des régions sociosanitaires. Les figures 59 à 77 (pages 212 à 230) présentent l'évolution des taux d'incidence sous forme graphique pour les groupes d'âge les plus atteints, chez les femmes et chez les hommes, pour l'ensemble de la province ainsi que pour chacune des régions sociosanitaires. Notons que les 20 à 24 ans, en plus d'être les plus touchés chez les deux sexes, ont subi une augmentation considérable du taux d'incidence de 63,7 par 100 000 à 103,8 par 100 000 entre 2006 et 2008.

Émergence de la résistance à la ciprofloxacine

La résistance de *N. gonorrhoeae* à certains antibiotiques existe depuis une vingtaine d'années en Amérique du Nord. Les résistances à la pénicilline et à la tétracycline sont apparues dans les années 80 et sont devenues tellement courantes qu'on les tient maintenant pour acquises^[8, 9]. L'utilisation de ces deux antibiotiques n'est d'ailleurs plus recommandée de nos jours.

Le programme de surveillance de la résistance aux antibiotiques du LSPQ/INSPQ a permis d'observer les premiers cas québécois de gonocoques résistants à la ciprofloxacine (concentration minimale inhibitrice [CMI] = ≥ 1 mg/L) en 1995^[10, 11].

Dans le cadre du présent programme de surveillance, les taux de résistance rapportés ont pour numérateur le nombre de souches de *N. gonorrhoeae* trouvées et confirmées résistantes à la ciprofloxacine par l'ensemble des laboratoires participant au programme; ils ont pour dénominateur le nombre total de cas rapportés par les laboratoires participants (cas détectés par culture et cas détectés par TAAN). Cette approche sous-estime le taux réel de résistance.

La proportion de souches résistantes à la ciprofloxacine est demeurée sous les 2 % jusqu'en 2003 pour ensuite augmenter à 4 % en 2004, à 17 % en 2005, et atteindre son maximum à 25 % en 2006. La proportion de souches résistantes à la ciprofloxacine a ensuite diminué en 2007 et en 2008 (23 % et 10 %, respectivement). Les données préliminaires indiquent que le

nombre de souches résistantes devrait continuer à diminuer en 2009 (88 souches résistantes) comparativement à 2008 (165 souches résistantes).

En 2008, des souches non sensibles à la ciprofloxacine ont été détectées dans chacune des 18 régions du Québec.

Infection gonococcique rectale et pharyngée

Le tableau 18 (page 231) donne le détail de la distribution des cas d'infections gonococciques déclarés chez les hommes par site d'infection.

Entre 30 et 50 cas d'infection pharyngée sont déclarés chaque année depuis 2001, soit environ 5 % des cas totaux.

Le nombre d'infections rectales a quant à lui augmenté de façon notable lorsqu'il est passé de 47 cas déclarés en 2001 à 72 en 2007 et à 76 en 2008. La proportion de ces cas parmi l'ensemble de cas caractérisés est passée de 7,5 % en 2001, à 8,2 % en 2007 et à 7,9 % en 2008.

La plupart des infections rectales (75 %; 57/76) et pharyngées (85 %; 34/40) déclarées en 2008 l'ont été dans la région de Montréal.

2.4 SYPHILIS

2.4.1 Classification des cas

Au Québec, les infections syphilitiques chez l'adulte peuvent être déclarées selon huit catégories différentes. La classification des cas selon la présentation clinique étant très complexe, le risque d'erreur est important. L'interprétation des données doit tenir compte de cette limite.

Les syphilis dites « infectieuses » sont les cas d'infection :

- 1. primaires;
- 2. secondaires;
- 3. latentes précoces (de moins d'un an).

Les syphilis dites « non infectieuses » sont les cas d'infection :

- 4. latentes d'un an ou plus;
- 5. neurologiques (asymptomatiques);
- 6. cardiovasculaires;
- 7. neurologiques (symptomatiques);
- 8. symptomatiques tardives.

À cela s'ajoutent :

- les sept cas de syphilis congénitales déclarés depuis 1993. Aucun cas n'a été déclaré depuis 2004;
- les quatre cas de « syphilis sous autre forme » (type ajouté au système MADO en 2003);
- les cas de syphilis de type non précisé. Entre un et 10 cas ont été déclarés de 1993 à 2003, 41 en 2004 et 30 en 2005. Bien que le nombre de cas de type non précisé a beaucoup augmenté entre 2004 et 2008, leur proportion parmi l'ensemble des cas d'infections est demeurée relativement stable depuis 1993, oscillant entre 3 % (un des 32 cas déclarés en 2000) et 26 % (126 des 488 cas déclarés en 2006). Ces proportions étaient respectivement de 12 % (43/348) et 16 % (83/537) en 2007 et 2008.

Entre 2006 et 2008, 1 625 cas de syphilis ont été déclarés. C'est davantage de cas comparativement à la période entre 2001 et 2005, lorsque 1 190 cas avaient été déclarés. Parmi les cas répertoriés entre 2006 et 2008, 377 étaient des syphilis non infectieuses et 993 étaient des syphilis infectieuses. Nous traiterons de celles-ci en premier lieu.

2.4.2 Syphilis infectieuses

Canada

Depuis 1997, une flambée épidémique a été observée au Québec mais aussi à Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa et dans le territoire du Yukon. À l'exception du Québec qui sera traité plus loin, les taux les plus élevés au Canada en 2008 ont été observés en Colombie-Britannique à 7,5 par 100 000, en Alberta à 4,1 par 100 000 et en Ontario à 3,2 par 100 000. Une éclosion très importante de syphilis a été observée aux Territoires du Nord-Ouest entre 2007 et 2008, lorsque le taux d'incidence est passé de 0,0 par 100 000 à 108,6 par 100 000 (47 cas).

Les taux d'incidence avaient augmenté de façon importante chez les deux sexes entre 1997 et 2004, mais de façon beaucoup plus marquée chez les hommes (1 425 %) que chez les femmes (167 %). Entre 2004 et 2007, une légère augmentation des taux d'incidence a de nouveau été observée. Chez les hommes, les taux sont passés de 6,1 par 100 000 en 2004 à 6,4 par 100 000 en 2007, soit une modeste augmentation de 5 %. Chez les femmes, les taux sont passés de 0,8 par 100 000 en 2004 à 1,0 par 100 000 en 2007 (une augmentation de 25 %).

Entre 2004 et 2007, les cas de syphilis infectieuse se retrouvaient principalement chez les 35 à 59 ans. Rappelons que le taux d'incidence avait été multiplié par 14 chez les hommes de ce groupe d'âge entre 1997 et 2004.

Québec

Le taux d'incidence provincial de syphilis infectieuse diminuait depuis plusieurs années quand a éclaté la flambée épidémique actuelle chez les HARSAH (figure 78, page 232).

On constate aux figures 79 à 95 (pages 233 à 249) que l'épidémie a débuté à la fin de 2000 dans la région de Montréal et s'est par la suite étendue aux autres régions du Québec (les données pour la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James ne sont pas présentées, aucun

cas n'ayant été observé depuis 1992). En 2008, 9 des 18 régions sociosanitaires ont déclaré des cas.

Le tableau 19 (page 250) présente la distribution des cas déclarés par âge et région sociosanitaire. Les tableaux 20 et 21 (pages 260 à 279) présentent la même distribution pour chacun des deux sexes tandis que les tableaux 22 à 24 (pages 280 à 309) reprennent les mêmes données en termes de taux d'incidence.

En 2008, Montréal restait la région où étaient déclarés la majorité des cas (261/369, 71 %). C'est beaucoup plus que ne le laissait présager le poids démographique de la région (24 %; 1 877 693/7 750 504). Le taux d'incidence y était alors de 13,6 par 100 000 (27,4 par 100 000 chez les hommes et 0,3 par 100 000 chez les femmes). Il était de 3,9 par 100 000 dans la région de Québec (25 hommes et une femme) et de 4,8 par 100 000 pour l'ensemble de la province (359 hommes, huit femmes et deux individus de sexe inconnu). Les projections pour l'année 2009 permettent d'anticiper une possible diminution du taux provincial à 4,1 par 100 000.

L'épidémie de syphilis infectieuse observée aux Territoires du Nord-Ouest entre 2007 et 2008 n'a pas eu d'écho dans les régions nordiques québécoises.

De 0,1 par 100 000 (seulement deux cas) en 1998, le taux chez les hommes est passé à 9,9 par 100 000 en 2006 avec 372 cas. Durant le même intervalle, le taux est passé de 0,0 à 0,2 par 100 000 (six cas) chez les femmes. La diminution du nombre de cas observée en 2007 (239 cas, 6,3 par 100 000) laissait présager un ralentissement de l'épidémie chez les hommes. Cependant, le nombre de cas de syphilis infectieuse continue de fluctuer, 359 cas masculins (9,5 par 100 000) ayant été observés pour l'année 2008 alors que les prédictions pour 2009 suggèrent une diminution à 303 cas (8,0 par 100 000). Le nombre de cas chez les femmes demeure relativement stable depuis 2005. Sept et huit cas ont été observés chez ces dernières en 2007 et en 2008, respectivement. Quinze cas pourraient être observés en 2009.

Les figures 79 à 95 (pages 233 à 249) présentent l'évolution de l'incidence sous forme d'histogrammes, selon le sexe, pour l'ensemble de la province ainsi que pour chacune des régions sociosanitaires. Les figures 96 à 99 (pages 310 à 313) présentent l'évolution des taux d'incidence sous forme graphique pour les groupes d'âge les plus atteints, chez les femmes et chez les hommes, pour l'ensemble de la province ainsi que pour les régions ayant observé un nombre relativement élevé de cas (Québec, Montréal et Montérégie).

Lors du rapport 2001-2006^[6], les taux les plus élevés avaient été observés chez les hommes de 30 à 49 ans. L'augmentation récente des taux chez les 20 à 29 ans suggère que les hommes plus jeunes seraient davantage touchés qu'auparavant. En effet, entre 2005 et 2008, les taux d'incidence de la syphilis infectieuse sont passés de 5,1 à 12,0 par 100 000 chez les 20 à 24 ans, de 6,7 à 14,5 par 100 000 chez les 25 à 29 ans, de 11,3 à 11,0 par 100 000 chez les 30 à 34 ans, de 14,5 à 18,9 par 100 000 chez les 34 à 39 ans et de 16,8 à 22,5 par 100 000 chez les 40 à 49 ans. La majorité des cas ont été déclarés chez les 40 ans et plus (211/359, 59 %).

2.4.3 Syphilis non infectieuse

Les données présentées relativement à la syphilis non infectieuse sont exprimées en nombre de cas plutôt qu'en taux d'incidence. Le taux d'incidence est une mesure du rythme de propagation alors que des taux calculés pour la syphilis non infectieuse représenteraient plutôt une mesure du rythme de leur détection. Ces taux n'ont donc pas été calculés.

La catégorie syphilis non infectieuses comprend les syphilis latentes tardives de plus d'un an et les cas de syphilis avec atteinte d'organes cibles comme le système nerveux (neurosyphilis), le cœur (syphilis cardiovasculaire) ou les os (syndrome de Hutchinson). Bien que les syphilis non infectieuses n'aient que peu d'impact sur la propagation de l'infection, elles sont par contre une cause importante de complications.

L'augmentation récente du nombre de cas de syphilis infectieuse pourrait éventuellement avoir comme conséquence une recrudescence des cas de syphilis non infectieuse détectés tardivement compte tenu des éléments suivants :

Certains cas de syphilis infectieuse ne sont pas détectés, soit parce que les personnes atteintes n'ont pas consulté ou parce que le bon diagnostic n'a pas été établi (ex. : confusion entre une syphilis primaire et une ulcération génitale herpétique, confusion entre une syphilis secondaire et une autre infection virale pouvant donner un *rash*). Ces cas sont alors susceptibles de développer des complications et d'être détectés tardivement.

L'augmentation à prévoir du nombre de cas de syphilis non infectieuse provoquera un accroissement du nombre de complications médicales associées à cette infection. D'ailleurs, une légère augmentation du nombre de cas de syphilis non infectieuse a effectivement été observée ces dernières années. De 89 cas détectés en 2005 dans la province, nous sommes passés à 110 cas en 2006, 99 cas en 2007 et 168 cas en 2008. Les projections pour l'année 2009 laissent cependant présager une diminution avec 112 cas prévus.

Les tableaux 25 à 27 (pages 314 à 344) présentent la distribution des cas observés de syphilis non infectieuse.

3 DISCUSSION

3.1 LIMITES ET PORTÉE DE L'ANALYSE

Malgré la puissance d'analyse que donne le grand nombre de cas déclarés, le système de surveillance passif des MADO a ses limites. Comme par le passé, nous soulignons au lecteur que l'interprétation des tendances qu'on dégage du système MADO doit tenir compte de plusieurs facteurs, dont :

- la disponibilité régionale des nouveaux tests de détection;
- les activités régionales de prévention et de promotion de la santé;
- la sous-déclaration d'ITS asymptomatiques, particulièrement dans le cas de l'infection génitale à *C. trachomatis*;
- l'évolution des pratiques médicales et des procédures de dépistages;
- l'application des définitions nosologiques;
- les changements dans les procédures régionales de saisie, de validation et de nettoyage des données.

La vérification systématique de la validité des cas déclarés et l'évaluation de la sous-déclaration permettraient de mesurer l'ampleur de certains de ces biais potentiels.

Même s'il sous-estime l'ampleur des problèmes, le système de déclaration permet malgré tout de mieux les cerner et d'en suivre l'évolution.

4 CONCLUSION

La situation épidémiologique au Canada est similaire à celle qu'on observe au Royaume-Uni, en Australie, et dans une certaine mesure, aux États-Unis; tel qu'on le voit ci-dessous. Le Québec présentant des taux qui ne sont que légèrement en deçà de la moyenne canadienne, notre situation n'est donc ni particulièrement meilleure ou pire que dans ces pays^[1].

Taux d'incidence des infections à *C. trachomatis*, des infections gonococcique et de la syphilis infectieuse primaire et secondaire au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis en 2007

	Taux par 100 000 habitants			
	Canada	Australie	Royaume-Uni	États-Unis
Infection à <i>C. trachomatis</i>	224,0	247,6	201,3	370,2
Infection gonococcique	36,1	36,5	30,9	118,9
Syphilis infectieuse	3,7	6,7	4,4	3,8

Tableau adapté de Jayaraman et collab. (2007)^[1].

La plupart des pays industrialisés sont victimes d'une recrudescence des ITS bactériennes. L'incidence de l'infection génitale à *C. trachomatis* est en augmentation aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie^[12-14], ainsi que dans plusieurs pays de l'Union européenne, particulièrement dans les pays nordiques tels que la Norvège, le Danemark et la Suède^[15]. Au Canada comme au Québec, elle a plus que doublé depuis 1997 et continue d'augmenter. D'autre part, l'épidémie de lymphogranulomatose vénérienne semble s'être stabilisée en 2007 et 2008.

Aux États-Unis, le taux d'incidence de l'infection gonococcique est stable depuis la fin des années 90 dans la population générale, et légèrement à la hausse dans certaines sous-populations vulnérables telles les HARSAH^[12]. Au Québec, approximativement 60 % des infections gonococciques étaient retrouvées chez des HARSAH lors de l'enquête entre juin 2005 et mai 2006^[16].

Les efforts de surveillance québécois semblent démontrer que le nombre de souches de *N. gonorrhoeae* résistantes à la ciprofloxacine est en régression dans la province. Cette baisse pourrait être en partie expliquée par l'augmentation de l'utilisation du TAAN pour le diagnostic, diminuant ainsi le nombre de souches testées. La récente réduction de l'utilisation de la ciprofloxacine pour le traitement des infections gonococciques pourrait également expliquer une partie de ce phénomène^[17, 18]. Par contre, l'incidence de l'infection gonococcique demeure en progression, ce qui reste très préoccupant, d'autant plus que la recrudescence est surtout observée chez les femmes.

Des épidémies de syphilis infectieuse ont été observées dans plusieurs pays dont la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, la Norvège^[19], les États-Unis^[12] et dans cinq provinces et territoires canadiens, dont le Québec^[2]. L'incidence de la syphilis

infectieuse au Québec demeure à un niveau inquiétant et justifie une surveillance très attentive.

Plusieurs facteurs pourraient contribuer à l'augmentation actuelle de l'incidence des ITS, par exemple l'abandon ou la non-adoption des comportements sexuels sécuritaires, l'essoufflement des comportements préventifs chez les HARSAH^[20, 21], l'utilisation de drogues telles que les amphétamines et de médicaments tels que le Viagra^[22, 24], la recherche de partenaires sexuels à l'aide du réseau Internet^[25] et la banalisation du sida depuis l'avènement des traitements antirétroviraux hautement efficaces^[26, 27].

La mortalité causée par le sida dans les années 90 pourrait être un facteur impliqué dans la baisse des taux d'incidence de la syphilis infectieuse observée à cette époque^[28, 29]. Jusqu'à l'apparition des thérapies hautement efficaces contre le VIH en 1996, les personnes infectées par le VIH mouraient relativement rapidement du sida et de ses maladies associées. Le bassin d'individus à risque susceptibles de contracter des ITS s'en trouvait réduit d'autant. Une proportion de la recrudescence de syphilis infectieuse observée ces dernières années pourrait donc être expliquée par une diminution de la mortalité chez les personnes infectées par le VIH.

Une autre préoccupation est que la personne atteinte par le VIH est biologiquement plus susceptible de contracter une autre ITS et, inversement, la personne atteinte d'une ITS est biologiquement plus susceptible de contracter le VIH. Une augmentation de la prévalence des ITS bactériennes pourrait ainsi favoriser une augmentation de l'incidence du VIH^[30].

Il est clair que les ITS bactériennes représentent un fardeau non négligeable d'un point de vue de santé publique, non seulement au Québec, mais également ailleurs au Canada et dans le monde. Les efforts de surveillance et de prévention de la transmission des ITS doivent être maintenus.

5 BIBLIOGRAPHIE


1. Jayaraman, G., Totten, S., Perrin, M., *et al.* (2007) *Bref rapport sur les infections transmissibles sexuellement au Canada: 2007*. Ottawa, Agence de la santé publique du Canada, 24 p.
2. Agence de la santé publique du Canada (2007) *Les Tableaux de données sur les ITS*. 2009-06-23[cited 2009-11-02][Available from: http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its_tab/index-fra.php].
3. Agence de la santé publique du Canada (2008) *Cas déclarés de ITS à déclaration obligatoire du 1^{er} janvier au 31 décembre 2007 et du 1^{er} janvier au 31 décembre 2008 et leurs taux correspondants du 1^{er} janvier au 31 décembre 2007 et 2008* 2009-07-27[cited 2009-11-02][Available from: <http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/stdcases-casmts/cases-cas-08-fra.php>].
4. Lambert, G., Markowski, F., Minzunza, S. (2006) *Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec - Année 2005 (et projections 2006)*. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 62 p.
5. Agence de la santé publique du Canada (2007) *Mise à jour épidémiologique de lymphogranulomatose vénérienne (LGV)*. 2007-10-01[cited 2009-11-02][Available from: <http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/epiu-aepi/std-mts/lgv-fra.php>].
6. Parent, R. (2007) *Analyse des cas déclarés d'infection génitale à chlamydia trachomatis, d'infection gonococcique et de syphilis au Québec par année civile 2001-2006*. Québec, INSPQ, 255 p.
7. Institut de la statistique du Québec (2009) *Estimation de la population des régions administratives, 1^{er} juillet des années 2006 à 2008*. 2009-04-14[cited 2009-11-02][Available from: http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/dons_regnl/regional/ra_2006-2008.htm].
8. CDC (1983) Epidemiologic notes and report Penicillinase-producing Neisseria gonorrhoeae - Los Angeles. *MMWR*, 32, 181-183.
9. Greco, V., Ng, L.K., Catana, R., *et al.* (2003) Molecular epidemiology of Neisseria gonorrhoeae isolates with plasmid-mediated tetracycline resistance in Canada: temporal and geographical trends (1986-1997). *Microb Drug Resist*, 9(4), 353-60.
10. Ringuette, L., Trudeau, T., Turcotte, P., *et al.* (1996) Emergence of Neisseria gonorrhoeae strains with decreased susceptibility to ciprofloxacin--Quebec, 1994-1995. *Can Commun Dis Rep*, 22(15), 121-4; discussion 124-5.
11. Clinical and Laboratory Standards Institute (2007) *CLSI Performance standards for antimicrobial susceptibility testing: Sixteenth Informational Supplement*. Wayne, Clinical and Laboratory Standards Institute.

12. CDC (2007) *Sexually Transmitted Diseases Surveillance, 2007 - Table 1. Cases of sexually transmitted diseases reported by state health departments and rates per 100,000 population: United States, 1941–2007*. 2009-01-13[cited 2009-11-02][Available from: <http://www.cdc.gov/std/stats07/tables/1.htm>].
13. Australian Government, Department of Health and Ageing (2009) *National Notifiable Diseases Surveillance System: Notifications of a selected disease by age group, sex, and year*. [cited 2009-10-19][Available from: http://www9.health.gov.au/cda/Source/Rpt_5_sel.cfm].
14. Centre for Infections (2008) *Selected STI diagnoses and diagnosis rates from GUM clinics in the UK: 2004-2008*. [cited 2009-10-19][Available from: http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1215589013442].
15. World Health Organization (2009) *Centralized information system for infectious diseases (CISID)*. [cited 2009-11-02][Available from: <http://data.euro.who.int/CISID/>].
16. Lambert, G., Ringuette, L., Minzunza, S. (2008) *Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec - Année 2007 (et projections 2008)*. Montréal, ministère de la Santé et des Services sociaux, 82 p.
17. Jetté, L., Lefebvre, B., Bourgault, A.-M. (2009) *Surveillance des souches de Neisseria gonorrhoeae résistantes aux antibiotiques dans la province de Québec - Rapport 2008*. Ste-Anne-de-Bellevue, Laboratoire de santé publique du Québec, 17 p.
18. Fournier, B., Janelle, F., Jetté, L., et al. (2007) *Augmentation du nombre de souches de Neisseria gonorrhoeae résistantes aux fluoroquinolones au Québec*. Montréal, Table de concertation nationale en maladies infectieuses - Groupe de travail pour le contrôle de l'infection gonococcique, 52 p.
19. Fenton, K.A., Lowndes, C.M. (2004) Recent trends in the epidemiology of sexually transmitted infections in the European Union. *Sex Transm Infect*, 80(4), 255-63.
20. Wolitski, R.J., Valdiserri, R.O., Denning, P.H., et al. (2001) Are we headed for a resurgence of the HIV epidemic among men who have sex with men? *Am J Public Health*, 91(6), 883-8.
21. Stockman, J.K., Schwarcz, S.K., Butler, L.M., et al. (2004) HIV prevention fatigue among high-risk populations in San Francisco. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 35(4), 432-4.
22. Wong, W., Chaw, J., Kent, C., et al. (2004) *Risk factors for early syphilis among men who have sex with men seen in an STD clinic, San Francisco 2002–2003*. In *Program and abstracts of the 2004 national STD prevention conference*, Philadelphia.
23. Paz-Bailey, G., Meyers, A., Blank, S., et al. (2004) A case-control study of syphilis among men who have sex with men in New York City: association With HIV infection. *Sex Transm Dis*, 31(10), 581-7.

24. Golden, M.R., Brewer, D.D., Kurth, A., *et al.* (2004) Importance of sex partner HIV status in HIV risk assessment among men who have sex with men. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 36(2), 734-42.
25. Rietmeijer, C.A., McFarlane, M. (2009) Web 2.0 and beyond: risks for sexually transmitted infections and opportunities for prevention. *Curr Opin Infect Dis*, 22(1), 67-71.
26. Katz, M.H., Schwarcz, S.K., Kellogg, T.A., *et al.* (2002) Impact of highly active antiretroviral treatment on HIV seroincidence among men who have sex with men: San Francisco. *Am J Public Health*, 92(3), 388-94.
27. Crepaz, N., Hart, T.A., Marks, G. (2004) Highly active antiretroviral therapy and sexual risk behavior: a meta-analytic review. *Jama*, 292(2), 224-36.
28. Chesson, H.W., Dee, T.S., Aral, S.O. (2003) AIDS mortality may have contributed to the decline in syphilis rates in the United States in the 1990s. *Sex Transm Dis*, 30(5), 419-24.
29. Boily, M.C., Bastos, F.I., Desai, K., *et al.* (2004) Changes in the transmission dynamics of the HIV epidemic after the wide-scale use of antiretroviral therapy could explain increases in sexually transmitted infections: results from mathematical models. *Sex Transm Dis*, 31(2), 100-13.
30. (1998) HIV prevention through early detection and treatment of other sexually transmitted diseases--United States. Recommendations of the Advisory Committee for HIV and STD prevention. *MMWR Recomm Rep*, 47(RR-12), 1-24.

TABLEAUX ET FIGURES

Figure 1 Proportion du nombre de cas selon la catégorie de maladie, province de Québec, 2008



Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (1995), SDI (1992-2000), ISQ (2001-2005). Population type sur 2004.

¹ : Le VIH, le sida et l'herpès néonatal ne sont plus à déclaration obligatoire depuis le 19 novembre 2003.

* : L'hépatite Delta a été ajoutée en juin 2005

Le VIH si seulement donné/reçu du sang/organes/etc. ainsi que la syphilis tertiaire et autres formes ont été ajoutés le 19 novembre 2005.

Ces données incluent toutes les déclarations, mêmes celles où la région est hors Québec.

Tableau 1 Caractéristiques des cas déclarés d'ITS* selon l'âge et le sexe, province de Québec, 2004-2008

Nombre de cas déclarés pour lesquels l'âge du patient est connu	66 589	(99,5 %)
Nombre de cas déclarés pour lesquels le sexe du patient est connu	66 766	(99,8 %)
Nombre de cas déclarés chez les hommes	19 917	(29,8 %)
Hommes d'âge connu	19 827	(29,6 %)
Nombre de cas déclarés chez les femmes	46 849	(70,0 %)
Femmes d'âge connu	46 714	(69,8 %)
Âge médian (moyen) des cas déclarés chez les femmes	21 ans	(22,4)
Âge médian (moyen) des cas déclarés chez les hommes	25 ans	(26,9)

* Les infections à *Chlamydia trachomatis*, les infections gonococciques, la syphilis, la lymphogranulomatose vénérienne, le granulome inguinal et le chancre mou ont été considérés.

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Province de Québec*												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2005	0	0	0	1	3	4	5	8	4	0	0	25
2006	0	0	0	5	2	6	6	21	4	0	0	44
2007	0	0	0	0	2	0	1	5	1	0	0	9
2008	0	0	0	2	1	0	1	3	1	0	0	9
Province de Québec hors Montréal												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	6
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	6

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Montréal												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2005	0	0	0	1	3	4	5	7	4	0	0	24
2006	0	0	0	5	2	5	5	17	4	0	0	38
2007	0	0	0	0	2	0	1	5	1	0	0	9
2008	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Nord-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Chaudière-Appalaches												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
14 - Lanaudière												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16 - Montérégie												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Figure 2 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, province de Québec, 1993 à 2008




Nombre de cas déclarés		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes		7 349	5 827	5 276	5 001	4 802	5 240	5 817	6 468	7 284	7 991	8 825	9 217	8 925	8 990	9 308	10 368
Hommes		2 621	2 058	1 750	1 635	1 620	1 969	2 135	2 199	2 860	3 048	3 437	3 616	3 745	3 805	4 101	4 610
Inconnu		5	11	11	8	14	14	18	18	23	27	23	15	31	40	56	24
Total		9 975	7 896	7 037	6 644	6 436	7 223	7 970	8 685	10 167	11 066	12 285	12 848	12 701	12 835	13 465	15 002

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 3 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Bas-Saint-Laurent, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	194	137	132	97	118	144	96	93	116	140	166	155	179	146	129	142
Hommes	103	79	74	66	64	104	50	47	74	85	127	101	124	105	81	94
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0
Total	297	216	206	163	182	248	146	141	190	232	293	256	303	251	210	236

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 4 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	412	303	280	273	194	203	244	252	224	286	307	324	279	271	283	269
Hommes	126	109	90	81	72	70	83	87	75	101	105	122	109	119	129	103
Inconnu	2	3	3	5	5	3	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
Total	540	415	373	359	271	276	327	339	302	387	412	447	388	390	412	372

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 5 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Québec, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	661	548	414	413	471	533	592	578	714	700	862	900	844	878	823	891
Hommes	240	199	148	158	177	211	222	222	325	303	389	372	385	388	384	428
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	0	2	1
Total	901	747	562	571	648	744	814	800	1 040	1 004	1 252	1 275	1 230	1 266	1 209	1 320

Source des numérateurs : Registre MAD0, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 6 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	406	352	271	317	253	315	288	370	433	532	654	732	687	689	648	707
Hommes	136	145	126	95	88	139	105	141	191	217	237	318	339	325	326	341
Inconnu	0	0	0	0	0	2	6	6	1	0	0	2	2	1	1	0
Total	542	497	397	412	341	456	399	517	625	749	891	1 052	1 028	1 015	975	1 048

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 7 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Estrie, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	301	216	239	234	202	198	229	269	307	347	402	419	393	339	357	452
Hommes	107	83	73	69	75	97	97	107	131	148	172	175	178	143	150	188
Inconnu	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Total	408	299	312	303	277	296	326	376	438	495	574	594	571	482	508	640

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 8 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Montréal, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	1 638	1 338	1 328	1 262	1 338	1 487	1 765	1 929	2 150	2 246	2 415	2 298	2 264	2 373	2 397	2 696
Hommes	643	458	435	444	481	568	704	633	902	969	1 019	927	1 058	1 105	1 314	1 477
Inconnu	2	5	7	3	8	7	11	9	17	19	22	9	28	35	48	18
Total	2 283	1 801	1 770	1 709	1 827	2 062	2 480	2 571	3 069	3 234	3 456	3 234	3 350	3 513	3 759	4 191

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 9 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Outaouais, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	414	311	271	228	187	220	278	279	349	384	373	424	422	420	506	555
Hommes	101	68	60	50	50	59	72	92	120	134	122	136	167	165	199	235
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	515	379	331	278	237	279	350	372	469	518	495	560	589	585	705	790

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 10 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	341	266	204	208	171	147	127	205	188	222	229	223	236	246	252	225
Hommes	118	95	81	71	47	49	46	47	49	69	75	82	96	68	88	74
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	459	361	285	279	218	196	173	252	237	291	304	305	332	314	340	299

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 11 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Côte-Nord, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	260	227	223	198	146	173	205	172	168	187	206	233	229	193	236	212
Hommes	102	74	65	63	66	55	62	67	38	61	70	96	87	66	69	57
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	362	301	288	261	212	228	267	239	206	248	276	329	316	259	305	269

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 12 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Nord-du-Québec, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	47	25	28	15	10	12	15	12	9	21	27	31	29	25	23	11
Hommes	16	17	6	8	3	1	7	4	7	5	8	9	10	5	6	2
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	63	42	34	23	13	13	22	16	16	26	35	40	39	30	29	13

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 13 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	132	79	62	60	42	22	20	44	62	70	85	109	84	80	74	74
Hommes	63	29	18	10	14	9	3	16	25	25	30	23	24	27	24	32
Inconnu	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	3
Total	196	109	80	70	56	31	23	60	88	95	115	132	108	110	99	109

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 14 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	220	165	115	160	145	171	161	188	211	215	240	286	288	264	250	236
Hommes	88	65	46	59	66	60	66	77	94	104	128	141	130	131	102	120
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	308	230	161	219	211	231	227	265	305	319	368	427	418	395	352	356

Source des numérateurs : Registre MAD0, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 15 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Laval, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	310	199	164	132	186	200	212	274	284	351	360	409	417	408	458	507
Hommes	159	81	70	50	47	84	88	101	118	132	150	174	179	195	195	253
Inconnu	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	469	282	235	182	233	284	300	375	402	483	510	583	596	603	653	760

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 16 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Lanaudière, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	263	234	169	177	220	187	292	297	278	304	388	412	451	497	494	670
Hommes	95	88	60	61	51	66	107	90	122	98	121	136	129	187	178	211
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	358	322	229	238	271	253	399	387	400	402	509	548	580	684	672	881

Source des numérateurs : Registre MAD0, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 17 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Laurentides, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	488	353	331	296	273	297	300	387	498	604	642	676	634	612	674	763
Hommes	155	138	108	86	62	95	101	118	150	184	224	259	242	246	247	270
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Total	643	491	439	382	335	392	401	505	648	788	866	935	876	859	922	1 035

Source des numérateurs : Registre MAD0, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 18 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Montérégie, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	921	758	736	587	586	650	726	873	969	1 009	1 127	1 232	1 140	1 184	1 345	1 565
Hommes	300	278	233	193	182	217	241	281	339	314	359	433	382	419	481	571
Inconnu	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1 221	1 036	969	780	769	868	968	1 155	1 308	1 323	1 486	1 665	1 522	1 603	1 826	2 136

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 19 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Nunavik, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	253	217	206	261	194	160	191	185	246	289	216	209	194	201	194	219
Hommes	67	49	49	64	65	71	75	66	88	81	78	74	73	69	87	94
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Total	320	266	255	325	259	231	266	251	334	370	294	283	267	270	283	313

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 20 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	85	99	103	83	66	121	76	61	78	84	126	145	155	164	165	174
Hommes	2	3	8	7	10	14	6	3	12	18	23	38	33	42	41	60
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	87	102	111	90	76	135	82	64	90	102	149	183	188	206	206	234

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Province de Québec*												
1993	18	133	3 354	3 316	1 541	734	326	278	59	15	0	9 975
1994	13	116	2 663	2 600	1 153	596	327	243	45	17	0	7 896
1995	8	82	2 317	2 520	1 046	519	226	175	37	13	0	7 037
1996	4	71	2 152	2 401	939	503	229	182	52	11	0	6 644
1997	4	71	2 139	2 284	944	434	239	154	36	11	0	6 436
1998	8	83	2 315	2 667	1 086	509	269	137	42	12	0	7 223
1999	4	76	2 587	2 990	1 165	542	277	203	43	8	0	7 970
2000	2	93	2 840	3 280	1 266	530	313	212	58	11	0	8 685
2001	3	97	3 143	3 850	1 614	701	342	287	51	21	0	10 167
2002	1	106	3 355	4 255	1 769	752	391	303	61	12	0	11 066
2003	7	127	3 706	4 706	1 963	882	427	329	78	15	0	12 285
2004	4	97	3 819	4 883	2 204	906	452	348	80	18	0	12 848
2005	2	98	3 517	4 682	2 336	1 006	461	394	115	30	0	12 701
2006	3	98	3 534	4 735	2 356	963	527	419	111	31	0	12 835
2007	2	99	3 931	4 785	2 365	1 050	539	458	138	37	0	13 465
2008	1	108	4 585	5 261	2 594	1 154	609	491	129	23	0	15 002
Province de Québec hors Montréal												
1993	16	101	2 669	2 591	1 179	527	244	197	47	12	0	7 689
1994	11	96	2 099	2 007	882	433	257	177	39	12	0	6 095
1995	7	58	1 784	1 897	776	362	167	131	27	11	0	5 267
1996	4	59	1 683	1 792	655	349	165	135	40	9	0	4 935
1997	4	51	1 603	1 662	650	295	168	97	25	7	0	4 609
1998	7	65	1 697	1 916	758	355	188	102	27	10	0	5 161
1999	3	58	1 871	2 077	783	337	166	131	30	6	0	5 490
2000	1	74	2 076	2 351	863	349	188	131	46	10	0	6 114
2001	2	75	2 382	2 692	1 060	431	213	173	35	15	0	7 098
2002	1	89	2 601	2 993	1 179	461	243	191	39	5	0	7 832
2003	7	90	2 909	3 398	1 298	569	252	218	50	10	0	8 829
2004	3	71	3 069	3 702	1 546	611	311	225	44	11	0	9 614
2005	1	81	2 774	3 541	1 654	667	305	232	69	15	0	9 351
2006	2	80	2 771	3 503	1 648	630	345	248	59	18	0	9 322
2007	1	76	3 088	3 544	1 639	672	319	261	73	24	0	9 706
2008	1	86	3 631	3 819	1 799	747	349	280	63	16	0	10 811

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1993	0	2	102	95	48	26	12	9	1	0	0	297
1994	0	1	62	91	23	18	12	5	1	0	0	216
1995	0	0	76	86	28	6	5	4	0	0	0	206
1996	0	1	54	63	18	12	5	3	3	0	0	163
1997	0	2	58	83	23	12	2	2	0	0	0	182
1998	2	0	84	105	29	15	5	8	0	0	0	248
1999	1	0	51	58	17	10	3	3	0	0	0	146
2000	0	1	30	59	26	8	8	4	3	1	0	141
2001	0	0	53	75	28	15	7	6	0	4	0	190
2002	1	0	54	93	46	14	7	7	3	0	0	232
2003	1	1	76	125	60	20	5	4	0	0	0	293
2004	0	1	79	105	30	19	9	10	3	0	0	256
2005	0	2	83	111	61	28	12	6	0	0	0	303
2006	0	2	55	127	41	12	10	4	0	0	0	251
2007	0	1	62	84	40	11	4	6	2	0	0	210
2008	0	2	64	91	54	14	6	4	1	0	0	236
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1993	3	4	182	195	70	31	16	11	1	1	0	540
1994	1	6	137	152	57	21	13	8	0	0	0	415
1995	1	3	133	142	39	25	5	7	2	1	0	373
1996	0	6	157	120	33	16	8	6	2	0	0	359
1997	1	0	87	106	39	11	11	5	0	0	0	271
1998	0	2	87	101	34	25	8	4	2	2	0	276
1999	0	1	80	142	61	21	11	6	2	0	0	327
2000	0	3	132	138	37	15	8	5	1	0	0	339
2001	0	4	79	125	44	28	7	8	0	0	0	302
2002	0	0	103	169	58	29	10	10	1	0	0	387
2003	2	1	136	160	60	20	9	9	4	0	0	412
2004	0	1	145	176	80	16	16	10	1	0	0	447
2005	1	0	107	155	68	37	7	9	2	1	0	388
2006	0	3	99	168	70	29	12	5	3	0	0	390
2007	0	0	119	170	67	29	10	12	3	0	0	412
2008	0	0	115	133	72	30	13	8	0	0	0	372

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1993	0	5	266	356	137	75	29	24	2	0	0	901
1994	1	7	204	275	133	48	34	26	4	2	0	747
1995	0	4	155	230	93	40	15	13	2	1	0	562
1996	2	5	154	258	73	38	11	20	5	2	0	571
1997	1	5	189	269	83	54	18	20	3	4	0	648
1998	0	5	224	278	119	58	36	15	4	2	0	744
1999	2	6	235	336	124	53	22	25	6	3	0	814
2000	1	7	210	321	143	41	33	28	7	3	0	800
2001	1	3	272	431	187	75	23	32	11	3	0	1 040
2002	0	6	236	437	179	70	32	34	7	1	0	1 004
2003	0	6	302	526	224	86	52	40	10	3	0	1 252
2004	0	2	346	529	245	81	29	27	7	3	0	1 275
2005	0	16	271	510	248	78	55	35	13	2	0	1 230
2006	0	4	276	521	261	89	42	46	18	5	0	1 266
2007	0	6	266	496	267	77	36	39	15	6	0	1 209
2008	0	4	347	490	264	97	57	36	13	6	0	1 320
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1993	0	10	179	191	88	29	21	12	4	1	0	542
1994	0	3	162	158	83	42	22	16	1	3	0	497
1995	0	4	130	149	44	35	16	17	1	1	0	397
1996	0	6	136	139	61	28	18	18	2	2	0	412
1997	0	3	124	130	48	15	11	3	0	1	0	341
1998	0	5	123	202	71	29	10	8	1	0	0	456
1999	0	1	117	174	57	15	12	12	3	0	0	399
2000	0	6	170	217	69	28	5	10	6	2	0	517
2001	0	8	220	240	92	30	16	14	3	0	0	625
2002	0	6	258	315	112	25	12	13	1	2	0	749
2003	0	9	304	353	131	48	25	16	1	0	0	891
2004	1	8	314	432	184	58	29	19	4	1	0	1 052
2005	0	8	275	407	202	72	36	19	5	1	0	1 028
2006	0	9	264	382	203	72	45	31	4	4	0	1 015
2007	0	9	282	339	183	92	41	25	4	0	0	975
2008	0	10	348	375	181	59	35	35	3	0	0	1 048

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1993	0	9	167	132	57	17	6	7	2	1	0	408
1994	0	8	100	120	28	21	12	5	3	1	0	299
1995	0	1	110	119	41	15	8	8	4	2	0	312
1996	0	1	90	120	45	20	11	14	2	0	0	303
1997	0	1	96	106	42	11	17	3	1	0	0	277
1998	0	1	91	126	41	18	14	5	0	0	0	296
1999	0	0	96	144	41	19	13	10	3	0	0	326
2000	0	1	119	170	46	21	9	6	4	0	0	376
2001	0	3	144	174	64	28	7	13	3	2	0	438
2002	0	9	151	214	67	27	11	13	3	0	0	495
2003	0	4	170	252	90	31	12	13	2	0	0	574
2004	0	3	193	225	94	45	17	10	5	1	0	594
2005	0	3	145	245	111	36	12	13	5	1	0	571
2006	0	2	115	178	104	46	20	11	4	2	0	482
2007	0	3	149	202	84	28	19	18	3	2	0	508
2008	1	5	176	253	121	48	20	12	4	0	0	640
06 - Montréal												
1993	2	32	685	722	362	207	82	81	12	3	0	2 283
1994	2	20	564	593	271	163	70	66	6	5	0	1 801
1995	1	24	533	623	270	157	59	44	10	2	0	1 770
1996	0	12	469	609	284	154	64	47	12	2	0	1 709
1997	0	20	536	622	294	139	71	57	11	4	0	1 827
1998	1	18	618	751	328	154	81	35	15	2	0	2 062
1999	1	18	716	913	382	205	111	72	13	2	0	2 480
2000	1	19	764	929	403	181	125	81	12	1	0	2 571
2001	1	22	761	1 158	554	270	129	114	16	6	0	3 069
2002	0	17	754	1 262	590	291	148	112	22	7	0	3 234
2003	0	37	797	1 308	665	313	175	111	28	5	0	3 456
2004	1	26	750	1 181	658	295	141	123	36	7	0	3 234
2005	1	17	743	1 141	682	339	156	162	46	15	0	3 350
2006	1	18	763	1 232	708	333	182	171	52	13	0	3 513
2007	1	23	843	1 241	726	378	220	197	65	13	0	3 759
2008	0	22	954	1 442	795	407	260	211	66	7	0	4 191

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1993	4	4	180	162	85	46	17	14	0	0	0	515
1994	0	3	119	124	60	31	20	17	2	0	0	379
1995	0	1	97	126	46	25	20	12	2	0	0	331
1996	2	3	95	96	43	16	7	6	0	0	0	278
1997	0	3	71	90	39	14	11	4	1	0	0	237
1998	1	4	80	98	52	17	10	7	7	0	0	279
1999	0	2	137	114	60	21	8	5	0	0	0	350
2000	0	8	113	141	57	26	15	7	1	0	0	372
2001	0	3	141	185	74	34	16	13	2	0	0	469
2002	0	3	179	201	73	25	13	19	1	1	0	518
2003	0	1	171	188	71	34	10	15	4	0	0	495
2004	0	2	173	209	91	47	19	13	4	0	0	560
2005	0	0	153	254	105	30	27	14	3	1	0	589
2006	0	3	200	209	94	41	18	18	2	0	0	585
2007	0	6	231	244	137	46	18	20	2	1	0	705
2008	0	4	259	283	134	63	19	26	2	0	0	790
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1993	1	11	154	121	77	31	31	23	8	2	0	459
1994	1	7	159	91	48	31	14	6	3	1	0	361
1995	0	4	114	76	47	23	8	11	2	0	0	285
1996	0	1	109	101	24	28	8	5	2	1	0	279
1997	0	6	100	62	30	10	6	3	1	0	0	218
1998	0	2	94	60	23	15	1	1	0	0	0	196
1999	0	4	72	53	22	12	3	3	3	0	0	173
2000	0	7	91	92	34	17	3	5	3	0	0	252
2001	0	3	89	89	31	12	6	6	1	0	0	237
2002	0	6	122	96	32	18	10	6	1	0	0	291
2003	0	6	110	111	41	18	7	9	0	0	0	304
2004	0	8	96	111	51	24	9	4	1	0	0	305
2005	0	6	95	130	57	29	7	2	4	0	0	332
2006	0	4	107	113	54	17	13	6	0	0	0	314
2007	0	3	117	134	48	13	11	8	4	2	0	340
2008	0	4	105	92	52	25	14	5	2	0	0	299

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1993	0	11	151	109	47	23	10	3	2	1	0	362
1994	2	11	115	81	50	24	9	8	1	0	0	301
1995	3	5	112	83	55	20	6	3	0	1	0	288
1996	0	5	94	92	33	25	9	2	0	0	0	261
1997	1	6	78	72	27	14	9	2	1	0	0	212
1998	1	8	75	76	39	18	6	3	0	1	0	228
1999	0	7	110	82	32	23	7	6	0	0	0	267
2000	0	5	94	71	35	20	5	5	1	1	0	239
2001	0	6	70	69	41	9	4	5	0	1	0	206
2002	0	7	92	83	37	12	6	6	0	0	0	248
2003	0	7	100	101	38	16	5	6	1	0	0	276
2004	0	6	113	113	51	24	16	5	1	0	0	329
2005	0	8	122	92	47	27	9	10	1	0	0	316
2006	0	12	88	88	43	12	8	8	0	0	0	259
2007	0	13	123	93	39	24	6	5	1	1	0	305
2008	0	9	110	89	36	13	4	6	2	0	0	269
10 - Nord-du-Québec												
1993	0	0	41	17	2	2	1	0	0	0	0	63
1994	1	1	16	12	7	4	0	0	0	0	0	42
1995	0	0	21	7	0	2	2	1	0	0	0	34
1996	0	0	6	10	3	3	0	0	1	0	0	23
1997	0	0	8	1	2	1	1	0	0	0	0	13
1998	0	0	7	3	0	1	1	1	0	0	0	13
1999	0	0	7	9	3	0	2	1	0	0	0	22
2000	0	1	8	4	1	0	1	1	0	0	0	16
2001	0	0	7	6	1	0	1	1	0	0	0	16
2002	0	0	13	8	2	2	1	0	0	0	0	26
2003	0	0	14	15	5	0	0	0	1	0	0	35
2004	1	0	13	12	9	4	1	0	0	0	0	40
2005	0	1	10	16	7	3	2	0	0	0	0	39
2006	0	0	8	15	3	2	1	1	0	0	0	30
2007	0	1	6	14	3	3	2	0	0	0	0	29
2008	0	0	7	4	0	2	0	0	0	0	0	13

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1993	0	4	63	62	29	20	5	10	2	0	0	196
1994	0	2	29	31	16	13	7	6	1	0	0	109
1995	0	1	21	28	8	12	6	0	1	1	0	80
1996	0	1	22	30	5	8	2	1	0	0	0	70
1997	1	1	19	12	10	3	3	5	0	0	0	56
1998	0	0	8	9	7	3	1	2	1	0	0	31
1999	0	1	6	9	4	2	0	1	0	0	0	23
2000	0	0	24	19	12	0	3	0	0	0	0	60
2001	0	2	32	31	6	7	5	1	1	1	0	88
2002	0	0	22	54	6	7	4	1	0	0	0	95
2003	0	3	47	35	12	9	5	3	0	0	0	115
2004	0	1	44	45	22	10	4	5	0	0	0	132
2005	0	1	32	40	27	3	4	0	0	0	0	108
2006	0	1	29	40	25	4	1	2	0	0	0	110
2007	0	0	39	28	12	7	4	3	3	0	0	99
2008	0	0	29	34	27	4	4	3	2	0	0	109
12 - Chaudière-Appalaches												
1993	0	0	86	119	49	24	13	9	1	0	0	308
1994	0	1	74	68	40	22	12	9	0	0	0	230
1995	0	0	43	62	34	11	5	3	2	0	0	161
1996	0	1	67	80	33	21	12	3	0	1	0	219
1997	0	0	71	72	32	16	12	2	1	0	0	211
1998	1	2	62	94	35	22	5	5	1	0	0	231
1999	0	0	69	102	29	9	7	8	1	0	0	227
2000	0	0	75	107	44	15	8	9	2	2	0	265
2001	1	2	83	142	50	14	6	6	0	0	0	305
2002	0	1	86	137	60	17	12	5	1	0	0	319
2003	0	3	84	170	64	32	6	6	1	1	0	368
2004	0	1	111	182	76	33	10	12	1	0	0	427
2005	0	4	96	163	90	33	15	9	5	3	0	418
2006	0	0	98	149	91	28	16	11	1	1	0	395
2007	1	1	81	143	68	30	11	11	3	3	0	352
2008	0	2	88	128	74	30	16	13	3	2	0	356

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1993	1	2	164	153	80	26	11	14	3	4	0	469
1994	1	4	122	86	33	18	7	5	3	2	0	282
1995	1	2	85	85	36	16	4	4	1	0	0	235
1996	0	2	71	64	20	10	8	5	1	1	0	182
1997	0	4	99	79	28	9	5	6	2	0	0	233
1998	0	5	94	105	41	18	11	4	2	3	0	284
1999	0	6	112	104	35	21	8	11	3	0	0	300
2000	0	3	130	130	59	28	14	6	4	0	0	375
2001	0	3	117	161	65	26	14	13	2	0	0	402
2002	0	3	160	174	73	29	27	14	3	0	0	483
2003	0	1	170	197	68	31	20	18	5	0	0	510
2004	0	0	182	235	90	36	21	16	3	0	0	583
2005	0	1	177	223	109	42	17	21	4	1	0	596
2006	0	2	200	231	106	27	22	10	3	2	0	603
2007	0	0	227	226	102	48	24	16	7	2	0	653
2008	0	3	269	247	124	61	17	33	6	0	0	760
14 - Lanaudière												
1993	2	7	142	106	59	15	10	8	4	0	0	358
1994	1	4	123	86	48	22	16	16	2	1	0	322
1995	1	8	81	70	31	12	9	13	2	0	0	229
1996	0	2	100	82	27	10	10	6	0	0	0	238
1997	0	1	108	91	23	21	8	9	0	0	0	271
1998	0	10	101	84	31	11	10	4	1	0	0	253
1999	0	5	151	142	59	23	9	6	2	0	0	399
2000	0	7	137	158	50	22	7	5	1	0	0	387
2001	0	8	142	140	62	18	19	10	1	0	0	400
2002	0	4	147	143	60	20	13	9	6	0	0	402
2003	0	14	190	162	69	38	17	13	4	1	0	509
2004	0	11	172	210	76	37	19	17	1	2	0	548
2005	0	5	213	198	95	32	18	17	1	1	0	580
2006	0	5	245	239	106	49	21	15	4	0	0	684
2007	0	4	234	234	98	55	22	19	4	2	0	672
2008	0	3	369	296	117	49	21	20	4	1	0	881

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1993	0	9	238	210	102	32	25	17	7	1	0	643
1994	0	9	172	177	64	21	27	13	6	0	0	491
1995	0	6	143	156	77	23	25	7	2	0	0	439
1996	0	6	132	136	47	21	22	5	12	1	0	382
1997	0	4	120	108	64	12	18	6	3	0	0	335
1998	0	3	133	143	56	18	23	12	3	1	0	392
1999	0	7	172	136	52	19	7	7	0	1	0	401
2000	0	7	199	182	61	28	13	10	5	0	0	505
2001	0	7	275	227	74	31	17	13	3	1	0	648
2002	0	10	310	271	108	55	19	12	3	0	0	788
2003	0	11	342	322	97	54	24	10	3	3	0	866
2004	0	6	362	347	114	50	29	21	5	1	0	935
2005	0	5	319	313	114	63	22	26	13	1	0	876
2006	0	6	305	315	121	52	30	25	3	0	0	859
2007	0	4	355	318	124	58	34	21	7	0	0	922
2008	0	8	382	384	137	57	37	19	8	1	0	1 035
16 - Montérégie												
1993	2	17	422	423	180	96	30	25	6	1	0	1 221
1994	1	16	379	334	129	74	44	32	10	1	0	1 036
1995	0	14	359	355	125	59	22	22	5	2	0	969
1996	0	10	276	277	109	46	18	30	5	0	0	780
1997	0	8	288	278	97	45	19	19	10	1	0	769
1998	0	9	339	330	110	42	20	13	3	1	0	868
1999	0	11	363	365	128	52	26	18	2	1	0	968
2000	0	15	446	445	136	47	37	20	6	1	0	1 155
2001	0	20	505	483	165	73	37	19	4	2	0	1 308
2002	0	20	518	479	179	65	28	26	7	1	0	1 323
2003	2	14	548	553	203	85	37	36	6	2	0	1 486
2004	1	17	583	628	249	91	55	34	4	2	0	1 665
2005	0	13	524	549	240	108	34	42	9	3	0	1 522
2006	0	16	528	577	247	109	65	43	13	4	0	1 603
2007	0	11	636	659	288	113	53	50	12	3	0	1 826
2008	0	16	752	769	324	149	63	49	9	5	0	2 136

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1993	3	5	98	104	57	32	6	11	3	0	0	320
1994	2	10	84	89	47	16	8	5	2	1	0	266
1995	1	2	64	80	53	35	11	5	1	2	0	255
1996	0	5	90	89	68	42	16	10	4	1	0	325
1997	0	7	58	78	46	44	15	8	2	1	0	259
1998	2	8	50	57	43	36	26	7	0	0	0	231
1999	0	6	66	79	41	33	25	8	5	1	0	266
2000	0	2	78	74	40	30	16	10	1	0	0	251
2001	0	3	117	89	57	26	25	11	4	1	0	334
2002	0	10	119	88	68	37	33	14	1	0	0	370
2003	2	9	90	77	42	32	14	19	8	0	0	294
2004	0	2	77	89	56	21	19	16	2	1	0	283
2005	0	4	78	83	40	25	24	9	4	0	0	267
2006	2	2	87	76	48	24	16	12	3	0	0	270
2007	0	5	79	98	48	30	14	6	3	0	0	283
2008	0	9	120	83	53	21	14	8	4	1	0	313
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1993	0	1	34	36	12	2	1	0	1	0	0	87
1994	0	3	42	32	16	7	0	0	0	0	0	102
1995	0	3	40	43	19	3	0	1	0	0	0	111
1996	0	4	30	35	13	5	0	1	1	0	0	90
1997	0	0	29	25	17	3	2	0	0	0	0	76
1998	0	1	45	45	27	9	1	3	2	0	0	135
1999	0	1	27	28	18	4	3	1	0	0	0	82
2000	0	1	20	23	13	3	3	0	1	0	0	64
2001	0	0	36	25	19	5	3	2	0	0	0	90
2002	0	4	31	31	19	9	5	2	1	0	0	102
2003	0	0	55	51	23	15	4	1	0	0	0	149
2004	0	2	66	54	28	15	9	6	2	0	0	183
2005	0	4	74	52	33	21	4	0	0	0	0	188
2006	0	9	67	75	31	17	5	0	1	0	0	206
2007	0	9	82	62	31	8	10	2	0	2	0	206
2008	0	7	91	68	29	25	9	3	0	0	0	234

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Province de Québec*												
1993	12	127	2 889	2 371	992	448	206	125	30	8	0	7 349
1994	10	112	2 268	1 890	711	366	217	143	25	7	0	5 827
1995	6	77	1 992	1 863	711	319	130	85	21	8	0	5 276
1996	3	70	1 882	1 790	610	293	142	106	29	6	0	5 001
1997	3	68	1 883	1 689	598	237	131	89	16	7	0	4 802
1998	7	77	2 022	1 904	680	292	120	52	21	7	0	5 240
1999	1	73	2 281	2 141	740	280	139	84	23	4	0	5 817
2000	2	91	2 514	2 416	823	295	157	80	31	6	0	6 468
2001	2	92	2 775	2 716	978	376	155	119	23	7	0	7 284
2002	0	106	2 972	3 051	1 085	412	197	108	27	2	0	7 991
2003	5	124	3 244	3 351	1 202	483	203	148	35	3	0	8 825
2004	2	94	3 361	3 495	1 342	509	220	145	23	7	0	9 217
2005	0	95	3 102	3 335	1 403	546	215	157	39	11	0	8 925
2006	3	95	3 056	3 343	1 455	548	265	158	40	9	0	8 990
2007	1	95	3 402	3 346	1 412	538	283	165	39	10	0	9 308
2008	0	103	3 906	3 613	1 533	644	299	199	39	8	0	10 368
Province de Québec hors Montréal												
1993	11	97	2 297	1 852	768	332	160	91	23	7	0	5 708
1994	8	92	1 779	1 440	545	269	174	104	22	5	0	4 489
1995	5	55	1 519	1 371	534	234	105	68	17	8	0	3 948
1996	3	58	1 470	1 311	432	213	108	83	23	6	0	3 739
1997	3	48	1 404	1 211	420	171	98	60	12	3	0	3 464
1998	6	59	1 464	1 347	480	217	96	39	14	5	0	3 753
1999	1	57	1 639	1 473	499	192	94	57	19	3	0	4 052
2000	1	72	1 828	1 685	548	201	108	52	23	5	0	4 539
2001	2	71	2 094	1 863	639	237	110	80	18	5	0	5 134
2002	0	89	2 292	2 124	724	268	136	77	19	1	0	5 745
2003	5	87	2 545	2 352	798	325	137	114	26	3	0	6 410
2004	1	68	2 685	2 605	912	350	164	104	16	4	0	6 919
2005	0	78	2 432	2 495	983	369	156	114	24	4	0	6 661
2006	2	77	2 375	2 453	1 016	356	186	112	28	7	0	6 617
2007	1	74	2 678	2 484	984	354	186	112	25	8	0	6 911
2008	0	81	3 103	2 633	1 065	433	178	137	26	7	0	7 672

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1993	0	2	82	60	25	14	6	4	0	0	0	194
1994	0	1	49	46	17	9	7	5	1	0	0	137
1995	0	0	59	48	15	5	3	2	0	0	0	132
1996	0	1	37	38	7	7	4	0	1	0	0	97
1997	0	2	46	50	13	5	2	0	0	0	0	118
1998	2	0	64	50	14	7	2	5	0	0	0	144
1999	1	0	41	34	8	3	3	3	0	0	0	96
2000	0	1	27	42	13	3	4	2	1	0	0	93
2001	0	0	44	45	11	7	3	2	0	2	0	116
2002	0	0	44	59	22	7	1	5	1	0	0	140
2003	1	1	58	65	28	6	2	4	0	0	0	166
2004	0	1	60	68	6	10	4	6	0	0	0	155
2005	0	2	68	63	23	14	5	4	0	0	0	179
2006	0	2	39	71	23	7	3	1	0	0	0	146
2007	0	1	55	45	17	5	3	3	0	0	0	129
2008	0	2	48	54	28	5	3	1	1	0	0	142
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1993	1	3	170	141	40	21	12	5	0	0	0	412
1994	0	6	123	107	24	12	10	6	0	0	0	303
1995	1	3	115	97	31	15	2	3	1	1	0	280
1996	0	6	143	85	19	7	5	2	1	0	0	273
1997	1	0	77	73	21	4	6	3	0	0	0	194
1998	0	1	75	75	21	13	6	3	1	1	0	203
1999	0	1	72	113	38	9	6	3	1	0	0	244
2000	0	3	115	97	18	9	6	3	1	0	0	252
2001	0	4	72	88	28	20	3	4	0	0	0	224
2002	0	0	97	128	34	13	7	2	1	0	0	286
2003	1	1	122	113	41	10	3	3	4	0	0	307
2004	0	1	124	124	51	8	10	6	0	0	0	324
2005	0	0	100	112	39	18	5	3	1	0	0	279
2006	0	3	87	112	43	15	7	3	1	0	0	271
2007	0	0	99	116	44	15	6	1	1	0	0	283
2008	0	0	102	95	47	17	5	2	0	0	0	269

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1993	0	5	236	260	86	42	18	11	1	0	0	661
1994	1	6	175	204	76	33	27	15	3	1	0	548
1995	0	4	135	168	55	27	10	10	0	1	0	414
1996	2	5	129	188	45	18	6	13	3	1	0	413
1997	1	5	168	189	55	30	8	11	2	1	0	471
1998	0	4	193	205	73	34	16	4	2	0	0	533
1999	0	6	203	237	81	34	11	13	4	2	0	592
2000	1	7	179	234	90	27	21	10	3	2	0	578
2001	1	3	240	290	111	32	13	18	5	0	0	714
2002	0	6	205	309	102	40	14	17	5	0	0	700
2003	0	6	268	360	138	36	22	22	7	2	0	862
2004	0	2	304	377	146	38	14	13	3	1	0	900
2005	0	15	242	338	156	39	28	19	6	1	0	844
2006	0	4	244	372	150	48	26	21	9	1	0	878
2007	0	6	219	358	158	43	16	15	5	2	0	823
2008	0	3	293	344	154	50	27	10	4	2	0	891
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1993	0	10	157	134	55	19	13	10	3	0	0	406
1994	0	3	141	107	45	25	13	10	1	2	0	352
1995	0	4	108	98	26	20	7	7	1	0	0	271
1996	0	6	120	105	41	17	10	12	2	2	0	317
1997	0	3	112	92	27	8	4	2	0	1	0	253
1998	0	5	100	140	45	15	4	2	1	0	0	315
1999	0	1	99	124	39	10	5	3	2	0	0	288
2000	0	6	144	152	47	14	1	2	3	0	0	370
2001	0	6	186	153	57	12	9	7	2	0	0	433
2002	0	6	224	213	61	12	6	7	0	0	0	532
2003	0	9	266	239	87	31	13	7	0	0	0	654
2004	1	8	277	285	105	33	13	7	3	0	0	732
2005	0	8	231	258	120	39	19	6	3	1	0	687
2006	0	9	212	270	116	38	23	16	1	3	0	689
2007	0	8	233	221	102	47	24	12	1	0	0	648
2008	0	10	290	242	99	31	15	18	1	0	0	707

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1993	0	9	142	88	34	11	5	4	0	1	0	301
1994	0	8	85	86	14	13	6	2	1	0	0	216
1995	0	1	92	85	31	10	7	5	3	2	0	239
1996	0	1	87	89	33	9	7	8	0	0	0	234
1997	0	1	81	75	28	6	8	2	1	0	0	202
1998	0	1	78	77	19	12	8	3	0	0	0	198
1999	0	0	83	103	24	6	6	6	1	0	0	229
2000	0	1	107	119	27	10	3	1	1	0	0	269
2001	0	3	124	121	35	17	1	4	1	1	0	307
2002	0	9	130	140	41	17	5	3	2	0	0	347
2003	0	4	152	170	47	15	7	7	0	0	0	402
2004	0	3	166	156	54	28	6	4	1	0	0	419
2005	0	3	131	173	53	22	3	7	1	0	0	393
2006	0	1	104	127	60	31	8	3	4	1	0	339
2007	0	3	138	141	46	7	14	6	1	1	0	357
2008	0	5	150	173	74	28	15	6	1	0	0	452
06 - Montréal												
1993	1	30	592	516	224	116	46	34	7	1	0	1 638
1994	2	20	489	450	166	97	43	39	3	2	0	1 338
1995	1	22	473	492	177	85	25	17	4	0	0	1 328
1996	0	12	412	479	178	80	34	23	6	0	0	1 262
1997	0	20	479	478	178	66	33	29	4	4	0	1 338
1998	1	18	558	557	200	75	24	13	7	2	0	1 487
1999	0	16	642	668	241	88	45	27	4	1	0	1 765
2000	1	19	686	731	275	94	49	28	8	1	0	1 929
2001	0	21	681	853	339	139	45	39	5	2	0	2 150
2002	0	17	680	927	361	144	61	31	8	1	0	2 246
2003	0	37	699	999	404	158	66	34	9	0	0	2 415
2004	1	26	676	890	430	159	56	41	7	3	0	2 298
2005	0	17	670	840	420	177	59	43	15	7	0	2 264
2006	1	18	681	890	439	192	79	46	12	2	0	2 373
2007	0	21	724	862	428	184	97	53	14	2	0	2 397
2008	0	22	803	980	468	211	121	62	13	1	0	2 696

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1993	3	3	159	129	61	33	12	13	0	0	0	414
1994	0	3	108	99	47	20	15	15	2	0	0	311
1995	0	1	81	101	38	22	16	8	2	0	0	271
1996	1	3	85	77	29	14	7	3	0	0	0	228
1997	0	2	66	72	25	10	8	2	0	0	0	187
1998	1	4	73	81	42	8	5	0	3	0	0	220
1999	0	1	125	89	39	14	5	2	0	0	0	278
2000	0	8	101	104	38	12	10	3	1	0	0	279
2001	0	2	130	137	46	21	7	4	1	0	0	349
2002	0	3	163	137	52	14	10	4	0	0	0	384
2003	0	1	150	140	50	22	4	6	0	0	0	373
2004	0	2	160	150	62	31	10	6	1	0	0	424
2005	0	0	141	182	61	14	16	6	0	1	0	422
2006	0	3	167	150	63	20	11	5	1	0	0	420
2007	0	6	205	168	83	21	12	11	0	0	0	506
2008	0	4	225	183	79	39	10	14	1	0	0	555
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1993	1	11	131	84	57	22	23	7	3	2	0	341
1994	1	7	129	59	37	17	10	4	2	0	0	266
1995	0	4	90	53	34	12	6	5	0	0	0	204
1996	0	1	99	67	14	16	6	4	1	0	0	208
1997	0	6	84	46	23	6	4	2	0	0	0	171
1998	0	2	80	43	11	10	1	0	0	0	0	147
1999	0	4	63	35	13	8	0	1	3	0	0	127
2000	0	7	85	75	23	11	0	1	3	0	0	205
2001	0	3	81	69	22	7	3	2	1	0	0	188
2002	0	6	107	70	18	14	5	2	0	0	0	222
2003	0	6	92	81	25	14	5	6	0	0	0	229
2004	0	8	83	81	26	14	8	2	1	0	0	223
2005	0	6	76	92	38	16	6	1	1	0	0	236
2006	0	4	97	83	37	12	12	1	0	0	0	246
2007	0	3	99	91	35	8	7	5	2	2	0	252
2008	0	3	94	63	31	20	11	2	1	0	0	225

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1993	0	11	119	71	35	13	4	1	1	1	0	260
1994	1	11	94	66	34	13	4	3	1	0	0	227
1995	2	4	101	59	39	10	5	2	0	1	0	223
1996	0	5	76	72	23	15	5	1	0	0	0	198
1997	1	5	64	46	16	7	6	0	0	0	0	146
1998	0	7	68	52	23	15	5	2	0	0	0	173
1999	0	7	94	57	20	19	5	3	0	0	0	205
2000	0	4	80	47	21	12	3	2	0	1	0	172
2001	0	5	66	56	27	5	4	3	0	1	0	168
2002	0	7	79	57	26	9	2	3	0	0	0	187
2003	0	7	83	69	26	11	4	5	0	0	0	206
2004	0	4	93	81	31	13	9	2	0	0	0	233
2005	0	7	100	59	31	19	5	7	1	0	0	229
2006	0	11	73	63	30	6	5	5	0	0	0	193
2007	0	13	102	73	29	12	4	2	1	0	0	236
2008	0	8	95	65	25	8	4	5	2	0	0	212
10 - Nord-du-Québec												
1993	0	0	34	10	0	2	1	0	0	0	0	47
1994	1	1	13	5	4	1	0	0	0	0	0	25
1995	0	0	19	4	0	2	1	1	0	0	0	28
1996	0	0	6	6	2	1	0	0	0	0	0	15
1997	0	0	7	0	1	1	1	0	0	0	0	10
1998	0	0	7	3	0	1	1	0	0	0	0	12
1999	0	0	7	5	2	0	1	0	0	0	0	15
2000	0	1	6	3	0	0	1	1	0	0	0	12
2001	0	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0	9
2002	0	0	13	4	1	2	1	0	0	0	0	21
2003	0	0	13	10	3	0	0	0	1	0	0	27
2004	0	0	13	9	5	3	1	0	0	0	0	31
2005	0	0	10	15	3	0	1	0	0	0	0	29
2006	0	0	8	13	2	1	0	1	0	0	0	25
2007	0	1	5	12	2	2	1	0	0	0	0	23
2008	0	0	7	2	0	2	0	0	0	0	0	11

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1993	0	4	51	42	19	12	1	3	0	0	0	132
1994	0	2	24	25	10	9	5	3	0	0	0	79
1995	0	1	19	23	4	9	2	0	1	1	0	62
1996	0	1	20	27	3	7	1	0	0	0	0	60
1997	0	1	17	10	8	1	2	2	0	0	0	42
1998	0	0	8	5	5	1	0	2	1	0	0	22
1999	0	1	5	8	3	2	0	1	0	0	0	20
2000	0	0	20	12	8	0	2	0	0	0	0	44
2001	0	2	27	17	3	5	4	1	1	0	0	62
2002	0	0	19	43	2	4	2	0	0	0	0	70
2003	0	3	41	25	9	3	3	0	0	0	0	85
2004	0	1	42	36	16	8	2	4	0	0	0	109
2005	0	1	30	31	18	1	2	0	0	0	0	84
2006	0	1	29	28	19	2	0	0	0	0	0	80
2007	0	0	35	21	7	3	2	2	2	0	0	74
2008	0	0	24	25	18	3	3	0	0	0	0	74
12 - Chaudière-Appalaches												
1993	0	0	78	80	28	17	11	2	0	0	0	220
1994	0	1	64	47	29	11	7	5	0	0	0	165
1995	0	0	35	43	25	6	3	1	1	0	0	115
1996	0	1	61	52	20	14	7	3	0	1	0	160
1997	0	0	62	51	15	7	6	1	0	0	0	145
1998	1	2	54	65	25	15	2	2	1	0	0	171
1999	0	0	58	68	20	5	5	4	0	0	0	161
2000	0	0	71	69	28	6	4	4	2	1	0	188
2001	1	2	73	98	26	5	1	5	0	0	0	211
2002	0	1	75	87	37	5	8	2	0	0	0	215
2003	0	2	70	111	31	19	2	3	0	1	0	240
2004	0	1	87	126	43	19	4	4	1	0	0	286
2005	0	4	84	121	49	19	8	0	2	1	0	288
2006	0	0	86	107	47	14	4	6	0	0	0	264
2007	1	1	75	101	39	18	7	6	1	1	0	250
2008	0	2	76	90	39	12	8	5	2	2	0	236

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1993	1	2	134	98	42	11	3	4	3	3	0	310
1994	0	4	99	57	19	11	5	1	1	1	0	199
1995	1	2	69	57	22	10	2	0	1	0	0	164
1996	0	2	56	45	14	7	5	2	1	0	0	132
1997	0	3	90	60	18	4	4	5	1	0	0	186
1998	0	4	80	72	22	10	5	2	1	3	0	200
1999	0	6	101	70	20	8	4	2	1	0	0	212
2000	0	3	115	95	32	16	9	2	1	0	0	274
2001	0	3	103	112	35	14	10	4	2	0	0	284
2002	0	3	140	122	46	17	14	8	1	0	0	351
2003	0	1	150	132	34	20	13	9	1	0	0	360
2004	0	0	154	164	50	19	13	8	1	0	0	409
2005	0	1	151	156	63	27	7	10	1	0	0	417
2006	0	2	165	145	69	12	9	4	2	0	0	408
2007	0	0	203	153	61	21	10	6	4	0	0	458
2008	0	3	222	155	65	36	6	18	2	0	0	507
14 - Lanaudière												
1993	1	6	122	71	41	7	8	3	2	0	0	263
1994	1	4	108	62	29	13	8	7	1	0	0	234
1995	0	7	64	44	26	9	7	10	1	0	0	169
1996	0	2	83	55	19	5	9	3	0	0	0	177
1997	0	1	95	67	18	18	5	8	0	0	0	220
1998	0	10	87	56	14	10	6	3	0	0	0	187
1999	0	5	135	97	32	12	8	1	1	0	0	292
2000	0	7	119	117	36	12	4	2	0	0	0	297
2001	0	8	116	95	38	12	7	2	0	0	0	278
2002	0	4	130	109	33	14	6	3	5	0	0	304
2003	0	14	171	109	49	24	9	9	2	0	0	388
2004	0	11	160	156	48	18	9	6	0	1	0	412
2005	0	5	184	160	60	19	13	10	0	0	0	451
2006	0	4	212	165	64	30	13	7	2	0	0	497
2007	0	4	205	169	63	28	14	10	1	0	0	494
2008	0	2	324	214	69	32	12	14	1	1	0	670

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1993	0	9	208	152	66	25	16	6	4	0	0	488
1994	0	9	141	127	35	13	18	6	4	0	0	353
1995	0	6	125	115	53	13	15	2	2	0	0	331
1996	0	6	121	99	30	15	14	3	7	1	0	296
1997	0	4	107	87	50	9	11	3	2	0	0	273
1998	0	2	120	108	41	11	11	3	1	0	0	297
1999	0	7	152	88	33	13	3	4	0	0	0	300
2000	0	6	179	127	38	17	10	6	4	0	0	387
2001	0	7	243	170	47	15	9	6	1	0	0	498
2002	0	10	273	208	66	33	10	3	1	0	0	604
2003	0	11	297	230	62	26	12	3	1	0	0	642
2004	0	6	320	233	66	28	12	7	3	1	0	676
2005	0	5	287	221	62	33	9	13	4	0	0	634
2006	0	6	258	210	81	23	17	16	1	0	0	612
2007	0	4	321	216	67	33	22	10	1	0	0	674
2008	0	7	338	262	83	42	16	10	5	0	0	763
16 - Montérégie												
1993	1	16	358	313	123	61	21	11	3	0	0	921
1994	1	15	313	241	72	50	31	19	4	0	0	758
1995	0	14	311	271	75	35	14	9	3	0	0	736
1996	0	10	237	204	73	23	12	19	3	0	0	587
1997	0	8	252	214	54	24	13	12	5	0	0	586
1998	0	8	301	228	72	24	10	4	1	1	0	650
1999	0	11	322	267	79	24	13	6	1	1	0	726
2000	0	15	395	319	87	26	16	11	2	1	0	873
2001	0	20	456	328	96	40	16	10	2	1	0	969
2002	0	20	467	349	113	34	15	8	2	1	0	1 009
2003	1	14	488	400	127	51	23	19	4	0	0	1 127
2004	0	16	519	455	144	53	27	16	1	1	0	1 232
2005	0	13	468	414	154	58	9	22	2	0	0	1 140
2006	0	16	470	420	155	70	31	14	6	2	0	1 184
2007	0	10	558	480	176	65	31	19	4	1	0	1 345
2008	0	16	655	557	197	82	32	24	1	1	0	1 565

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1993	3	5	83	84	44	20	5	7	2	0	0	253
1994	2	8	73	70	37	12	8	3	1	1	0	217
1995	1	1	57	63	46	27	5	2	1	2	0	206
1996	0	5	83	69	48	33	10	9	3	1	0	261
1997	0	7	49	58	34	28	9	7	1	1	0	194
1998	2	8	34	46	31	23	14	1	0	0	0	160
1999	0	6	54	52	31	21	17	4	5	0	0	191
2000	0	2	65	53	29	23	11	2	0	0	0	185
2001	0	3	96	61	41	20	16	6	2	0	0	246
2002	0	10	97	63	56	28	25	10	0	0	0	289
2003	2	7	76	54	23	24	13	10	6	0	0	216
2004	0	2	68	63	36	14	16	9	1	0	0	209
2005	0	4	64	58	26	17	17	6	2	0	0	194
2006	2	2	73	55	32	14	13	9	1	0	0	201
2007	0	5	61	69	29	22	5	2	1	0	0	194
2008	0	9	90	60	32	13	5	5	4	1	0	219
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1993	0	1	33	35	12	2	1	0	1	0	0	85
1994	0	3	40	32	16	7	0	0	0	0	0	99
1995	0	3	39	42	14	2	0	1	0	0	0	103
1996	0	3	27	33	12	5	0	1	1	0	0	83
1997	0	0	27	21	14	3	1	0	0	0	0	66
1998	0	1	42	41	22	8	0	3	2	0	0	121
1999	0	1	25	26	17	4	2	1	0	0	0	76
2000	0	1	20	20	13	3	3	0	1	0	0	61
2001	0	0	30	22	16	5	3	2	0	0	0	78
2002	0	4	29	26	14	5	5	0	1	0	0	84
2003	0	0	48	44	18	13	2	1	0	0	0	126
2004	0	2	55	41	23	13	6	4	0	0	0	145
2005	0	4	65	42	27	14	3	0	0	0	0	155
2006	0	9	51	62	25	13	4	0	0	0	0	164
2007	0	9	65	50	26	4	8	2	0	1	0	165
2008	0	7	70	49	25	13	6	3	0	0	0	174

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Province de Québec*												
1993	6	6	465	945	548	286	120	153	29	7	0	2 621
1994	3	4	395	706	440	229	110	100	20	10	0	2 058
1995	2	5	323	656	335	200	96	89	16	5	0	1 750
1996	1	1	270	610	329	209	86	76	23	5	0	1 635
1997	1	3	253	593	345	197	108	65	20	4	0	1 620
1998	1	6	291	760	405	217	149	85	21	5	0	1 969
1999	3	3	298	845	425	262	138	118	20	4	0	2 135
2000	0	2	324	859	440	234	156	131	27	5	0	2 199
2001	1	5	363	1 127	632	324	185	168	28	14	0	2 860
2002	1	0	382	1 200	681	340	193	195	34	10	0	3 048
2003	2	3	456	1 350	756	399	222	178	43	12	0	3 437
2004	2	3	458	1 385	858	397	231	202	57	11	0	3 616
2005	2	3	414	1 342	930	460	246	236	76	19	0	3 745
2006	0	3	475	1 386	898	414	261	261	71	22	0	3 805
2007	1	3	528	1 430	950	510	255	291	99	27	0	4 101
2008	1	5	677	1 645	1 058	510	309	291	89	15	0	4 610
Province de Québec hors Montréal												
1993	5	4	372	739	410	195	84	106	24	5	0	1 978
1994	3	4	320	566	336	163	83	73	17	7	0	1 600
1995	2	3	264	526	242	128	62	62	10	3	0	1 315
1996	1	1	213	480	223	136	57	52	17	3	0	1 191
1997	1	3	197	450	229	124	70	37	13	4	0	1 139
1998	1	6	231	566	278	138	92	63	13	5	0	1 401
1999	2	1	230	602	284	145	72	74	11	3	0	1 431
2000	0	2	246	662	315	148	80	79	23	5	0	1 566
2001	0	4	286	828	420	194	103	93	17	10	0	1 958
2002	1	0	309	868	454	193	107	114	20	4	0	2 079
2003	2	3	364	1 045	500	244	115	104	24	7	0	2 418
2004	2	3	384	1 095	633	261	147	121	28	7	0	2 689
2005	1	3	342	1 044	670	298	149	118	45	11	0	2 687
2006	0	3	396	1 050	631	274	159	136	31	11	0	2 700
2007	0	1	409	1 058	653	318	133	149	48	16	0	2 787
2008	1	5	528	1 186	734	314	171	143	37	9	0	3 133

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1993	0	0	20	35	23	12	6	5	1	0	0	103
1994	0	0	13	45	6	9	5	0	0	0	0	79
1995	0	0	17	38	13	1	2	2	0	0	0	74
1996	0	0	17	25	11	5	1	3	2	0	0	66
1997	0	0	12	33	10	7	0	2	0	0	0	64
1998	0	0	20	55	15	8	3	3	0	0	0	104
1999	0	0	10	24	9	7	0	0	0	0	0	50
2000	0	0	3	17	13	5	4	2	2	1	0	47
2001	0	0	9	30	17	8	4	4	0	2	0	74
2002	1	0	10	34	23	7	6	2	2	0	0	85
2003	0	0	18	60	32	14	3	0	0	0	0	127
2004	0	0	19	37	24	9	5	4	3	0	0	101
2005	0	0	15	48	38	14	7	2	0	0	0	124
2006	0	0	16	56	18	5	7	3	0	0	0	105
2007	0	0	7	39	23	6	1	3	2	0	0	81
2008	0	0	16	37	26	9	3	3	0	0	0	94
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1993	2	1	12	54	29	10	4	6	1	1	0	126
1994	1	0	14	44	33	9	3	2	0	0	0	109
1995	0	0	17	45	8	10	3	4	1	0	0	90
1996	0	0	14	34	14	9	3	4	1	0	0	81
1997	0	0	8	33	17	7	5	2	0	0	0	72
1998	0	1	11	26	13	12	2	1	1	1	0	70
1999	0	0	8	29	23	12	5	3	1	0	0	83
2000	0	0	17	41	19	6	2	2	0	0	0	87
2001	0	0	7	36	16	8	4	4	0	0	0	75
2002	0	0	6	41	24	16	3	8	0	0	0	101
2003	1	0	14	47	19	10	6	6	0	0	0	105
2004	0	0	21	52	28	8	6	4	1	0	0	122
2005	1	0	7	43	29	19	2	6	1	1	0	109
2006	0	0	12	56	27	14	5	2	2	0	0	119
2007	0	0	20	54	23	14	4	11	2	0	0	129
2008	0	0	13	38	25	13	8	6	0	0	0	103

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1993	0	0	30	96	51	33	11	13	1	0	0	240
1994	0	1	29	71	57	15	7	11	1	1	0	199
1995	0	0	20	62	38	13	5	3	2	0	0	148
1996	0	0	25	70	28	20	5	7	2	1	0	158
1997	0	0	21	80	28	24	10	9	1	3	0	177
1998	0	1	31	73	46	24	20	11	2	2	0	211
1999	2	0	32	99	43	19	11	12	2	1	0	222
2000	0	0	31	87	53	14	12	18	4	1	0	222
2001	0	0	32	141	75	43	10	14	6	3	0	325
2002	0	0	31	127	77	30	18	17	2	1	0	303
2003	0	0	34	165	86	50	30	18	3	1	0	389
2004	0	0	42	150	99	43	15	14	4	2	0	372
2005	0	1	29	171	92	39	27	16	7	1	0	385
2006	0	0	32	149	111	41	16	25	9	4	0	388
2007	0	0	47	137	108	34	20	24	10	4	0	384
2008	0	1	54	146	110	47	30	26	9	4	0	428
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1993	0	0	22	57	33	10	8	2	1	1	0	136
1994	0	0	21	51	38	17	9	6	0	1	0	145
1995	0	0	22	51	18	15	9	10	0	1	0	126
1996	0	0	16	34	20	11	8	6	0	0	0	95
1997	0	0	12	38	21	7	7	1	0	0	0	88
1998	0	0	23	60	26	14	6	6	0	0	0	139
1999	0	0	17	48	18	5	7	9	1	0	0	105
2000	0	0	26	61	22	14	4	8	3	2	0	141
2001	0	2	33	87	35	18	7	7	1	0	0	191
2002	0	0	34	102	51	13	6	6	1	2	0	217
2003	0	0	38	114	44	17	12	9	1	0	0	237
2004	0	0	37	147	79	25	16	12	1	1	0	318
2005	0	0	44	148	81	33	17	13	2	0	0	339
2006	0	0	52	112	86	34	22	15	3	1	0	325
2007	0	0	49	118	81	45	17	13	3	0	0	326
2008	0	0	58	133	82	28	20	17	2	0	0	341

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1993	0	0	25	44	23	6	1	3	2	0	0	107
1994	0	0	15	34	14	8	6	3	2	1	0	83
1995	0	0	18	34	10	5	1	3	1	0	0	73
1996	0	0	3	31	12	11	4	6	2	0	0	69
1997	0	0	15	31	14	5	9	1	0	0	0	75
1998	0	0	13	48	22	6	6	2	0	0	0	97
1999	0	0	13	41	17	13	7	4	2	0	0	97
2000	0	0	12	51	19	11	6	5	3	0	0	107
2001	0	0	20	53	29	11	6	9	2	1	0	131
2002	0	0	21	74	26	10	6	10	1	0	0	148
2003	0	0	18	82	43	16	5	6	2	0	0	172
2004	0	0	27	69	40	17	11	6	4	1	0	175
2005	0	0	14	72	58	14	9	6	4	1	0	178
2006	0	1	11	51	44	15	12	8	0	1	0	143
2007	0	0	11	60	38	21	5	12	2	1	0	150
2008	1	0	26	80	47	20	5	6	3	0	0	188
06 - Montréal												
1993	1	2	93	206	138	91	36	47	5	2	0	643
1994	0	0	75	140	104	66	27	27	3	3	0	458
1995	0	2	59	130	93	72	34	27	6	2	0	435
1996	0	0	57	130	106	73	29	24	6	2	0	444
1997	0	0	56	143	116	73	38	28	7	0	0	481
1998	0	0	60	194	127	79	57	22	8	0	0	568
1999	1	2	68	243	141	117	66	44	9	1	0	704
2000	0	0	78	197	125	86	76	52	4	0	0	633
2001	1	1	77	299	212	130	82	75	11	4	0	902
2002	0	0	73	332	227	147	86	81	14	6	0	969
2003	0	0	92	305	256	155	107	74	19	5	0	1 019
2004	0	0	74	290	225	136	84	81	29	4	0	927
2005	1	0	72	298	260	162	97	118	31	8	0	1 058
2006	0	0	79	336	267	140	102	125	40	11	0	1 105
2007	1	2	119	372	297	192	122	142	51	11	0	1 314
2008	0	0	149	459	324	196	138	148	52	6	0	1 477

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1993	1	1	21	33	24	13	5	1	0	0	0	101
1994	0	0	11	25	13	11	5	2	0	0	0	68
1995	0	0	16	25	8	3	4	4	0	0	0	60
1996	1	0	10	19	14	2	0	3	0	0	0	50
1997	0	1	5	18	14	4	3	2	1	0	0	50
1998	0	0	7	17	10	9	5	7	4	0	0	59
1999	0	1	12	25	21	7	3	3	0	0	0	72
2000	0	0	11	37	19	14	5	4	0	0	0	92
2001	0	1	11	48	28	13	9	9	1	0	0	120
2002	0	0	16	64	21	11	3	15	1	1	0	134
2003	0	0	21	48	21	12	6	9	4	0	0	122
2004	0	0	13	59	29	16	9	7	3	0	0	136
2005	0	0	12	72	44	16	11	8	3	0	0	167
2006	0	0	33	59	31	21	7	13	1	0	0	165
2007	0	0	26	76	54	25	6	9	2	1	0	199
2008	0	0	34	100	55	24	9	12	1	0	0	235
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1993	0	0	23	37	20	9	8	16	5	0	0	118
1994	0	0	30	32	11	14	4	2	1	1	0	95
1995	0	0	24	23	13	11	2	6	2	0	0	81
1996	0	0	10	34	10	12	2	1	1	1	0	71
1997	0	0	16	16	7	4	2	1	1	0	0	47
1998	0	0	14	17	12	5	0	1	0	0	0	49
1999	0	0	9	18	9	4	3	2	0	0	0	46
2000	0	0	6	17	11	6	3	4	0	0	0	47
2001	0	0	8	20	9	5	3	4	0	0	0	49
2002	0	0	15	26	14	4	5	4	1	0	0	69
2003	0	0	18	30	16	4	2	3	0	0	0	75
2004	0	0	13	30	25	10	1	2	0	0	0	82
2005	0	0	19	38	19	13	1	1	3	0	0	96
2006	0	0	10	30	17	5	1	5	0	0	0	68
2007	0	0	18	43	13	5	4	3	2	0	0	88
2008	0	1	11	29	21	5	3	3	1	0	0	74

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1993	0	0	32	38	12	10	6	2	1	0	0	102
1994	1	0	21	15	16	11	5	5	0	0	0	74
1995	1	1	11	24	16	10	1	1	0	0	0	65
1996	0	0	18	20	10	10	4	1	0	0	0	63
1997	0	1	14	26	11	7	3	2	1	0	0	66
1998	1	1	7	24	16	3	1	1	0	1	0	55
1999	0	0	16	25	12	4	2	3	0	0	0	62
2000	0	1	14	24	14	8	2	3	1	0	0	67
2001	0	1	4	13	14	4	0	2	0	0	0	38
2002	0	0	13	26	11	3	4	3	0	0	0	61
2003	0	0	17	32	12	5	1	1	1	0	0	70
2004	0	2	20	32	20	11	7	3	1	0	0	96
2005	0	1	22	33	16	8	4	3	0	0	0	87
2006	0	1	15	25	13	6	3	3	0	0	0	66
2007	0	0	21	20	10	12	2	3	0	1	0	69
2008	0	1	15	24	11	5	0	1	0	0	0	57
10 - Nord-du-Québec												
1993	0	0	7	7	2	0	0	0	0	0	0	16
1994	0	0	3	7	3	3	0	0	0	0	0	17
1995	0	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	6
1996	0	0	0	4	1	2	0	0	1	0	0	8
1997	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1999	0	0	0	4	1	0	1	1	0	0	0	7
2000	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4
2001	0	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	7
2002	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	5
2003	0	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	8
2004	1	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	9
2005	0	1	0	1	4	3	1	0	0	0	0	10
2006	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	5
2007	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	6
2008	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1993	0	0	12	20	10	8	4	7	2	0	0	63
1994	0	0	5	6	6	4	2	3	1	0	0	29
1995	0	0	2	5	4	3	4	0	0	0	0	18
1996	0	0	2	3	2	1	1	1	0	0	0	10
1997	1	0	2	2	2	2	1	3	0	0	0	14
1998	0	0	0	4	2	2	1	0	0	0	0	9
1999	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
2000	0	0	4	7	4	0	1	0	0	0	0	16
2001	0	0	4	14	3	2	1	0	0	1	0	25
2002	0	0	3	11	4	3	2	1	0	0	0	25
2003	0	0	6	10	3	6	2	3	0	0	0	30
2004	0	0	2	9	6	2	2	1	0	0	0	23
2005	0	0	2	9	9	2	2	0	0	0	0	24
2006	0	0	0	12	6	2	1	2	0	0	0	27
2007	0	0	4	7	5	4	2	1	1	0	0	24
2008	0	0	5	9	9	1	1	3	2	0	0	32
12 - Chaudière-Appalaches												
1993	0	0	8	39	21	7	2	7	1	0	0	88
1994	0	0	10	21	11	11	5	4	0	0	0	65
1995	0	0	8	19	9	5	2	2	1	0	0	46
1996	0	0	6	28	13	7	5	0	0	0	0	59
1997	0	0	9	21	17	9	6	1	1	0	0	66
1998	0	0	8	29	10	7	3	3	0	0	0	60
1999	0	0	11	34	9	4	2	4	1	0	0	66
2000	0	0	4	38	16	9	4	5	0	1	0	77
2001	0	0	10	44	24	9	5	1	0	0	0	94
2002	0	0	11	50	23	12	4	3	1	0	0	104
2003	0	1	14	59	33	13	4	3	1	0	0	128
2004	0	0	24	56	33	14	6	8	0	0	0	141
2005	0	0	12	42	41	14	7	9	3	2	0	130
2006	0	0	12	42	44	14	12	5	1	1	0	131
2007	0	0	6	42	29	12	4	5	2	2	0	102
2008	0	0	12	38	35	18	8	8	1	0	0	120

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1993	0	0	30	55	38	15	8	10	0	1	0	159
1994	1	0	23	29	13	6	2	4	2	1	0	81
1995	0	0	16	28	14	6	2	3	0	0	0	70
1996	0	0	15	19	6	3	3	3	0	1	0	50
1997	0	1	9	19	10	5	1	1	1	0	0	47
1998	0	1	14	33	19	8	6	2	1	0	0	84
1999	0	0	11	34	15	13	4	9	2	0	0	88
2000	0	0	15	35	27	12	5	4	3	0	0	101
2001	0	0	14	49	30	12	4	9	0	0	0	118
2002	0	0	20	52	27	12	13	6	2	0	0	132
2003	0	0	20	65	34	11	7	9	4	0	0	150
2004	0	0	28	71	40	17	8	8	2	0	0	174
2005	0	0	26	67	46	15	10	11	3	1	0	179
2006	0	0	35	86	37	15	13	6	1	2	0	195
2007	0	0	24	73	41	27	14	10	3	2	0	195
2008	0	0	47	92	59	25	11	15	4	0	0	253
14 - Lanaudière												
1993	1	1	20	35	18	8	2	5	2	0	0	95
1994	0	0	15	24	19	9	8	9	1	1	0	88
1995	1	1	17	26	5	3	2	3	1	0	0	60
1996	0	0	17	27	8	5	1	3	0	0	0	61
1997	0	0	13	24	5	3	3	1	0	0	0	51
1998	0	0	14	28	17	1	4	1	1	0	0	66
1999	0	0	16	45	27	11	1	5	1	0	0	107
2000	0	0	18	41	14	10	3	3	1	0	0	90
2001	0	0	26	45	24	6	12	8	1	0	0	122
2002	0	0	17	34	27	6	7	6	1	0	0	98
2003	0	0	19	53	20	14	8	4	2	1	0	121
2004	0	0	12	54	28	19	10	11	1	1	0	136
2005	0	0	29	38	35	13	5	7	1	1	0	129
2006	0	1	33	74	42	19	8	8	2	0	0	187
2007	0	0	29	65	35	27	8	9	3	2	0	178
2008	0	1	45	82	48	17	9	6	3	0	0	211

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1993	0	0	30	58	36	7	9	11	3	1	0	155
1994	0	0	31	50	29	8	9	7	2	0	0	138
1995	0	0	18	41	24	10	10	5	0	0	0	108
1996	0	0	11	37	17	6	8	2	5	0	0	86
1997	0	0	13	21	14	3	7	3	1	0	0	62
1998	0	1	13	35	15	7	12	9	2	1	0	95
1999	0	0	20	48	19	6	4	3	0	1	0	101
2000	0	1	20	55	23	11	3	4	1	0	0	118
2001	0	0	32	57	27	16	8	7	2	1	0	150
2002	0	0	37	63	42	22	9	9	2	0	0	184
2003	0	0	45	92	35	28	12	7	2	3	0	224
2004	0	0	42	114	48	22	17	14	2	0	0	259
2005	0	0	32	92	52	30	13	13	9	1	0	242
2006	0	0	47	105	40	29	13	9	2	0	0	246
2007	0	0	34	102	57	25	12	11	6	0	0	247
2008	0	1	44	122	54	15	21	9	3	1	0	270
16 - Montérégie												
1993	1	1	64	110	57	35	9	14	3	1	0	300
1994	0	1	66	93	57	24	13	13	6	1	0	278
1995	0	0	48	84	50	24	8	13	2	2	0	233
1996	0	0	39	73	36	23	6	11	2	0	0	193
1997	0	0	36	63	43	21	6	7	5	1	0	182
1998	0	1	37	102	38	18	10	9	2	0	0	217
1999	0	0	40	98	49	28	13	12	1	0	0	241
2000	0	0	50	126	49	21	21	9	4	0	0	281
2001	0	0	49	155	69	33	21	9	2	1	0	339
2002	0	0	51	130	66	31	13	18	5	0	0	314
2003	1	0	60	153	76	34	14	17	2	2	0	359
2004	1	1	64	173	105	38	28	18	3	1	0	433
2005	0	0	56	135	86	50	25	20	7	3	0	382
2006	0	0	58	157	92	39	34	29	7	2	0	419
2007	0	1	78	179	112	48	22	31	8	2	0	481
2008	0	0	97	212	127	67	31	25	8	4	0	571

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1993	0	0	15	20	13	12	1	4	1	0	0	67
1994	0	2	11	19	10	4	0	2	1	0	0	49
1995	0	1	7	17	7	8	6	3	0	0	0	49
1996	0	0	7	20	20	9	6	1	1	0	0	64
1997	0	0	9	20	12	16	6	1	1	0	0	65
1998	0	0	16	11	12	13	12	6	0	0	0	71
1999	0	0	12	27	10	12	8	4	0	1	0	75
2000	0	0	13	21	11	7	5	8	1	0	0	66
2001	0	0	21	28	16	6	9	5	2	1	0	88
2002	0	0	22	25	12	9	8	4	1	0	0	81
2003	0	2	14	23	19	8	1	9	2	0	0	78
2004	0	0	9	26	20	7	3	7	1	1	0	74
2005	0	0	14	25	14	8	7	3	2	0	0	73
2006	0	0	14	21	16	10	3	3	2	0	0	69
2007	0	0	17	29	18	8	9	4	2	0	0	87
2008	0	0	30	23	21	8	9	3	0	0	0	94
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1993	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1994	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1995	0	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	8
1996	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	7
1997	0	0	2	4	3	0	1	0	0	0	0	10
1998	0	0	3	4	5	1	1	0	0	0	0	14
1999	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	6
2000	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
2001	0	0	6	3	3	0	0	0	0	0	0	12
2002	0	0	2	5	5	4	0	2	0	0	0	18
2003	0	0	7	7	5	2	2	0	0	0	0	23
2004	0	0	11	13	5	2	3	2	2	0	0	38
2005	0	0	9	10	6	7	1	0	0	0	0	33
2006	0	0	16	13	6	4	1	0	1	0	0	42
2007	0	0	17	12	5	4	2	0	0	1	0	41
2008	0	0	21	19	4	12	3	0	0	0	0	60

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Province de Québec*											
1993	3,8	14,3	699,8	695,1	269,2	111,3	51,1	26,1	8,2	1,3	139,4
1994	2,7	12,5	545,5	552,5	212,4	91,2	50,5	22,2	6,1	1,5	109,8
1995	1,7	8,9	468,4	536,8	202,5	80,7	34,6	15,6	4,8	1,1	97,5
1996	0,9	7,7	431,4	510,1	188,2	80,6	34,7	16,0	6,6	0,9	91,7
1997	0,9	7,7	429,4	478,5	194,6	72,3	36,4	13,3	4,3	0,9	88,5
1998	1,9	9,0	468,3	549,9	228,9	89,4	41,2	11,6	4,8	1,0	99,0
1999	1,0	8,2	530,0	603,3	248,2	100,2	42,7	16,9	4,8	0,6	108,8
2000	0,5	10,1	594,6	647,4	269,8	102,5	48,9	17,3	6,2	0,9	118,1
2001	0,8	10,5	672,0	745,8	340,7	139,3	54,9	23,1	5,3	1,6	137,4
2002	0,3	11,5	728,5	823,5	363,9	152,4	64,9	24,0	6,1	0,9	148,7
2003	1,9	13,8	811,8	917,7	393,4	181,0	74,2	25,8	7,6	1,1	164,1
2004	1,1	10,7	837,0	964,5	430,5	187,1	82,2	27,1	7,6	1,3	170,7
2005	0,5	11,1	758,6	946,2	447,0	207,2	87,4	30,6	10,6	2,1	167,9
2006	0,8	11,4	745,0	979,0	444,3	196,7	102,6	32,7	10,0	2,1	168,8
2007	0,5	11,8	808,9	1 006,1	446,9	209,9	107,1	36,4	12,2	2,4	176,3
2008	0,3	13,2	926,4	1 117,0	494,8	225,4	122,7	39,9	11,2	1,4	195,6
Province de Québec hors Montréal											
1993	4,3	13,5	702,8	764,8	291,3	105,8	49,8	24,1	8,9	1,5	143,5
1994	3,0	12,9	541,5	596,9	231,3	88,1	51,7	21,1	7,1	1,5	113,0
1995	1,9	7,9	453,6	563,4	215,2	75,3	33,3	15,2	4,7	1,4	97,2
1996	1,1	8,0	422,8	527,3	188,3	75,6	32,7	15,4	6,7	1,1	90,6
1997	1,2	6,9	401,6	481,1	193,5	66,5	33,4	10,8	3,9	0,8	84,2
1998	2,2	8,8	429,0	544,5	231,6	84,7	37,6	11,2	4,1	1,2	93,9
1999	1,0	7,9	480,7	578,9	242,8	85,4	33,6	14,1	4,3	0,7	99,7
2000	0,3	10,1	548,7	644,3	268,2	93,7	38,7	13,9	6,4	1,1	110,7
2001	0,7	10,3	646,9	731,9	327,6	120,5	45,4	18,0	4,7	1,6	128,0
2002	0,4	12,3	717,5	801,0	355,1	132,0	53,9	19,6	5,1	0,5	140,3
2003	2,6	12,5	811,4	904,9	378,7	165,4	58,9	22,1	6,3	1,0	157,1
2004	1,1	10,1	859,4	988,9	436,9	178,9	76,7	22,7	5,4	1,1	170,0
2005	0,4	11,8	766,5	962,8	454,1	195,4	79,0	23,4	8,2	1,4	164,5
2006	0,7	12,1	749,5	973,8	441,9	183,5	92,5	25,3	6,9	1,6	163,3
2007	0,4	11,8	816,5	1 004,4	437,0	192,0	87,9	27,2	8,3	2,1	169,4
2008	0,4	13,8	945,6	1 097,7	481,5	208,4	97,9	29,9	7,0	1,3	188,1

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1993	0,0	6,7	636,0	798,5	361,0	144,2	62,6	28,4	5,0	0,0	141,5
1994	0,0	3,4	375,8	760,4	186,4	103,7	63,0	15,3	4,9	0,0	103,1
1995	0,0	0,0	455,1	694,5	242,4	36,2	26,6	11,9	0,0	0,0	98,6
1996	0,0	3,6	320,9	489,2	158,5	77,7	26,8	8,7	13,3	0,0	78,1
1997	0,0	7,5	344,5	637,6	208,7	82,6	11,0	5,7	0,0	0,0	87,3
1998	19,9	0,0	512,4	786,1	268,5	111,9	28,4	22,3	0,0	0,0	119,4
1999	10,4	0,0	321,4	423,5	160,0	79,7	17,6	8,3	0,0	0,0	70,6
2000	0,0	4,0	198,9	433,8	242,1	68,6	49,0	11,1	10,9	2,5	68,6
2001	0,0	0,0	368,8	560,5	262,3	135,3	45,7	16,6	0,0	9,7	93,0
2002	11,5	0,0	395,3	674,5	429,4	130,5	48,7	19,4	10,0	0,0	114,0
2003	11,9	4,4	576,5	901,9	544,3	189,6	37,8	11,1	0,0	0,0	144,5
2004	0,0	4,5	614,3	765,5	264,7	183,6	73,0	28,4	9,4	0,0	126,7
2005	0,0	9,4	650,9	834,5	526,6	270,9	104,3	17,4	0,0	0,0	150,6
2006	0,0	9,9	435,7	998,0	341,8	115,4	90,7	12,0	0,0	0,0	125,2
2007	0,0	5,1	493,2	692,6	325,0	105,3	37,5	18,8	5,8	0,0	105,2
2008	0,0	10,6	520,4	776,1	437,3	130,3	57,2	13,2	2,9	0,0	118,6
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1993	15,6	8,7	752,8	1 136,0	350,6	113,8	57,7	25,7	3,5	2,5	184,2
1994	5,3	13,4	544,5	877,3	313,2	80,4	46,4	18,1	0,0	0,0	141,8
1995	5,6	7,0	514,9	798,0	233,6	100,0	18,0	15,4	6,6	2,4	127,9
1996	0,0	14,5	604,3	643,1	207,9	69,1	29,0	12,9	6,4	0,0	123,6
1997	6,2	0,0	337,5	540,2	255,5	51,3	40,6	10,4	0,0	0,0	93,4
1998	0,0	5,1	346,0	495,2	227,1	127,2	30,2	8,1	5,9	4,5	95,3
1999	0,0	2,6	329,6	672,4	407,7	116,0	43,0	12,0	5,7	0,0	113,4
2000	0,0	8,2	573,3	649,6	243,1	89,5	32,5	9,8	2,7	0,0	118,4
2001	0,0	11,2	363,6	599,4	282,1	178,8	30,5	15,5	0,0	0,0	106,5
2002	0,0	0,0	504,0	806,1	364,2	194,9	47,1	19,4	2,6	0,0	137,6
2003	16,3	3,0	701,2	770,0	369,3	138,5	46,7	17,4	9,9	0,0	147,7
2004	0,0	3,1	780,3	869,1	481,1	111,7	91,1	19,6	2,4	0,0	161,3
2005	8,2	0,0	588,9	796,7	397,2	258,0	43,1	18,0	4,7	1,8	140,9
2006	0,0	10,1	549,4	906,0	398,5	198,9	78,4	10,3	6,9	0,0	142,2
2007	0,0	0,0	659,0	962,2	374,6	193,2	68,3	25,8	6,7	0,0	150,8
2008	0,0	0,0	641,5	783,1	400,6	194,3	90,9	18,2	0,0	0,0	136,6

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1993	0,0	6,6	637,6	744,4	265,4	129,8	49,8	23,9	3,0	0,0	140,6
1994	2,7	9,5	484,6	585,3	270,2	84,3	58,2	25,3	5,8	1,9	116,3
1995	0,0	5,5	366,1	499,5	198,1	71,9	25,9	12,4	2,8	0,9	87,6
1996	5,6	6,9	359,2	565,1	160,3	70,7	19,1	18,8	6,7	1,8	88,7
1997	2,9	7,0	446,7	584,2	187,2	104,7	31,7	18,6	3,8	3,6	100,5
1998	0,0	6,9	541,9	599,8	274,3	119,4	64,2	13,7	4,9	1,8	115,3
1999	6,4	8,4	581,7	716,2	287,2	115,6	39,7	22,6	7,0	2,6	125,8
2000	3,3	9,8	535,6	669,5	333,4	94,2	60,7	25,2	7,8	2,5	123,3
2001	3,5	4,2	710,3	869,1	437,4	177,8	43,8	28,6	11,9	2,5	159,5
2002	0,0	8,5	637,7	885,6	401,8	168,0	63,6	30,1	7,3	0,8	153,0
2003	0,0	8,5	826,8	1 094,7	482,7	206,9	108,3	35,2	10,2	2,3	189,5
2004	0,0	2,9	951,5	1 142,4	508,7	193,5	63,4	23,8	7,0	2,2	192,0
2005	0,0	23,6	738,0	1 154,5	500,1	184,6	125,6	31,1	12,6	1,4	184,4
2006	0,0	6,1	734,4	1 235,4	520,0	207,6	98,1	41,4	17,2	3,5	189,1
2007	0,0	9,4	693,0	1 223,1	538,8	174,4	85,6	36,0	14,1	4,0	180,2
2008	0,0	6,4	887,6	1 233,0	550,2	213,3	136,7	34,2	12,0	3,9	196,4
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1993	0,0	15,2	528,0	691,5	268,1	70,2	49,4	16,8	8,1	1,2	113,0
1994	0,0	4,7	463,4	571,9	273,0	104,3	51,5	21,8	2,0	3,5	103,5
1995	0,0	6,3	362,6	529,0	153,0	89,9	37,6	22,6	1,9	1,1	82,5
1996	0,0	9,6	374,1	475,1	219,9	75,0	42,6	23,5	3,7	2,3	85,4
1997	0,0	4,9	340,1	430,4	180,0	42,3	26,2	3,8	0,0	1,1	70,5
1998	0,0	8,3	341,6	648,1	274,0	87,3	24,2	10,0	1,7	0,0	94,2
1999	0,0	1,7	332,8	544,6	220,8	48,3	29,6	14,8	4,8	0,0	82,4
2000	0,0	10,2	504,5	665,2	266,9	95,9	12,7	12,2	9,3	2,1	106,9
2001	0,0	13,8	677,3	733,1	351,3	108,9	42,6	16,9	4,5	0,0	129,5
2002	0,0	10,5	821,5	945,4	414,6	94,1	33,8	15,6	1,5	2,0	155,0
2003	0,0	16,0	994,7	1 057,5	465,8	186,0	75,0	19,2	1,4	0,0	184,2
2004	4,7	14,5	1 050,9	1 305,9	631,6	226,8	93,1	23,0	5,5	1,0	217,3
2005	0,0	15,0	929,3	1 261,7	667,6	281,4	122,4	23,3	6,7	0,9	212,3
2006	0,0	17,5	883,5	1 223,7	653,7	275,4	161,1	38,7	5,3	3,7	209,5
2007	0,0	18,2	933,0	1 123,4	581,8	342,3	152,2	32,1	5,2	0,0	201,2
2008	0,0	20,8	1 146,1	1 277,4	576,5	211,7	133,8	46,6	3,8	0,0	216,3

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1993	0,0	23,6	836,6	707,5	285,6	72,6	25,6	17,1	7,4	2,1	147,1
1994	0,0	21,2	492,2	653,7	146,2	90,4	51,0	11,9	10,7	2,1	107,2
1995	0,0	2,7	534,6	634,7	221,2	65,8	33,8	18,6	13,6	4,1	111,2
1996	0,0	2,7	430,5	618,6	247,8	91,2	46,5	31,9	6,5	0,0	107,2
1997	0,0	2,7	459,1	531,9	238,1	51,4	72,3	6,7	3,1	0,0	97,3
1998	0,0	2,7	439,9	622,8	237,4	87,7	59,6	11,0	0,0	0,0	103,4
1999	0,0	0,0	469,2	704,4	241,0	97,4	55,5	21,7	8,3	0,0	113,5
2000	0,0	2,7	597,1	820,4	266,5	113,1	38,7	12,9	10,5	0,0	130,1
2001	0,0	8,2	738,8	825,0	367,6	155,5	31,1	27,5	7,6	3,7	150,4
2002	0,0	24,5	786,7	1 003,9	367,3	152,6	50,2	27,3	7,3	0,0	168,5
2003	0,0	11,0	892,2	1 192,3	468,1	176,6	57,6	27,0	4,7	0,0	193,7
2004	0,0	8,4	1 020,0	1 068,2	469,8	257,1	85,1	20,6	11,5	1,7	198,8
2005	0,0	8,5	763,1	1 190,6	536,2	202,2	62,6	26,9	11,3	1,6	189,7
2006	0,0	5,9	590,7	888,4	492,3	253,7	106,6	23,0	8,8	3,2	159,1
2007	0,0	9,0	753,4	1 028,5	397,0	149,0	103,4	38,3	6,5	3,1	166,8
2008	6,6	15,4	882,6	1 304,1	580,8	245,0	110,1	26,1	8,5	0,0	208,9
06 - Montréal											
1993	1,9	17,6	688,0	522,3	215,8	128,1	55,3	32,3	6,4	0,9	127,1
1994	1,8	10,9	561,2	441,4	167,8	100,7	46,6	25,9	3,2	1,4	100,3
1995	0,9	13,1	525,7	469,4	173,2	96,6	38,8	16,9	5,2	0,6	98,4
1996	0,0	6,5	465,1	465,4	188,0	95,0	41,5	17,9	6,2	0,6	95,0
1997	0,0	10,8	541,6	471,7	197,0	88,6	46,1	21,4	5,5	1,1	101,5
1998	1,0	9,6	625,8	564,1	223,0	102,5	52,7	13,0	7,4	0,6	114,5
1999	1,0	9,5	723,6	667,1	260,1	140,0	71,8	26,3	6,2	0,6	136,7
2000	1,0	9,8	769,3	655,3	273,2	125,4	80,7	29,0	5,6	0,3	140,3
2001	1,0	11,2	764,6	780,2	368,7	185,9	84,0	40,2	7,3	1,7	165,6
2002	0,0	8,5	769,2	882,3	383,1	201,9	97,6	39,0	9,8	1,9	173,8
2003	0,0	18,5	813,2	952,6	425,6	218,6	118,4	38,1	12,2	1,4	185,2
2004	1,0	13,0	756,4	895,5	416,3	206,8	97,8	41,7	15,3	1,9	172,7
2005	1,0	8,5	730,4	898,2	430,7	235,3	110,2	54,5	19,1	4,0	177,9
2006	1,0	9,1	729,4	994,3	450,1	227,6	129,4	57,3	21,1	3,4	185,4
2007	1,0	11,6	782,2	1 010,8	470,7	251,5	157,1	66,1	26,0	3,4	196,9
2008	0,0	11,1	860,0	1 171,5	527,6	264,9	185,8	71,1	25,8	1,8	217,9

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1993	17,3	9,6	910,8	784,8	311,1	149,4	58,3	30,9	0,0	0,0	169,9
1994	0,0	7,1	604,0	604,3	231,7	100,7	66,9	35,9	6,9	0,0	123,5
1995	0,0	2,3	492,6	623,0	189,3	81,7	65,6	24,5	6,6	0,0	107,1
1996	9,0	6,9	476,6	479,8	186,4	53,4	22,7	11,9	0,0	0,0	89,2
1997	0,0	6,8	352,2	456,6	174,7	48,3	35,7	7,7	3,0	0,0	75,5
1998	5,0	8,9	391,4	500,3	239,2	61,8	32,5	13,2	19,6	0,0	88,4
1999	0,0	4,5	663,0	583,9	282,4	81,2	26,2	9,2	0,0	0,0	110,5
2000	0,0	17,8	541,7	710,1	271,6	106,8	49,5	12,5	2,6	0,0	116,6
2001	0,0	6,7	666,3	909,5	351,5	143,7	53,4	22,7	4,9	0,0	145,2
2002	0,0	6,7	828,5	970,1	340,0	107,1	44,4	32,3	2,3	2,1	157,9
2003	0,0	2,2	781,5	880,3	322,0	146,6	35,4	24,8	9,0	0,0	148,4
2004	0,0	4,5	776,2	950,3	407,2	201,8	70,4	21,2	8,6	0,0	165,6
2005	0,0	0,0	666,5	1 141,9	461,7	128,8	104,4	22,5	6,2	1,8	172,1
2006	0,0	7,1	851,6	925,7	407,5	176,3	71,5	28,9	4,0	0,0	169,3
2007	0,0	14,7	954,2	1 075,4	592,7	196,1	73,0	32,4	3,9	1,7	202,5
2008	0,0	10,1	1 050,5	1 248,9	574,2	265,4	78,4	42,9	3,8	0,0	225,3
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1993	8,6	45,6	1 279,7	1 223,6	615,9	207,9	217,5	105,3	59,8	9,9	296,4
1994	8,7	29,4	1 290,2	927,5	409,2	214,5	95,6	26,3	21,7	4,9	232,4
1995	0,0	16,9	915,1	766,4	427,4	162,1	54,2	46,6	13,9	0,0	182,8
1996	0,0	4,3	872,1	998,6	228,5	205,5	53,6	20,7	13,3	4,8	178,8
1997	0,0	25,9	793,0	624,2	291,2	77,7	40,4	12,1	6,3	0,0	139,8
1998	0,0	8,8	753,7	600,7	229,5	125,5	6,9	3,9	0,0	0,0	126,2
1999	0,0	18,0	592,5	528,9	230,9	108,1	21,5	11,6	17,1	0,0	112,6
2000	0,0	32,3	782,5	936,7	375,5	165,7	22,2	19,1	16,5	0,0	166,5
2001	0,0	14,2	797,7	946,1	355,5	125,0	47,0	22,7	5,4	0,0	159,0
2002	0,0	29,1	1 128,2	1 014,4	378,6	195,2	83,4	22,6	5,2	0,0	197,2
2003	0,0	29,9	1 054,1	1 167,9	491,2	203,3	63,0	34,0	0,0	0,0	208,1
2004	0,0	41,4	943,0	1 154,7	612,8	282,6	86,5	15,2	4,9	0,0	210,6
2005	0,0	32,4	936,7	1 362,3	683,9	351,0	72,4	7,7	18,9	0,0	230,8
2006	0,0	22,6	1 059,5	1 185,9	643,0	208,4	142,7	23,6	0,0	0,0	219,6
2007	0,0	17,8	1 147,8	1 434,2	563,3	162,5	125,0	32,5	18,0	7,4	238,9
2008	0,0	24,8	1 026,1	1 009,2	602,1	313,0	164,3	21,1	8,8	0,0	211,1

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1993	0,0	70,6	1 769,0	1 491,1	507,6	228,2	101,6	18,7	18,6	9,4	343,3
1994	27,0	73,1	1 363,5	1 131,8	581,3	242,6	91,8	48,9	9,2	0,0	287,9
1995	41,3	33,7	1 322,2	1 164,6	686,3	203,4	61,3	17,9	0,0	8,8	275,4
1996	0,0	34,3	1 103,9	1 275,8	440,2	262,5	90,0	11,7	0,0	0,0	249,2
1997	14,9	41,7	923,4	997,4	376,0	151,7	91,2	11,5	8,5	0,0	203,0
1998	15,6	56,4	913,0	1 072,5	567,2	209,3	61,2	17,2	0,0	7,9	220,3
1999	0,0	50,0	1 393,1	1 185,0	489,6	286,0	72,7	34,1	0,0	0,0	260,7
2000	0,0	36,4	1 258,4	1 056,5	558,7	269,7	52,9	28,3	7,7	7,4	236,4
2001	0,0	44,3	989,8	1 086,3	669,6	129,4	44,1	27,9	0,0	7,2	206,5
2002	0,0	53,1	1 349,2	1 309,8	618,1	183,5	69,1	33,5	0,0	0,0	251,6
2003	0,0	54,4	1 518,8	1 615,7	644,6	255,9	61,8	33,5	7,2	0,0	283,3
2004	0,0	48,0	1 768,4	1 823,8	891,6	396,9	210,6	28,2	7,0	0,0	341,2
2005	0,0	66,4	1 938,7	1 514,7	818,5	464,6	127,1	56,8	6,9	0,0	330,7
2006	0,0	104,2	1 404,9	1 478,5	744,1	209,1	121,6	45,9	0,0	0,0	273,2
2007	0,0	118,7	1 938,2	1 604,0	668,4	422,2	96,2	29,5	6,6	5,9	323,8
2008	0,0	86,3	1 720,1	1 570,8	618,1	229,3	66,4	36,5	13,1	0,0	287,4
10 - Nord-du-Québec											
1993	0,0	0,0	2 527,7	1 304,7	110,1	92,9	51,0	0,0	0,0	0,0	318,7
1994	64,1	30,9	966,2	923,8	439,4	193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	218,5
1995	0,0	0,0	1 244,8	529,5	0,0	100,8	105,1	34,3	0,0	0,0	180,0
1996	0,0	0,0	358,9	785,5	208,3	155,9	0,0	0,0	53,3	0,0	123,7
1997	0,0	0,0	494,7	78,1	147,4	56,7	53,5	0,0	0,0	0,0	71,4
1998	0,0	0,0	457,2	239,6	0,0	63,7	54,7	33,3	0,0	0,0	73,4
1999	0,0	0,0	485,1	714,3	245,3	0,0	110,1	32,5	0,0	0,0	126,8
2000	0,0	39,0	595,2	329,8	84,6	0,0	58,1	32,1	0,0	0,0	94,7
2001	0,0	0,0	553,8	521,7	87,3	0,0	63,1	31,4	0,0	0,0	96,3
2002	0,0	0,0	1 021,2	720,7	176,7	177,8	66,8	0,0	0,0	0,0	159,4
2003	0,0	0,0	1 171,5	1 292,0	457,5	0,0	0,0	0,0	47,4	0,0	218,9
2004	113,3	0,0	1 177,5	1 042,6	805,7	382,4	83,4	0,0	0,0	0,0	255,2
2005	0,0	48,4	926,8	1 455,9	624,4	292,7	184,5	0,0	0,0	0,0	254,2
2006	0,0	0,0	765,6	1 428,6	274,0	197,4	97,2	34,2	0,0	0,0	200,0
2007	0,0	55,1	597,6	1 344,9	281,2	299,7	206,6	0,0	0,0	0,0	198,0
2008	0,0	0,0	703,5	413,7	0,0	205,3	0,0	0,0	0,0	0,0	90,9

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1993	0,0	27,2	764,2	949,2	389,6	210,8	50,5	61,6	18,5	0,0	180,9
1994	0,0	13,9	356,0	470,3	229,2	140,5	71,6	35,7	9,0	0,0	100,9
1995	0,0	7,1	264,3	431,0	121,5	133,8	61,9	0,0	8,7	5,4	74,5
1996	0,0	7,3	279,5	463,5	80,6	93,6	20,6	5,7	0,0	0,0	65,7
1997	17,8	7,5	241,1	193,8	169,6	37,2	31,8	28,0	0,0	0,0	53,0
1998	0,0	0,0	104,4	151,0	124,2	40,8	10,9	11,1	7,7	0,0	29,8
1999	0,0	8,0	81,9	160,2	74,9	29,8	0,0	5,6	0,0	0,0	22,5
2000	0,0	0,0	348,8	361,3	238,2	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0	59,9
2001	0,0	16,9	498,8	623,2	127,3	122,1	62,6	5,6	6,9	4,9	89,2
2002	0,0	0,0	352,9	1 043,9	134,3	128,3	53,1	5,6	0,0	0,0	97,1
2003	0,0	27,1	777,6	661,3	275,3	172,9	71,6	16,9	0,0	0,0	118,5
2004	0,0	9,4	748,6	834,1	512,9	200,2	62,2	28,6	0,0	0,0	137,1
2005	0,0	9,9	550,6	745,0	628,2	63,0	67,0	0,0	0,0	0,0	113,1
2006	0,0	10,5	500,4	766,1	564,2	87,4	17,9	12,0	0,0	0,0	116,2
2007	0,0	0,0	673,5	552,5	262,6	159,9	75,0	18,7	17,9	0,0	105,5
2008	0,0	0,0	510,3	690,9	581,1	93,3	78,5	19,6	11,8	0,0	117,2
12 - Chaudière-Appalaches											
1993	0,0	0,0	300,7	508,9	184,1	71,7	38,4	15,5	2,8	0,0	80,9
1994	0,0	1,8	250,6	288,9	159,1	66,6	35,2	15,1	0,0	0,0	60,1
1995	0,0	0,0	142,3	258,5	142,5	34,1	14,7	4,9	5,1	0,0	41,9
1996	0,0	1,9	218,2	331,1	140,7	67,7	35,1	4,8	0,0	1,6	56,8
1997	0,0	0,0	230,1	288,9	139,5	53,9	35,4	3,1	2,3	0,0	54,5
1998	4,6	3,8	202,7	366,0	154,6	78,6	14,8	7,7	2,2	0,0	59,5
1999	0,0	0,0	230,9	384,9	128,0	34,0	20,9	12,3	2,1	0,0	58,3
2000	0,0	0,0	259,5	391,5	192,4	59,5	24,4	13,7	4,0	3,0	67,9
2001	5,0	4,0	298,1	514,5	216,1	57,3	19,0	9,1	0,0	0,0	78,0
2002	0,0	2,0	317,0	488,7	255,3	71,2	39,8	7,5	1,8	0,0	81,4
2003	0,0	6,2	317,3	605,1	265,0	136,2	21,1	9,0	1,8	1,4	93,7
2004	0,0	2,1	430,3	650,6	303,9	141,9	37,3	18,0	1,7	0,0	108,5
2005	0,0	8,7	376,0	596,5	347,0	142,5	58,8	13,6	8,4	3,9	106,0
2006	0,0	0,0	383,0	561,8	339,8	120,0	65,3	16,9	1,6	1,3	100,0
2007	5,2	2,3	314,1	555,0	251,0	126,4	45,9	17,3	4,8	3,7	89,0
2008	0,0	4,8	341,5	510,1	273,8	122,9	67,8	21,1	4,8	2,4	89,9

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1993	4,4	4,7	760,8	698,9	308,0	82,4	37,7	28,8	8,2	8,2	142,6
1994	4,4	9,4	561,3	403,4	133,7	57,5	23,2	10,1	8,1	4,0	85,0
1995	4,4	4,7	387,5	406,1	153,3	52,5	13,0	7,9	2,6	0,0	70,5
1996	0,0	4,7	321,6	309,4	88,1	34,2	25,7	9,7	2,6	1,9	54,3
1997	0,0	9,2	446,4	380,2	127,8	31,5	15,9	11,5	5,0	0,0	69,1
1998	0,0	11,4	421,6	498,1	192,6	66,1	34,7	7,5	4,9	5,3	83,7
1999	0,0	13,5	508,1	481,5	166,5	80,6	25,5	19,9	7,2	0,0	87,7
2000	0,0	6,6	598,7	586,1	279,6	112,1	44,8	10,5	9,3	0,0	108,4
2001	0,0	6,6	547,0	707,9	305,7	106,0	45,7	22,1	4,5	0,0	114,9
2002	0,0	6,5	748,9	758,0	332,5	120,0	90,4	23,2	6,6	0,0	136,3
2003	0,0	2,2	795,4	853,2	298,4	130,1	69,5	29,1	10,8	0,0	142,3
2004	0,0	0,0	838,7	1 029,5	382,5	151,8	75,6	25,4	6,3	0,0	160,9
2005	0,0	2,2	787,6	994,5	455,6	175,7	63,5	33,0	8,2	1,4	163,0
2006	0,0	4,5	860,8	1 053,7	435,3	112,6	83,6	15,7	6,0	2,8	163,6
2007	0,0	0,0	941,9	1 037,0	422,0	196,6	93,2	25,4	13,7	2,7	176,0
2008	0,0	7,1	1 088,3	1 134,6	517,2	244,3	67,2	53,1	11,4	0,0	203,6
14 - Lanaudière											
1993	7,0	12,9	575,2	546,7	222,3	40,5	28,1	14,2	11,6	0,0	98,5
1994	3,4	7,3	482,0	440,0	192,6	59,9	43,5	27,3	5,4	2,1	86,9
1995	3,5	14,3	309,9	352,5	132,6	33,4	24,0	21,5	5,1	0,0	60,9
1996	0,0	3,5	373,3	406,3	119,9	29,3	26,0	9,7	0,0	0,0	62,6
1997	0,0	1,7	396,1	437,0	106,8	63,7	20,8	14,1	0,0	0,0	70,4
1998	0,0	17,1	367,4	392,6	148,7	35,2	26,0	6,1	2,2	0,0	65,0
1999	0,0	8,5	549,4	647,1	288,4	79,0	23,6	8,9	4,1	0,0	101,9
2000	0,0	11,8	505,8	706,2	242,9	80,9	18,7	7,2	2,0	0,0	98,3
2001	0,0	13,5	534,7	621,2	299,0	69,8	52,4	14,0	1,9	0,0	101,0
2002	0,0	6,7	545,9	607,2	280,0	79,6	37,3	12,3	10,9	0,0	100,1
2003	0,0	23,8	698,7	666,8	312,7	152,0	51,5	17,4	7,0	1,5	125,1
2004	0,0	19,1	621,5	845,7	328,7	149,6	60,8	22,5	1,7	2,9	133,1
2005	0,0	8,9	746,6	790,5	395,2	129,2	61,1	22,3	1,7	1,4	139,5
2006	0,0	9,3	829,9	958,1	424,3	198,4	73,9	19,7	6,4	0,0	163,2
2007	0,0	7,7	772,1	936,4	386,5	218,5	79,8	25,5	6,3	2,6	159,3
2008	0,0	6,0	1 183,4	1 183,1	458,4	191,7	77,3	27,5	6,1	1,2	207,5

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1993	0,0	15,4	874,5	893,4	317,9	76,9	64,0	27,0	17,5	1,8	155,7
1994	0,0	15,1	612,3	751,5	208,9	49,9	66,5	19,8	14,2	0,0	116,1
1995	0,0	9,9	495,1	653,1	263,7	54,9	59,6	10,3	4,5	0,0	101,8
1996	0,0	9,6	443,5	570,0	166,6	51,5	50,7	7,1	25,3	1,6	87,1
1997	0,0	6,3	394,7	443,1	235,8	30,2	41,2	8,3	5,9	0,0	75,2
1998	0,0	4,6	435,3	566,0	212,7	47,4	52,0	16,0	5,6	1,5	86,7
1999	0,0	10,6	563,2	521,9	199,8	52,9	15,7	9,0	0,0	1,5	87,6
2000	0,0	10,4	658,5	675,8	233,6	82,1	29,2	12,4	8,5	0,0	108,6
2001	0,0	10,3	926,0	831,0	280,6	94,7	38,7	15,7	4,9	1,4	137,5
2002	0,0	14,6	1 028,1	952,7	398,3	170,9	44,4	14,0	4,7	0,0	163,9
2003	0,0	16,0	1 109,9	1 099,5	343,7	169,9	58,4	11,3	4,5	3,8	176,8
2004	0,0	8,8	1 151,0	1 158,0	387,6	158,3	73,7	23,2	7,3	1,2	187,7
2005	0,0	7,5	974,7	1 038,2	374,2	199,4	58,5	28,4	18,1	1,2	173,2
2006	0,0	9,2	891,5	1 045,9	382,9	165,2	82,5	27,0	4,1	0,0	167,6
2007	0,0	6,3	995,9	1 052,8	386,1	181,1	95,7	22,9	9,2	0,0	177,9
2008	0,0	12,9	1 043,6	1 258,4	423,1	173,5	106,1	21,1	10,2	1,0	197,5
16 - Montérégie											
1993	2,2	9,6	470,4	529,7	188,3	81,6	26,1	12,6	4,8	0,6	96,7
1994	1,1	9,1	414,1	424,6	143,4	63,5	37,6	15,8	7,6	0,6	81,5
1995	0,0	7,9	387,4	456,6	147,2	51,6	18,6	10,6	3,6	1,1	75,9
1996	0,0	5,6	295,7	355,5	133,7	41,9	15,1	14,3	3,4	0,0	60,8
1997	0,0	4,5	308,2	350,6	124,0	42,5	15,9	9,0	6,5	0,5	59,7
1998	0,0	5,0	365,5	407,0	144,5	41,8	16,8	6,0	1,9	0,5	67,0
1999	0,0	6,1	396,6	438,7	171,4	54,7	22,0	8,2	1,2	0,5	74,5
2000	0,0	8,3	500,2	523,2	182,9	52,1	31,7	9,0	3,5	0,5	88,5
2001	0,0	11,1	579,4	563,8	218,9	84,1	32,7	8,4	2,2	1,0	99,7
2002	0,0	11,1	600,4	549,6	229,9	76,7	25,6	11,3	3,8	0,5	99,9
2003	3,0	7,8	640,5	628,9	251,9	101,9	35,5	15,4	3,2	0,9	111,2
2004	1,5	9,6	680,0	714,1	297,9	110,0	55,3	14,4	2,1	0,9	123,6
2005	0,0	7,5	597,0	633,6	278,3	131,1	35,7	17,8	4,5	1,2	112,2
2006	0,0	9,6	583,6	677,7	279,2	131,7	70,5	18,3	6,4	1,6	117,5
2007	0,0	6,8	681,4	786,2	324,2	133,5	59,1	21,6	5,8	1,1	133,2
2008	0,0	10,2	786,4	928,5	365,7	171,7	71,6	21,6	4,3	1,8	155,1

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1993	222,1	260,0	12 564,1	13 471,5	7 317,1	4 624,3	1 237,1	1 603,5	729,9	0,0	3 848,9
1994	145,8	512,0	10 923,3	11 803,7	5 628,7	2 395,2	1 612,9	670,2	475,1	234,2	3 151,3
1995	71,4	97,8	8 194,6	10 443,9	6 385,5	5 021,5	2 127,7	636,9	245,7	455,6	2 941,9
1996	0,0	232,1	11 083,7	10 607,9	8 182,9	5 745,6	2 847,0	1 275,5	966,2	232,0	3 683,6
1997	0,0	311,8	7 013,3	9 069,8	5 251,1	5 797,1	2 559,7	981,6	435,7	226,2	2 820,4
1998	150,8	351,6	5 567,9	7 054,5	4 777,8	4 669,3	4 213,9	828,4	0,0	0,0	2 465,1
1999	0,0	263,2	7 043,8	9 887,4	4 570,8	4 193,1	3 980,9	946,7	967,1	225,7	2 803,8
2000	0,0	83,5	8 184,7	9 331,7	4 514,7	3 676,5	2 442,7	1 135,1	179,9	0,0	2 577,8
2001	0,0	121,9	11 735,2	11 069,7	6 506,8	3 202,0	3 491,6	1 244,3	701,8	229,9	3 386,7
2002	0,0	412,4	11 564,6	10 538,9	7 780,3	4 573,5	4 621,8	1 470,6	168,9	0,0	3 701,9
2003	157,5	367,6	8 458,6	8 810,1	5 078,6	3 921,6	1 881,7	1 925,0	1 271,9	0,0	2 906,9
2004	0,0	80,6	7 109,9	9 877,9	6 763,3	2 554,7	2 530,0	1 541,4	304,9	218,8	2 762,1
2005	0,0	160,7	6 989,2	9 041,4	4 932,2	2 955,1	3 252,0	821,9	589,1	0,0	2 573,5
2006	163,4	81,4	7 618,2	8 111,0	5 985,0	2 847,0	2 144,8	1 052,6	431,7	0,0	2 572,2
2007	0,0	206,8	6 828,0	10 144,9	5 804,1	3 571,4	1 881,7	504,6	426,1	0,0	2 666,0
2008	0,0	375,8	10 480,3	8 366,9	6 162,8	2 631,6	1 869,2	656,3	551,0	169,2	2 916,8
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1993	0,0	43,4	2 835,7	3 076,9	1 124,6	235,6	156,0	0,0	185,2	0,0	799,4
1994	0,0	131,2	3 568,4	2 649,0	1 493,9	811,1	0,0	0,0	0,0	0,0	923,3
1995	0,0	128,7	3 499,6	3 375,2	1 747,9	337,8	0,0	102,6	0,0	0,0	984,7
1996	0,0	164,7	2 695,4	2 717,4	1 124,6	529,7	0,0	99,7	151,3	0,0	772,7
1997	0,0	0,0	2 584,7	1 981,0	1 374,3	314,1	258,4	0,0	0,0	0,0	637,6
1998	0,0	38,8	3 964,8	3 703,7	2 116,0	898,2	127,6	279,3	262,1	0,0	1 115,2
1999	0,0	37,2	2 356,0	2 335,3	1 353,4	386,5	370,8	87,9	0,0	0,0	662,7
2000	0,0	36,2	1 733,1	1 916,7	959,4	286,0	351,7	0,0	122,2	0,0	507,3
2001	0,0	0,0	3 185,8	2 014,5	1 393,0	448,0	334,1	158,1	0,0	0,0	693,4
2002	0,0	138,9	2 609,4	2 686,3	1 384,8	773,2	538,2	148,0	111,0	0,0	770,1
2003	0,0	0,0	4 641,4	4 381,4	1 734,5	1 218,5	411,1	70,8	0,0	0,0	1 103,9
2004	0,0	67,8	5 405,4	4 667,2	2 148,9	1 171,0	910,9	405,1	203,9	0,0	1 332,0
2005	0,0	134,7	5 934,2	4 482,8	2 552,2	1 603,1	398,8	0,0	0,0	0,0	1 348,1
2006	0,0	307,7	5 149,9	6 584,7	2 448,7	1 298,7	481,2	0,0	92,4	0,0	1 459,1
2007	0,0	307,6	6 245,2	5 245,3	2 627,1	610,7	934,6	122,0	0,0	184,8	1 445,2
2008	0,0	246,0	6 560,9	5 857,0	2 451,4	1 977,8	805,7	178,0	0,0	0,0	1 627,7

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Province de Québec*											
1993	5,1	28,0	1 235,5	1 016,1	352,4	137,1	64,8	23,4	8,3	1,2	202,4
1994	4,3	24,8	953,1	818,8	266,4	113,5	67,3	26,1	6,7	1,1	159,6
1995	2,6	17,1	826,7	807,8	280,2	100,7	40,0	15,1	5,4	1,2	144,0
1996	1,3	15,6	774,4	775,7	249,0	95,6	43,3	18,5	7,2	0,9	136,0
1997	1,4	15,1	777,5	723,0	251,9	80,4	40,2	15,3	3,8	1,0	130,1
1998	3,4	17,1	841,3	803,8	293,0	104,5	37,0	8,8	4,8	1,0	141,6
1999	0,5	16,2	961,9	887,0	322,4	105,5	43,4	13,9	5,0	0,6	156,6
2000	1,0	20,2	1 083,5	981,2	358,8	116,6	49,8	13,0	6,5	0,8	173,4
2001	1,1	20,4	1 220,7	1 081,1	423,5	152,9	50,6	19,1	4,7	0,9	194,3
2002	0,0	23,5	1 326,3	1 213,6	458,4	170,9	66,6	17,1	5,3	0,3	211,9
2003	2,8	27,7	1 459,1	1 341,6	495,2	203,2	71,8	23,2	6,7	0,4	232,7
2004	1,1	21,3	1 510,7	1 419,0	539,1	215,4	81,5	22,6	4,3	0,9	241,8
2005	0,0	22,0	1 369,8	1 384,6	552,3	230,5	83,2	24,5	7,1	1,4	232,9
2006	1,6	22,6	1 318,8	1 420,3	563,3	229,6	105,4	24,9	7,1	1,1	233,6
2007	0,5	23,2	1 432,4	1 444,0	547,8	220,8	115,0	26,5	6,8	1,2	240,8
2008	0,0	25,7	1 615,3	1 573,2	599,7	258,5	123,3	32,6	6,7	0,9	267,1
Province de Québec hors Montréal											
1993	6,1	26,6	1 244,5	1 132,5	383,4	133,8	65,7	22,5	8,7	1,6	211,7
1994	4,4	25,4	945,2	886,6	289,0	110,0	70,3	25,0	8,0	1,1	165,3
1995	2,8	15,3	796,5	842,7	300,4	98,0	42,1	15,9	5,9	1,7	144,7
1996	1,7	16,2	761,1	799,0	252,2	93,0	42,9	19,0	7,7	1,3	136,3
1997	1,8	13,3	725,8	727,0	254,5	77,7	39,1	13,5	3,8	0,6	125,6
1998	3,8	16,4	763,8	795,4	299,7	104,6	38,6	8,6	4,2	1,0	135,6
1999	0,7	15,9	870,1	856,6	316,6	98,4	38,3	12,3	5,5	0,6	146,0
2000	0,7	20,2	998,3	966,1	349,7	109,4	44,8	11,0	6,4	1,0	163,1
2001	1,4	20,0	1 176,1	1 058,1	405,8	134,3	47,2	16,7	4,8	1,0	183,8
2002	0,0	25,2	1 303,4	1 187,1	448,7	155,8	60,8	15,8	4,9	0,2	204,2
2003	3,8	24,8	1 462,3	1 303,5	479,9	192,3	64,6	23,2	6,5	0,5	226,3
2004	0,8	19,7	1 546,6	1 447,4	531,8	208,8	81,6	21,0	3,9	0,7	242,8
2005	0,0	23,3	1 379,4	1 407,8	557,7	220,4	81,8	23,1	5,7	0,7	232,5
2006	1,5	23,8	1 319,2	1 412,9	562,3	211,7	101,1	22,9	6,5	1,1	230,0
2007	0,7	23,7	1 454,6	1 455,3	541,9	206,8	104,0	23,4	5,7	1,3	239,3
2008	0,0	26,7	1 660,1	1 563,6	587,4	247,3	101,6	29,5	5,8	1,1	264,8

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1993	0,0	13,6	1 059,3	1 068,6	377,7	154,9	62,6	25,6	0,0	0,0	183,3
1994	0,0	7,0	613,4	800,4	280,8	103,7	73,6	31,0	9,7	0,0	129,5
1995	0,0	0,0	727,6	807,1	266,4	60,2	31,8	12,1	0,0	0,0	125,1
1996	0,0	7,4	451,1	616,4	127,8	89,8	42,9	0,0	9,0	0,0	92,0
1997	0,0	15,1	564,2	804,6	245,4	68,3	22,0	0,0	0,0	0,0	112,0
1998	40,6	0,0	799,8	788,4	269,7	104,5	22,7	28,2	0,0	0,0	137,2
1999	21,2	0,0	530,4	526,2	154,8	48,4	35,2	16,8	0,0	0,0	91,8
2000	0,0	8,2	366,2	660,7	250,1	52,8	49,0	11,2	7,3	0,0	89,6
2001	0,0	0,0	626,9	718,6	214,2	129,2	39,0	11,1	0,0	8,7	112,4
2002	0,0	0,0	657,0	917,0	427,4	134,3	13,9	27,8	6,7	0,0	136,2
2003	24,8	8,9	906,5	988,1	531,5	117,1	30,4	22,3	0,0	0,0	162,1
2004	0,0	9,2	957,2	1 044,4	111,8	196,9	65,7	34,0	0,0	0,0	151,9
2005	0,0	19,3	1 084,7	989,3	423,3	275,5	88,6	23,2	0,0	0,0	176,1
2006	0,0	20,2	633,2	1 159,6	408,1	138,4	55,7	6,0	0,0	0,0	144,2
2007	0,0	10,6	896,3	768,8	294,8	98,5	57,9	18,7	0,0	0,0	127,9
2008	0,0	21,9	798,8	962,2	476,6	96,3	58,8	6,6	5,8	0,0	141,3
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1993	10,6	13,4	1 454,4	1 748,5	405,7	155,3	88,8	23,8	0,0	0,0	281,4
1994	0,0	27,8	1 014,4	1 311,6	266,5	93,1	72,6	27,9	0,0	0,0	207,3
1995	11,3	14,4	928,7	1 152,3	380,3	121,8	14,6	13,5	6,5	4,2	192,2
1996	0,0	29,8	1 145,8	961,6	248,6	61,3	36,5	8,8	6,4	0,0	188,2
1997	12,7	0,0	620,0	795,6	283,8	37,7	44,6	12,8	0,0	0,0	133,9
1998	0,0	5,2	616,9	788,6	289,7	134,5	45,9	12,5	5,9	4,0	140,6
1999	0,0	5,4	615,7	1 149,5	526,4	101,1	47,7	12,2	5,7	0,0	169,7
2000	0,0	16,8	1 032,5	988,2	245,1	110,3	49,8	12,0	5,5	0,0	176,5
2001	0,0	23,1	689,1	906,9	372,3	263,3	26,6	15,8	0,0	0,0	158,3
2002	0,0	0,0	986,9	1 312,1	448,7	179,7	67,0	7,9	5,2	0,0	203,8
2003	16,8	6,1	1 307,3	1 162,1	535,7	141,8	31,6	11,8	20,2	0,0	220,6
2004	0,0	6,3	1 384,2	1 312,3	653,8	114,8	115,0	23,9	0,0	0,0	234,5
2005	0,0	0,0	1 141,8	1 222,0	490,1	257,6	62,6	12,2	4,8	0,0	203,1
2006	0,0	20,8	1 001,5	1 280,3	524,4	211,6	94,1	12,5	4,7	0,0	198,2
2007	0,0	0,0	1 132,3	1 389,9	527,1	208,4	84,2	4,4	4,5	0,0	207,7
2008	0,0	0,0	1 177,3	1 182,3	556,9	231,6	71,6	9,2	0,0	0,0	198,1

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1993	0,0	13,6	1 150,9	1 119,2	344,5	148,7	61,5	21,6	2,9	0,0	200,9
1994	5,5	16,6	843,5	889,8	321,3	118,8	92,5	28,7	8,5	1,6	166,2
1995	0,0	11,3	647,1	743,8	243,7	100,0	34,8	18,8	0,0	1,6	125,7
1996	11,4	14,2	609,5	839,2	205,0	69,2	21,0	24,1	7,8	1,5	124,9
1997	6,0	14,3	805,4	832,6	258,5	120,5	28,5	20,1	4,9	1,5	142,2
1998	0,0	11,4	950,3	897,7	352,6	144,9	58,0	7,2	4,7	0,0	160,9
1999	0,0	17,1	1 022,2	1 024,5	391,9	154,0	40,6	23,2	9,1	2,9	178,2
2000	6,8	20,0	929,0	992,0	437,9	129,1	79,1	17,7	6,5	2,8	173,6
2001	7,1	8,6	1 272,9	1 184,9	548,2	158,1	50,7	31,8	10,5	0,0	213,4
2002	0,0	17,3	1 128,2	1 262,2	479,2	200,8	57,0	29,9	10,2	0,0	207,9
2003	0,0	17,3	1 497,0	1 506,1	618,1	181,9	94,1	38,6	13,9	2,6	254,4
2004	0,0	5,9	1 703,6	1 635,5	626,8	190,6	63,1	22,9	5,8	1,3	264,2
2005	0,0	45,1	1 334,4	1 538,3	648,2	193,2	132,1	33,8	11,3	1,2	246,7
2006	0,0	12,4	1 309,6	1 779,1	610,5	235,4	125,9	38,1	16,6	1,2	255,9
2007	0,0	19,2	1 151,5	1 783,1	649,0	203,3	79,1	28,0	9,1	2,3	239,3
2008	0,0	9,9	1 515,8	1 751,5	651,7	228,1	135,1	19,2	7,2	2,3	258,6
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1993	0,0	31,2	946,9	1 011,0	347,5	92,0	61,9	28,4	12,0	0,0	166,9
1994	0,0	9,6	825,1	806,3	305,2	125,2	61,3	27,7	3,9	4,0	144,6
1995	0,0	13,1	616,7	724,4	186,7	104,1	33,0	18,9	3,8	0,0	111,2
1996	0,0	19,8	680,0	743,6	306,4	92,5	47,7	31,9	7,2	3,9	129,8
1997	0,0	10,1	633,6	629,0	210,8	45,9	19,2	5,2	0,0	1,9	103,3
1998	0,0	17,1	573,4	928,4	361,5	92,9	19,5	5,1	3,3	0,0	128,5
1999	0,0	3,5	578,1	810,1	314,4	66,3	25,0	7,5	6,4	0,0	117,5
2000	0,0	21,2	878,9	976,4	378,7	99,3	5,2	4,9	9,3	0,0	151,2
2001	0,0	21,4	1 171,9	988,3	452,0	90,1	48,6	17,1	6,0	0,0	177,2
2002	0,0	21,7	1 463,1	1 350,2	470,1	93,9	34,2	17,0	0,0	0,0	217,6
2003	0,0	33,1	1 782,4	1 506,4	648,0	248,7	79,8	16,9	0,0	0,0	267,3
2004	9,7	30,0	1 908,8	1 799,9	758,1	267,8	85,5	17,0	8,3	0,0	299,0
2005	0,0	30,9	1 613,6	1 668,1	836,2	316,6	132,8	14,8	8,1	1,7	280,6
2006	0,0	36,0	1 472,8	1 795,7	791,2	300,3	170,2	40,3	2,6	4,9	281,4
2007	0,0	33,2	1 603,5	1 523,6	686,1	362,0	184,9	31,1	2,6	0,0	264,7
2008	0,0	42,9	1 992,3	1 712,4	664,7	231,6	118,6	48,6	2,5	0,0	288,9

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1993	0,0	48,7	1 458,4	960,9	350,7	93,7	42,8	19,8	0,0	3,6	213,9
1994	0,0	43,6	859,3	954,9	151,7	112,1	51,1	9,6	7,0	0,0	152,9
1995	0,0	5,5	918,1	921,1	350,4	88,0	59,5	23,5	20,3	7,2	168,2
1996	0,0	5,5	855,9	935,3	380,1	83,0	59,2	36,7	0,0	0,0	163,6
1997	0,0	5,5	795,0	773,8	331,8	57,5	68,2	9,0	6,1	0,0	140,3
1998	0,0	5,5	774,6	789,3	229,9	119,8	68,4	13,2	0,0	0,0	136,8
1999	0,0	0,0	836,2	1 048,6	294,0	63,4	51,7	26,1	5,5	0,0	157,8
2000	0,0	5,6	1 109,4	1 199,6	326,6	111,9	26,1	4,3	5,3	0,0	184,3
2001	0,0	16,7	1 315,6	1 205,3	414,3	196,0	9,0	17,0	5,1	3,2	208,7
2002	0,0	50,2	1 408,1	1 364,9	466,0	199,0	46,4	12,6	9,8	0,0	233,9
2003	0,0	22,6	1 641,1	1 671,1	509,9	176,9	68,5	29,1	0,0	0,0	268,7
2004	0,0	17,3	1 808,1	1 530,2	565,9	331,2	61,6	16,6	4,6	0,0	277,9
2005	0,0	17,6	1 417,3	1 741,0	536,7	255,7	32,3	29,0	4,5	0,0	258,8
2006	0,0	6,0	1 096,8	1 313,7	595,7	352,7	88,4	12,6	17,6	2,8	221,8
2007	0,0	18,5	1 432,6	1 495,2	451,8	77,2	157,6	25,7	4,3	2,7	232,3
2008	0,0	31,7	1 535,9	1 842,8	738,2	297,7	170,7	26,3	4,2	0,0	292,6
06 - Montréal											
1993	1,9	33,8	1 201,8	739,1	276,0	147,4	62,0	26,2	7,1	0,5	175,2
1994	3,8	22,4	982,9	657,9	212,1	124,4	57,5	29,5	3,0	0,9	143,2
1995	1,9	24,6	941,4	724,2	233,1	109,1	33,2	12,7	4,0	0,0	142,0
1996	0,0	13,2	825,6	718,4	241,5	103,5	44,8	17,0	5,9	0,0	135,0
1997	0,0	22,0	982,9	713,0	246,0	88,4	43,8	21,2	3,8	1,9	143,4
1998	2,0	19,6	1 146,6	824,9	278,0	104,0	31,9	9,4	6,5	0,9	159,2
1999	0,0	17,2	1 317,0	962,2	335,2	125,1	60,0	19,3	3,6	0,5	187,8
2000	2,0	20,2	1 402,3	1 018,1	378,6	135,5	65,8	19,7	7,1	0,5	203,5
2001	0,0	21,9	1 382,1	1 135,1	461,6	200,0	61,5	27,2	4,3	0,9	224,8
2002	0,0	17,5	1 409,7	1 278,8	479,3	208,7	84,5	21,5	6,8	0,5	234,2
2003	0,0	37,9	1 447,8	1 440,7	528,7	230,1	93,7	23,4	7,5	0,0	251,5
2004	2,1	26,7	1 383,3	1 341,9	555,4	231,5	81,4	28,1	5,7	1,4	238,7
2005	0,0	17,5	1 336,0	1 320,1	540,0	254,6	87,2	29,4	11,9	3,2	234,2
2006	2,1	18,6	1 317,3	1 441,3	565,5	272,5	117,1	31,5	9,4	0,9	244,2
2007	0,0	21,7	1 355,9	1 412,3	561,8	253,9	144,4	36,4	10,8	0,9	245,0
2008	0,0	22,7	1 462,8	1 599,4	629,6	284,8	180,1	42,9	9,8	0,4	273,8

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1993	26,5	14,7	1 655,7	1 260,1	436,5	213,7	82,6	57,9	0,0	0,0	271,7
1994	0,0	14,5	1 120,0	974,9	356,8	129,0	100,1	63,8	14,0	0,0	201,5
1995	0,0	4,8	840,9	1 016,1	308,6	143,1	103,7	32,9	13,4	0,0	174,2
1996	9,2	14,0	871,1	777,7	248,6	92,7	44,7	12,0	0,0	0,0	145,1
1997	0,0	9,2	674,6	733,1	224,3	68,2	51,0	7,8	0,0	0,0	118,3
1998	10,2	18,3	733,0	826,8	389,5	57,3	32,1	0,0	17,0	0,0	138,3
1999	0,0	4,6	1 239,8	914,6	370,7	106,9	32,3	7,3	0,0	0,0	174,0
2000	0,0	36,4	994,0	1 059,7	365,8	97,6	65,2	10,6	5,1	0,0	173,2
2001	0,0	9,1	1 265,3	1 357,4	438,9	177,5	46,2	13,8	4,9	0,0	213,7
2002	0,0	13,6	1 548,5	1 350,2	481,9	120,2	67,6	13,5	0,0	0,0	231,4
2003	0,0	4,5	1 410,7	1 329,8	452,5	190,7	27,9	19,7	0,0	0,0	221,1
2004	0,0	9,2	1 476,2	1 392,8	552,0	267,6	73,3	19,3	4,3	0,0	247,7
2005	0,0	0,0	1 264,5	1 668,8	533,4	121,3	122,7	19,0	0,0	3,4	243,5
2006	0,0	14,6	1 454,2	1 353,2	544,7	172,5	87,4	15,8	4,0	0,0	240,0
2007	0,0	30,1	1 725,9	1 503,6	724,6	178,0	97,6	35,2	0,0	0,0	286,8
2008	0,0	20,7	1 863,2	1 644,4	679,3	327,5	82,8	45,5	3,7	0,0	312,1
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1993	17,3	94,7	2 225,2	1 767,7	930,6	301,1	336,7	67,4	46,0	18,5	448,6
1994	17,6	60,8	2 131,2	1 254,5	639,3	240,1	141,9	36,9	29,7	0,0	348,1
1995	0,0	35,1	1 472,5	1 121,5	630,1	173,2	84,8	44,3	0,0	0,0	266,3
1996	0,0	8,8	1 630,2	1 391,5	271,5	241,3	83,2	34,7	13,7	0,0	271,4
1997	0,0	53,1	1 375,7	969,6	450,6	95,6	55,6	16,9	0,0	0,0	222,7
1998	0,0	17,9	1 343,4	885,0	223,9	170,6	14,1	0,0	0,0	0,0	192,1
1999	0,0	36,7	1 089,8	718,2	279,6	146,1	0,0	8,0	35,5	0,0	167,5
2000	0,0	66,2	1 522,5	1 561,8	525,1	218,0	0,0	7,9	34,3	0,0	274,1
2001	0,0	29,1	1 514,3	1 487,7	517,2	147,7	48,4	15,6	11,1	0,0	255,0
2002	0,0	59,4	2 048,6	1 520,7	436,7	306,5	85,6	15,5	0,0	0,0	304,1
2003	0,0	61,1	1 822,9	1 775,1	609,9	322,3	91,8	46,6	0,0	0,0	316,7
2004	0,0	85,2	1 662,3	1 767,0	631,4	339,4	155,2	15,7	10,1	0,0	310,9
2005	0,0	66,6	1 542,8	2 029,1	915,9	398,7	125,7	7,9	9,7	0,0	331,3
2006	0,0	46,6	1 976,4	1 836,3	893,1	299,7	267,2	8,1	0,0	0,0	347,3
2007	0,0	36,8	1 988,4	2 036,7	842,6	204,1	160,7	41,7	18,6	13,8	357,4
2008	0,0	38,6	1 872,5	1 442,3	744,5	508,0	263,2	17,3	9,1	0,0	320,5

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1993	0,0	145,7	2 859,9	2 056,8	772,1	261,3	84,3	13,1	19,7	18,7	508,2
1994	27,4	149,5	2 302,2	1 945,8	813,0	264,4	84,4	38,5	19,5	0,0	446,6
1995	56,5	55,0	2 472,5	1 727,2	986,1	207,2	104,8	25,1	0,0	17,2	438,1
1996	0,0	69,8	1 848,2	2 096,7	616,0	320,7	103,2	12,4	0,0	0,0	388,3
1997	30,9	70,1	1 577,9	1 325,6	450,8	155,5	124,1	0,0	0,0	0,0	286,7
1998	0,0	100,1	1 718,9	1 537,1	679,9	355,9	103,3	24,1	0,0	0,0	342,7
1999	0,0	101,6	2 467,8	1 733,0	624,2	483,6	105,3	35,7	0,0	0,0	410,6
2000	0,0	59,2	2 226,6	1 475,2	688,8	327,8	64,2	23,5	0,0	14,4	348,6
2001	0,0	75,8	1 925,9	1 856,1	908,8	144,4	88,8	34,7	0,0	13,9	344,4
2002	0,0	108,8	2 387,4	1 892,4	907,2	277,1	46,6	34,5	0,0	0,0	387,9
2003	0,0	111,2	2 601,9	2 319,3	929,6	355,1	99,6	57,5	0,0	0,0	432,4
2004	0,0	65,5	3 005,8	2 748,6	1 132,2	437,7	239,3	23,2	0,0	0,0	494,3
2005	0,0	119,7	3 253,1	2 043,6	1 119,1	674,5	142,7	81,9	14,5	0,0	490,1
2006	0,0	196,1	2 402,1	2 213,6	1 085,0	215,6	153,0	58,9	0,0	0,0	416,3
2007	0,0	244,5	3 294,6	2 628,7	1 039,4	441,2	129,4	24,2	14,0	0,0	512,2
2008	0,0	158,0	3 047,8	2 396,8	895,7	297,4	134,5	62,1	27,8	0,0	463,2
10 - Nord-du-Québec											
1993	0,0	0,0	4 427,1	1 557,6	0,0	195,7	113,4	0,0	0,0	0,0	500,4
1994	131,1	61,9	1 662,4	792,4	504,4	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0
1995	0,0	0,0	2 372,0	627,0	0,0	208,3	119,5	74,4	0,0	0,0	313,8
1996	0,0	0,0	745,3	970,9	296,3	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,2
1997	0,0	0,0	879,4	0,0	152,4	116,3	115,7	0,0	0,0	0,0	116,2
1998	0,0	0,0	924,7	521,7	0,0	130,5	116,1	0,0	0,0	0,0	143,8
1999	0,0	0,0	992,9	851,8	335,0	0,0	114,7	0,0	0,0	0,0	182,8
2000	0,0	79,3	927,4	523,6	0,0	0,0	120,2	71,8	0,0	0,0	149,8
2001	0,0	0,0	1 172,5	187,6	0,0	0,0	128,4	0,0	0,0	0,0	114,6
2002	0,0	0,0	2 159,5	751,9	186,2	373,1	136,1	0,0	0,0	0,0	272,0
2003	0,0	0,0	2 305,0	1 801,8	594,1	0,0	0,0	0,0	102,9	0,0	356,7
2004	0,0	0,0	2 509,7	1 663,6	950,6	597,6	172,7	0,0	0,0	0,0	417,6
2005	0,0	0,0	1 964,6	2 851,7	580,3	0,0	188,3	0,0	0,0	0,0	398,6
2006	0,0	0,0	1 616,2	2 658,5	391,4	200,8	0,0	74,0	0,0	0,0	351,4
2007	0,0	110,0	1 039,5	2 489,6	395,3	418,4	216,0	0,0	0,0	0,0	330,9
2008	0,0	0,0	1 431,5	444,4	0,0	437,6	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1993	0,0	56,2	1 274,0	1 350,0	512,5	253,0	20,7	38,2	0,0	0,0	244,8
1994	0,0	28,5	619,0	779,3	288,8	195,0	103,6	36,9	0,0	0,0	146,8
1995	0,0	14,4	500,5	727,4	122,5	201,1	41,5	0,0	17,4	10,0	115,7
1996	0,0	14,8	526,2	861,2	96,2	164,4	20,6	0,0	0,0	0,0	112,5
1997	0,0	15,2	444,6	335,1	268,2	24,8	42,1	23,1	0,0	0,0	79,4
1998	0,0	0,0	215,9	175,4	178,0	26,9	0,0	22,8	15,6	0,0	42,1
1999	0,0	16,2	141,7	305,2	110,7	59,7	0,0	11,4	0,0	0,0	39,0
2000	0,0	0,0	606,8	490,2	315,0	0,0	46,4	0,0	0,0	0,0	87,4
2001	0,0	34,2	888,2	714,9	124,2	170,4	100,3	11,3	14,0	0,0	124,8
2002	0,0	0,0	640,6	1 731,8	88,2	143,0	52,8	0,0	0,0	0,0	142,0
2003	0,0	55,4	1 406,5	998,4	408,9	114,2	84,7	0,0	0,0	0,0	173,7
2004	0,0	19,3	1 470,6	1 403,5	766,3	311,8	61,5	45,8	0,0	0,0	224,4
2005	0,0	20,4	1 042,4	1 223,4	862,9	40,8	66,1	0,0	0,0	0,0	174,2
2006	0,0	21,5	1 025,1	1 134,5	879,2	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	167,3
2007	0,0	0,0	1 242,9	872,1	312,6	134,5	73,3	24,9	24,2	0,0	156,0
2008	0,0	0,0	860,5	1 055,3	800,0	137,9	117,0	0,0	0,0	0,0	157,2
12 - Chaudière-Appalaches											
1993	0,0	0,0	560,2	723,7	214,7	103,2	66,2	7,0	0,0	0,0	115,6
1994	0,0	3,7	446,1	421,4	238,1	67,6	41,8	17,1	0,0	0,0	86,2
1995	0,0	0,0	239,4	377,7	217,3	38,0	17,8	3,3	5,2	0,0	59,8
1996	0,0	3,8	410,5	451,1	178,5	92,5	41,4	9,8	0,0	2,9	82,9
1997	0,0	0,0	416,8	429,6	136,9	48,3	35,7	3,2	0,0	0,0	74,8
1998	9,3	7,8	366,7	529,7	232,6	110,0	12,0	6,3	4,4	0,0	88,1
1999	0,0	0,0	403,8	541,8	185,7	39,2	30,4	12,4	0,0	0,0	82,8
2000	0,0	0,0	511,4	537,3	256,2	49,8	24,9	12,3	8,0	2,7	96,5
2001	10,3	8,1	549,6	756,0	234,9	43,0	6,5	15,3	0,0	0,0	108,1
2002	0,0	4,2	570,5	662,8	332,9	43,7	54,6	6,1	0,0	0,0	110,0
2003	0,0	8,5	546,0	839,8	270,7	170,0	14,5	9,1	0,0	2,5	122,5
2004	0,0	4,3	693,9	957,2	363,9	171,5	31,0	12,2	3,5	0,0	145,7
2005	0,0	17,8	674,6	932,9	403,9	171,1	65,7	0,0	6,7	2,4	146,5
2006	0,0	0,0	686,5	852,9	372,6	125,5	34,2	18,7	0,0	0,0	134,1
2007	10,6	4,8	597,1	817,3	306,3	160,2	60,9	19,2	3,3	2,2	126,8
2008	0,0	9,8	611,0	749,0	305,8	103,6	71,3	16,6	6,4	4,3	119,6

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1993	9,0	9,7	1 268,3	944,8	331,0	69,6	20,4	16,2	16,0	11,1	186,3
1994	0,0	19,3	931,8	565,3	157,0	70,8	32,8	4,0	5,3	3,6	118,4
1995	9,0	9,6	647,0	572,4	190,7	66,1	13,0	0,0	5,1	0,0	97,0
1996	0,0	9,6	521,5	453,5	124,7	48,5	32,0	7,6	5,0	0,0	77,6
1997	0,0	14,1	832,4	599,3	166,6	28,3	25,6	18,7	4,8	0,0	108,3
1998	0,0	18,5	743,6	707,7	209,8	74,4	31,6	7,3	4,7	9,4	115,7
1999	0,0	27,4	948,7	666,5	193,6	61,9	25,6	7,1	4,6	0,0	121,6
2000	0,0	13,5	1 089,2	885,2	311,2	128,8	58,2	6,9	4,5	0,0	155,6
2001	0,0	13,4	990,4	1 015,8	336,7	114,2	66,0	13,3	8,8	0,0	159,3
2002	0,0	13,2	1 353,6	1 091,4	426,0	141,6	94,2	26,2	4,3	0,0	194,3
2003	0,0	4,4	1 441,6	1 175,7	302,0	169,1	90,7	28,7	4,2	0,0	196,8
2004	0,0	0,0	1 454,6	1 478,0	428,3	162,2	93,2	25,2	4,1	0,0	221,1
2005	0,0	4,5	1 378,2	1 423,5	530,9	228,0	52,2	31,3	4,0	0,0	223,2
2006	0,0	9,2	1 451,4	1 355,3	570,1	100,7	68,2	12,6	7,7	0,0	216,6
2007	0,0	0,0	1 709,6	1 443,9	507,1	172,3	77,7	19,1	15,2	0,0	241,4
2008	0,0	14,5	1 821,0	1 458,3	546,5	288,4	47,5	57,9	7,4	0,0	265,4
14 - Lanaudière											
1993	7,1	22,9	1 028,1	751,1	300,2	37,5	45,1	10,9	12,0	0,0	145,5
1994	7,1	15,0	890,9	648,7	226,1	70,2	43,5	24,5	5,6	0,0	127,0
1995	0,0	25,8	515,6	456,6	216,0	49,5	37,3	33,6	5,3	0,0	90,3
1996	0,0	7,2	647,9	568,4	164,2	28,8	46,7	9,8	0,0	0,0	93,5
1997	0,0	3,6	729,1	676,1	162,7	107,4	26,0	25,3	0,0	0,0	114,6
1998	0,0	35,1	661,4	553,4	132,5	62,9	31,3	9,2	0,0	0,0	96,5
1999	0,0	17,4	1 027,0	947,3	310,8	81,0	42,2	3,0	4,1	0,0	149,7
2000	0,0	24,3	920,9	1 125,0	349,2	86,9	21,4	5,8	0,0	0,0	151,5
2001	0,0	27,7	921,4	900,6	366,5	91,3	38,6	5,6	0,0	0,0	141,0
2002	0,0	13,9	1 005,7	994,0	310,2	109,7	34,3	8,2	18,4	0,0	152,0
2003	0,0	49,0	1 304,7	955,8	449,7	190,4	54,1	24,2	7,1	0,0	191,3
2004	0,0	39,2	1 199,3	1 335,4	423,9	144,0	57,3	15,9	0,0	2,8	200,7
2005	0,0	18,5	1 335,6	1 346,5	511,2	152,3	87,6	26,4	0,0	0,0	217,5
2006	0,0	15,3	1 490,5	1 392,5	522,7	242,1	90,6	18,6	6,4	0,0	237,7
2007	0,0	15,9	1 411,1	1 411,6	510,5	222,8	100,9	27,0	3,1	0,0	234,6
2008	0,0	8,3	2 161,4	1 781,0	553,9	251,5	88,1	38,8	3,0	2,3	316,2

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1993	0,0	31,6	1 598,4	1 313,1	407,9	119,6	82,5	19,4	20,4	0,0	236,6
1994	0,0	30,9	1 046,5	1 101,8	227,0	61,3	89,4	18,6	19,2	0,0	167,2
1995	0,0	20,1	901,0	986,4	360,9	61,5	72,0	6,0	9,1	0,0	153,6
1996	0,0	19,8	835,7	861,8	210,5	73,3	64,9	8,7	30,0	3,0	135,1
1997	0,0	12,9	723,3	742,5	364,0	45,3	50,4	8,4	8,0	0,0	122,5
1998	0,0	6,3	805,7	895,7	308,2	58,2	49,7	8,1	3,8	0,0	131,4
1999	0,0	21,6	1 025,6	713,0	251,8	72,5	13,4	10,4	0,0	0,0	131,0
2000	0,0	18,2	1 224,0	993,4	290,6	99,9	44,6	15,1	13,7	0,0	166,4
2001	0,0	21,0	1 698,8	1 297,6	357,8	91,4	40,8	14,6	3,3	0,0	211,1
2002	0,0	29,7	1 879,3	1 515,9	491,4	204,3	46,8	7,0	3,1	0,0	251,1
2003	0,0	32,6	1 997,8	1 623,1	445,0	163,6	58,4	6,8	3,0	0,0	261,9
2004	0,0	17,8	2 107,1	1 606,5	456,0	177,3	61,1	15,5	8,7	2,3	271,1
2005	0,0	15,2	1 796,9	1 518,6	413,4	209,6	48,0	28,4	11,2	0,0	250,5
2006	0,0	18,8	1 549,1	1 441,7	520,6	146,7	93,7	34,8	2,7	0,0	238,6
2007	0,0	12,9	1 850,0	1 480,3	422,6	207,6	124,0	22,0	2,6	0,0	259,8
2008	0,0	23,1	1 900,6	1 776,2	518,9	258,1	92,2	22,3	12,7	0,0	290,9
16 - Montérégie											
1993	2,2	18,5	821,6	811,2	258,0	103,8	36,4	11,0	4,8	0,0	144,9
1994	2,2	17,4	704,4	635,3	159,8	85,8	52,9	18,6	6,1	0,0	118,3
1995	0,0	16,3	692,5	723,7	177,2	61,4	23,6	8,7	4,4	0,0	114,3
1996	0,0	11,6	525,4	544,5	179,7	42,0	20,0	18,0	4,2	0,0	90,8
1997	0,0	9,2	558,4	563,2	139,3	45,3	21,7	11,2	6,5	0,0	90,1
1998	0,0	9,1	671,4	588,2	191,5	47,8	16,8	3,7	1,2	0,9	99,6
1999	0,0	12,5	729,7	672,6	215,2	50,4	22,0	5,4	1,2	0,9	110,8
2000	0,0	17,1	918,9	785,6	239,8	57,7	27,4	9,8	2,3	0,9	132,6
2001	0,0	22,7	1 083,1	803,8	261,3	92,3	28,3	8,8	2,2	0,9	146,4
2002	0,0	22,7	1 114,3	841,6	298,1	80,4	27,4	6,9	2,1	0,8	151,1
2003	3,1	16,0	1 174,0	951,9	324,4	123,0	44,0	16,1	4,2	0,0	167,2
2004	0,0	18,6	1 242,4	1 081,7	354,8	129,3	54,2	13,5	1,0	0,8	181,3
2005	0,0	15,5	1 094,6	996,7	368,0	142,5	18,9	18,5	2,0	0,0	166,6
2006	0,0	19,7	1 068,5	1 023,5	361,5	171,7	67,4	11,9	5,8	1,4	172,0
2007	0,0	12,7	1 231,4	1 183,0	409,5	156,1	69,3	16,4	3,8	0,7	194,4
2008	0,0	21,0	1 409,0	1 389,3	458,4	192,5	73,1	21,2	0,9	0,7	225,2

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1993	458,0	540,5	22 133,3	21 818,2	11 891,9	5 899,7	2 392,3	2 077,2	943,4	0,0	6 292,0
1994	299,4	859,3	20 000,0	18 766,8	9 046,5	3 738,3	3 619,9	828,7	480,8	502,5	5 348,8
1995	143,5	103,4	14 960,6	16 622,7	11 414,4	8 011,9	2 183,4	536,2	502,5	1 063,8	4 960,3
1996	0,0	490,7	21 012,7	16 788,3	11 881,2	9 065,9	3 816,8	2 387,3	1 530,6	471,7	6 099,6
1997	0,0	645,8	12 436,5	13 842,5	7 816,1	7 650,3	3 225,8	1 794,9	434,8	463,0	4 338,1
1998	319,0	726,6	7 907,0	11 675,1	6 768,6	6 406,7	4 698,0	250,6	0,0	0,0	3 533,6
1999	0,0	550,5	11 816,2	13 720,3	6 997,7	5 570,3	5 647,8	1 000,0	1 953,1	0,0	4 173,0
2000	0,0	172,6	13 859,3	14 095,7	6 605,9	6 117,0	3 395,1	491,4	0,0	0,0	3 937,8
2001	0,0	249,0	19 591,8	15 681,2	9 490,7	5 235,6	4 819,3	1 435,4	696,9	0,0	5 173,5
2002	0,0	859,1	18 835,0	15 789,5	12 814,6	7 216,5	7 692,3	2 247,2	0,0	0,0	5 993,4
2003	327,9	591,2	14 728,7	12 357,0	5 665,0	6 091,4	3 735,6	2 169,2	1 929,3	0,0	4 424,4
2004	0,0	165,6	13 307,2	14 031,2	8 823,5	3 535,4	4 637,7	1 833,0	307,7	0,0	4 221,4
2005	0,0	328,9	12 030,1	13 004,5	6 532,7	4 197,5	4 985,3	1 149,4	604,2	0,0	3 867,6
2006	333,9	165,0	13 644,9	11 956,5	8 290,2	3 381,6	3 703,7	1 682,2	303,0	0,0	3 956,7
2007	0,0	421,2	11 275,4	14 285,7	7 379,1	5 263,2	1 400,6	361,7	299,4	0,0	3 772,9
2008	0,0	767,3	16 605,2	12 500,0	7 529,4	3 341,9	1 381,2	877,2	1 159,4	333,3	4 210,7
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1993	0,0	87,4	5 719,2	5 993,2	2 434,1	491,4	319,5	0,0	337,8	0,0	1 585,2
1994	0,0	263,9	6 944,4	5 396,3	3 232,3	1 670,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 822,5
1995	0,0	258,0	7 129,8	6 521,7	2 816,9	468,4	0,0	214,1	0,0	0,0	1 859,9
1996	0,0	248,1	5 027,9	5 132,2	2 166,1	1 131,2	0,0	206,2	281,7	0,0	1 459,5
1997	0,0	0,0	4 909,1	3 425,8	2 314,0	674,2	265,3	0,0	0,0	0,0	1 134,0
1998	0,0	77,8	7 355,5	7 056,8	3 475,5	1 735,4	0,0	571,4	495,0	0,0	2 037,4
1999	0,0	75,0	4 332,8	4 362,4	2 579,7	851,1	519,5	174,5	0,0	0,0	1 246,1
2000	0,0	73,4	3 484,3	3 305,8	1 897,8	635,6	728,2	0,0	238,1	0,0	979,6
2001	0,0	0,0	5 208,3	3 565,6	2 346,0	961,5	710,9	319,5	0,0	0,0	1 224,3
2002	0,0	285,7	4 738,6	4 490,5	2 061,9	919,1	1 116,1	0,0	223,2	0,0	1 292,5
2003	0,0	0,0	8 094,4	7 419,9	2 731,4	2 218,4	435,7	148,6	0,0	0,0	1 904,2
2004	0,0	139,2	9 061,0	7 105,7	3 506,1	2 110,4	1 321,6	556,3	0,0	0,0	2 152,6
2005	0,0	274,9	10 797,3	7 216,5	4 245,3	2 144,0	660,8	0,0	0,0	0,0	2 270,1
2006	0,0	631,1	8 121,0	10 839,2	4 032,3	1 990,8	826,4	0,0	0,0	0,0	2 374,7
2007	0,0	629,8	10 483,9	8 375,2	4 436,9	620,2	1 600,0	256,4	0,0	177,6	2 368,6
2008	0,0	505,1	10 526,3	8 551,5	4 194,6	2 083,3	1 127,8	382,2	0,0	0,0	2 478,6

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.
Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Province de Québec*											
1993	2,5	1,3	189,4	387,8	188,4	85,9	37,4	28,8	8,2	1,4	74,4
1994	1,2	0,8	157,9	294,5	159,4	69,2	33,8	18,3	5,5	2,0	58,1
1995	0,8	1,1	127,3	274,7	127,5	61,2	29,2	15,9	4,2	1,0	49,2
1996	0,4	0,2	105,5	254,2	129,6	65,8	26,0	13,4	5,9	1,0	45,8
1997	0,4	0,6	98,9	243,3	139,3	64,4	32,6	11,2	4,9	0,8	45,2
1998	0,5	1,3	114,6	306,3	167,2	74,9	45,2	14,4	4,9	1,0	54,8
1999	1,4	0,6	118,7	332,4	177,2	95,1	42,1	19,7	4,5	0,8	59,2
2000	0,0	0,4	131,9	329,9	183,4	88,7	48,0	21,5	5,8	0,9	60,6
2001	0,5	1,1	151,0	425,3	260,2	126,0	58,4	27,1	5,9	2,5	78,4
2002	0,5	0,0	161,5	452,3	273,1	134,7	63,0	30,9	6,9	1,7	83,0
2003	1,1	0,6	194,7	513,3	295,0	159,8	75,8	27,8	8,5	2,0	93,0
2004	1,1	0,6	195,9	532,8	326,2	160,1	82,5	31,3	11,0	1,8	97,3
2005	1,1	0,7	174,6	528,5	346,3	185,1	91,4	36,4	14,3	3,0	100,3
2006	0,0	0,7	195,8	558,2	330,2	165,0	99,5	40,5	13,0	3,4	101,4
2007	0,5	0,7	212,5	586,4	349,9	198,8	99,2	45,8	17,8	4,0	108,7
2008	0,5	1,2	267,4	681,6	393,8	194,0	121,7	46,8	15,6	2,1	121,7
Province de Québec hors Montréal											
1993	2,6	1,0	190,6	421,6	200,6	78,0	34,1	25,8	9,1	1,5	74,3
1994	1,6	1,1	160,5	325,7	174,3	66,0	33,2	17,3	6,2	2,0	59,7
1995	1,1	0,8	130,3	302,3	132,3	52,9	24,6	14,3	3,5	0,8	48,8
1996	0,6	0,3	104,0	273,1	126,3	58,4	22,5	11,8	5,7	0,8	44,0
1997	0,6	0,8	95,8	251,5	134,0	55,4	27,8	8,2	4,1	1,1	41,9
1998	0,6	1,6	113,3	310,0	166,3	65,3	36,7	13,8	3,9	1,3	51,4
1999	1,3	0,3	114,5	322,3	172,2	72,7	29,0	15,9	3,2	0,8	52,3
2000	0,0	0,5	126,0	347,6	190,8	78,3	32,7	16,7	6,4	1,2	57,1
2001	0,0	1,1	150,4	431,9	252,9	107,0	43,6	19,4	4,6	2,4	71,2
2002	0,7	0,0	165,5	445,7	266,0	108,9	47,1	23,4	5,2	0,9	75,1
2003	1,4	0,8	197,3	535,7	283,4	139,3	53,3	21,1	6,1	1,6	86,7
2004	1,4	0,8	209,3	563,3	347,1	150,0	71,9	24,4	6,9	1,5	95,9
2005	0,7	0,9	184,3	547,9	356,5	171,2	76,3	23,8	10,8	2,3	95,3
2006	0,0	0,9	208,7	564,1	328,2	156,5	84,1	27,6	7,3	2,2	95,4
2007	0,0	0,3	210,7	580,9	337,5	177,9	72,2	30,9	11,0	3,1	98,1
2008	0,7	1,6	267,9	660,7	381,7	171,3	94,4	30,4	8,3	1,7	109,9

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1993	0,0	0,0	241,1	557,1	344,4	133,4	62,5	31,1	10,1	0,0	99,0
1994	0,0	0,0	152,7	723,4	95,4	103,8	52,5	0,0	0,0	0,0	76,1
1995	0,0	0,0	197,9	590,4	219,6	12,1	21,3	11,7	0,0	0,0	71,5
1996	0,0	0,0	197,1	372,4	187,1	65,4	10,7	17,2	17,7	0,0	63,9
1997	0,0	0,0	138,2	485,0	174,6	97,0	0,0	11,2	0,0	0,0	62,1
1998	0,0	0,0	238,4	784,0	267,4	119,4	34,3	16,5	0,0	0,0	101,3
1999	0,0	0,0	122,9	331,8	164,9	110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9
2000	0,0	0,0	38,9	234,6	234,7	83,5	48,9	11,0	14,4	5,7	46,2
2001	0,0	0,0	122,4	421,5	306,9	141,1	52,4	21,9	0,0	11,1	73,2
2002	22,3	0,0	143,6	462,3	413,3	126,9	83,7	11,0	13,3	0,0	84,4
2003	0,0	0,0	265,3	824,1	556,0	258,3	45,0	0,0	0,0	0,0	126,6
2004	0,0	0,0	288,2	513,5	402,3	170,8	80,1	22,7	18,7	0,0	101,1
2005	0,0	0,0	231,4	692,2	618,0	266,5	119,3	11,6	0,0	0,0	124,5
2006	0,0	0,0	247,6	848,1	283,0	93,6	124,1	18,0	0,0	0,0	105,8
2007	0,0	0,0	108,8	621,4	351,7	111,7	18,2	18,9	11,6	0,0	82,0
2008	0,0	0,0	254,4	605,2	401,6	162,1	55,6	19,9	0,0	0,0	95,5
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1993	20,6	4,2	96,1	593,3	287,0	73,0	28,1	27,4	7,2	5,6	85,9
1994	10,6	0,0	107,4	479,9	359,0	68,1	21,0	8,8	0,0	0,0	74,4
1995	0,0	0,0	126,4	479,9	93,6	78,9	21,4	17,2	6,7	0,0	61,7
1996	0,0	0,0	103,7	346,2	170,1	76,8	21,7	16,7	6,5	0,0	55,7
1997	0,0	0,0	59,9	315,9	216,1	64,7	36,6	8,2	0,0	0,0	49,6
1998	0,0	4,9	84,7	238,8	168,4	120,0	14,9	4,0	5,9	5,1	48,2
1999	0,0	0,0	63,6	256,9	297,0	130,3	38,4	11,7	5,6	0,0	57,4
2000	0,0	0,0	143,0	358,8	241,2	69,7	16,0	7,7	0,0	0,0	60,6
2001	0,0	0,0	62,1	322,8	198,1	99,2	34,2	15,3	0,0	0,0	52,8
2002	0,0	0,0	56,6	365,7	287,5	209,3	27,9	30,6	0,0	0,0	71,6
2003	15,9	0,0	139,1	425,2	221,2	135,4	61,4	22,9	0,0	0,0	75,1
2004	0,0	0,0	218,2	481,4	317,1	108,8	67,7	15,4	4,7	0,0	87,9
2005	16,1	0,0	74,4	417,9	316,6	258,3	24,2	23,6	4,6	4,1	78,9
2006	0,0	0,0	128,6	571,7	288,3	186,8	63,6	8,1	9,0	0,0	86,6
2007	0,0	0,0	214,7	579,3	241,1	179,3	53,2	46,8	8,7	0,0	94,2
2008	0,0	0,0	140,3	424,7	262,3	160,5	109,4	26,9	0,0	0,0	75,5

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1993	0,0	0,0	141,4	390,3	191,3	111,7	38,0	26,4	3,1	0,0	77,0
1994	0,0	2,6	135,8	295,1	223,0	51,5	23,9	21,9	3,0	2,3	63,7
1995	0,0	0,0	93,1	264,2	155,8	45,5	17,2	5,9	5,8	0,0	47,5
1996	0,0	0,0	115,2	301,0	118,7	72,1	17,3	13,4	5,5	2,3	50,5
1997	0,0	0,0	97,9	342,7	121,5	90,0	34,8	17,0	2,6	6,7	56,4
1998	0,0	2,7	147,4	310,5	202,8	95,6	70,2	20,5	5,0	4,3	67,2
1999	12,5	0,0	155,8	416,3	191,1	80,0	38,9	22,1	4,8	2,1	70,5
2000	0,0	0,0	155,4	357,2	237,3	62,0	43,1	32,9	9,2	2,1	70,3
2001	0,0	0,0	164,6	561,4	333,2	195,9	37,3	25,4	13,3	6,0	102,4
2002	0,0	0,0	164,6	510,8	331,0	137,9	69,8	30,4	4,3	1,9	94,8
2003	0,0	0,0	182,6	683,3	357,1	229,5	121,9	31,8	6,3	1,8	120,9
2004	0,0	0,0	226,8	645,1	398,0	196,2	63,8	24,7	8,2	3,5	115,0
2005	0,0	2,9	156,0	770,1	360,4	176,6	119,6	28,3	14,1	1,7	118,4
2006	0,0	0,0	168,9	700,8	433,3	182,4	72,2	44,8	17,7	6,5	119,0
2007	0,0	0,0	242,7	669,1	428,5	147,8	91,6	43,9	19,4	6,3	117,5
2008	0,0	3,2	273,2	726,3	451,8	199,5	138,3	48,8	17,2	6,1	130,7
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1993	0,0	0,0	127,0	396,8	194,2	48,4	37,1	5,5	4,1	2,8	57,5
1994	0,0	0,0	117,5	355,3	242,6	83,7	41,8	16,2	0,0	2,7	61,2
1995	0,0	0,0	120,0	348,4	121,4	76,0	42,1	26,2	0,0	2,7	53,1
1996	0,0	0,0	85,5	224,6	139,3	58,0	37,6	15,4	0,0	0,0	39,9
1997	0,0	0,0	63,9	244,0	151,5	38,8	33,0	2,5	0,0	0,0	36,9
1998	0,0	0,0	123,8	372,9	193,1	81,9	28,8	14,8	0,0	0,0	58,1
1999	0,0	0,0	94,3	288,4	134,2	31,4	34,1	22,0	3,2	0,0	43,9
2000	0,0	0,0	150,2	357,7	163,7	92,8	20,1	19,4	9,3	5,0	59,0
2001	0,0	6,7	198,7	504,2	257,7	126,4	36,8	16,8	3,0	0,0	80,1
2002	0,0	0,0	211,2	581,4	363,3	94,3	33,3	14,3	2,9	4,7	90,9
2003	0,0	0,0	243,0	650,9	299,3	127,4	70,3	21,5	2,8	0,0	99,2
2004	0,0	0,0	240,8	852,4	516,9	188,6	100,4	28,8	2,7	2,2	132,9
2005	0,0	0,0	288,0	881,4	509,1	248,8	112,6	31,6	5,3	0,0	141,6
2006	0,0	0,0	335,8	692,2	524,7	252,2	152,5	37,1	7,9	2,1	135,6
2007	0,0	0,0	312,2	752,9	488,3	323,9	121,7	33,0	7,7	0,0	136,0
2008	0,0	0,0	366,9	873,6	496,8	193,3	148,0	44,7	5,0	0,0	142,2

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1993	0,0	0,0	244,5	463,3	224,1	51,4	8,5	14,5	15,2	0,0	78,3
1994	0,0	0,0	143,9	363,6	141,0	68,8	50,9	14,1	14,5	4,9	60,4
1995	0,0	0,0	170,6	357,1	103,2	43,7	8,4	13,8	6,9	0,0	52,7
1996	0,0	0,0	27,9	313,7	126,6	99,3	33,8	27,1	13,1	0,0	49,4
1997	0,0	0,0	139,9	302,8	152,2	45,6	76,4	4,4	0,0	0,0	53,3
1998	0,0	0,0	122,5	458,2	244,3	57,1	50,8	8,7	0,0	0,0	68,5
1999	0,0	0,0	123,4	386,1	192,1	129,5	59,2	17,3	11,0	0,0	68,2
2000	0,0	0,0	116,7	472,2	211,2	114,2	51,2	21,3	15,8	0,0	74,8
2001	0,0	0,0	198,7	479,5	323,6	117,9	52,9	38,0	10,1	4,3	90,9
2002	0,0	0,0	210,8	669,1	275,3	109,3	53,9	41,9	4,9	0,0	101,8
2003	0,0	0,0	183,8	748,0	429,5	176,3	47,0	24,8	9,5	0,0	117,2
2004	0,0	0,0	277,2	634,8	382,3	187,8	107,4	24,7	18,4	3,9	118,3
2005	0,0	0,0	143,5	676,6	535,7	152,2	91,3	24,7	18,0	3,7	119,4
2006	0,0	5,7	110,1	491,8	398,1	160,6	123,5	33,3	0,0	3,6	95,3
2007	0,0	0,0	108,4	587,7	346,2	215,9	52,7	50,7	8,7	3,4	99,4
2008	13,0	0,0	255,5	799,0	434,7	196,4	53,3	25,9	12,8	0,0	123,8
06 - Montréal											
1993	1,8	2,1	184,9	301,1	159,4	109,7	48,6	39,0	5,6	1,4	74,7
1994	0,0	0,0	147,8	212,3	124,9	78,7	35,8	22,0	3,4	2,1	53,1
1995	0,0	2,1	115,3	200,7	116,4	85,1	44,3	21,5	6,7	1,4	50,4
1996	0,0	0,0	111,9	202,6	137,0	86,1	37,0	18,8	6,6	1,4	51,4
1997	0,0	0,0	111,5	220,6	150,8	88,8	48,2	21,6	7,5	0,0	55,5
1998	0,0	0,0	119,8	295,7	169,0	101,2	72,5	16,7	8,3	0,0	65,5
1999	1,9	2,1	135,5	360,3	188,1	153,9	82,9	32,7	9,1	0,7	80,5
2000	0,0	0,0	154,8	281,6	167,0	114,7	94,4	37,8	3,9	0,0	71,5
2001	2,0	1,0	153,2	408,1	276,0	171,7	102,1	53,5	10,6	2,7	100,6
2002	0,0	0,0	146,6	470,6	288,4	195,7	108,3	56,7	13,1	4,1	107,4
2003	0,0	0,0	185,0	448,7	320,6	208,0	138,1	50,7	17,4	3,4	112,5
2004	0,0	0,0	147,1	442,3	279,0	183,8	111,4	54,4	26,0	2,6	101,8
2005	2,0	0,0	139,6	470,0	322,8	217,3	131,2	78,2	27,0	5,2	115,5
2006	0,0	0,0	149,3	540,6	335,1	184,6	139,3	82,1	34,0	7,0	119,8
2007	2,0	2,0	218,9	602,5	380,6	246,6	167,5	93,1	42,4	6,9	141,2
2008	0,0	0,0	265,9	742,6	424,3	246,4	189,8	97,2	42,2	3,7	157,3

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1993	8,4	4,7	206,7	317,2	179,8	84,7	34,2	4,4	0,0	0,0	67,0
1994	0,0	0,0	109,3	241,2	102,2	72,0	33,6	8,4	0,0	0,0	44,6
1995	0,0	0,0	159,1	243,0	66,8	19,7	26,5	16,2	0,0	0,0	39,1
1996	8,9	0,0	98,3	188,0	122,8	13,4	0,0	11,8	0,0	0,0	32,4
1997	0,0	4,4	48,2	182,0	125,2	27,9	19,8	7,7	5,9	0,0	32,1
1998	0,0	0,0	66,8	173,6	91,3	66,3	32,9	26,4	22,3	0,0	37,7
1999	0,0	4,4	113,4	255,3	195,8	54,8	19,9	11,1	0,0	0,0	45,9
2000	0,0	0,0	102,8	368,4	179,2	116,2	33,4	14,5	0,0	0,0	58,3
2001	0,0	4,4	101,0	468,4	264,8	109,9	60,9	31,7	4,9	0,0	75,1
2002	0,0	0,0	144,4	605,4	196,6	94,0	20,8	51,5	4,7	4,6	82,6
2003	0,0	0,0	186,7	443,3	190,9	103,0	43,1	30,2	18,2	0,0	74,0
2004	0,0	0,0	113,5	525,7	260,8	136,6	67,4	23,1	13,1	0,0	81,4
2005	0,0	0,0	101,7	635,0	389,1	136,2	85,8	26,1	12,6	0,0	98,8
2006	0,0	0,0	275,0	513,4	269,6	180,2	55,6	42,4	4,1	0,0	96,8
2007	0,0	0,0	210,9	660,0	463,1	214,5	48,6	29,6	7,9	3,7	115,9
2008	0,0	0,0	270,3	867,2	469,8	202,8	73,9	40,2	3,8	0,0	135,9
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1993	0,0	0,0	374,2	720,3	313,6	118,4	107,8	139,6	72,8	0,0	149,7
1994	0,0	0,0	478,4	626,5	185,1	189,9	52,7	16,8	14,1	10,5	120,3
1995	0,0	0,0	378,2	443,1	232,1	151,5	26,0	48,8	27,1	0,0	102,2
1996	0,0	0,0	155,6	641,6	187,0	171,6	25,9	7,9	12,9	10,4	89,5
1997	0,0	0,0	246,0	308,4	134,6	60,7	26,1	7,7	12,2	0,0	59,4
1998	0,0	0,0	214,8	331,4	234,9	82,1	0,0	7,6	0,0	0,0	62,2
1999	0,0	0,0	141,3	349,7	184,4	71,1	41,8	14,9	0,0	0,0	59,1
2000	0,0	0,0	99,2	338,6	235,3	115,1	43,4	29,5	0,0	0,0	61,4
2001	0,0	0,0	137,7	419,4	201,6	102,8	45,7	29,5	0,0	0,0	65,1
2002	0,0	0,0	268,3	534,9	323,3	86,0	81,3	29,2	10,1	0,0	92,6
2003	0,0	0,0	334,1	607,2	376,6	88,7	35,3	22,1	0,0	0,0	101,7
2004	0,0	0,0	250,6	596,5	594,5	229,0	19,0	14,8	0,0	0,0	112,1
2005	0,0	0,0	364,3	758,6	453,9	306,0	20,4	7,5	27,7	0,0	132,3
2006	0,0	0,0	192,6	598,9	399,5	120,4	21,6	38,3	0,0	0,0	94,2
2007	0,0	0,0	345,2	882,1	297,7	122,6	90,0	23,8	17,4	0,0	122,6
2008	0,0	12,0	211,0	610,8	469,5	123,5	69,1	24,9	8,5	0,0	103,6

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1993	0,0	0,0	731,4	985,0	253,9	195,8	117,6	23,8	17,6	0,0	187,9
1994	26,6	0,0	482,6	398,4	362,0	221,1	98,7	58,4	0,0	0,0	137,7
1995	26,8	13,2	250,8	646,7	394,2	199,7	19,9	11,4	0,0	0,0	121,1
1996	0,0	0,0	408,8	529,5	265,8	206,3	77,7	11,1	0,0	0,0	117,3
1997	0,0	13,7	318,8	693,5	302,9	148,1	59,6	22,0	16,0	0,0	123,3
1998	30,4	13,9	164,4	648,1	458,1	68,4	20,2	10,9	0,0	16,3	103,8
1999	0,0	0,0	391,5	688,5	360,1	97,2	40,9	32,6	0,0	0,0	118,1
2000	0,0	14,3	361,1	679,1	435,3	213,1	41,9	32,7	14,6	0,0	129,5
2001	0,0	14,4	109,7	389,8	444,2	114,5	0,0	21,6	0,0	0,0	74,5
2002	0,0	0,0	370,4	782,0	352,6	91,2	91,2	32,5	0,0	0,0	121,1
2003	0,0	0,0	500,9	976,8	387,3	158,5	24,5	10,9	13,7	0,0	140,6
2004	0,0	31,3	606,8	984,9	670,7	357,5	182,5	32,9	13,3	0,0	194,8
2005	0,0	16,1	683,4	1 035,5	538,4	267,2	111,9	33,1	0,0	0,0	178,2
2006	0,0	16,9	465,1	804,9	431,3	202,9	90,6	33,5	0,0	0,0	136,2
2007	0,0	0,0	646,2	662,0	328,4	404,9	63,5	34,5	0,0	12,2	143,3
2008	0,0	18,6	457,6	812,5	362,7	167,8	0,0	12,0	0,0	0,0	119,2
10 - Nord-du-Québec											
1993	0,0	0,0	819,7	1 059,0	216,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,2
1994	0,0	0,0	343,2	1 047,9	375,0	280,1	0,0	0,0	0,0	0,0	168,3
1995	0,0	0,0	225,7	438,6	0,0	0,0	93,8	0,0	0,0	0,0	60,2
1996	0,0	0,0	0,0	610,7	130,7	202,2	0,0	0,0	97,2	0,0	81,4
1997	0,0	0,0	121,8	147,5	142,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,1	0,0	0,0	10,7
1999	0,0	0,0	0,0	594,4	159,7	0,0	105,8	58,4	0,0	0,0	76,6
2000	0,0	0,0	286,9	156,3	163,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
2001	0,0	0,0	0,0	810,4	172,4	0,0	0,0	56,9	0,0	0,0	80,0
2002	0,0	0,0	0,0	692,0	168,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,2
2003	0,0	0,0	158,5	825,1	340,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
2004	221,2	0,0	0,0	491,8	676,8	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	109,1
2005	0,0	97,0	0,0	174,5	662,3	566,0	180,8	0,0	0,0	0,0	124,0
2006	0,0	0,0	0,0	356,5	171,2	194,2	184,8	0,0	0,0	0,0	63,4
2007	0,0	0,0	191,2	357,8	178,3	191,2	198,0	0,0	0,0	0,0	78,0
2008	0,0	0,0	0,0	386,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1993	0,0	0,0	283,0	584,6	267,7	168,7	79,1	83,4	37,0	0,0	115,8
1994	0,0	0,0	117,1	177,4	170,6	86,3	40,3	34,5	18,0	0,0	53,5
1995	0,0	0,0	48,2	149,9	120,4	66,7	82,1	0,0	0,0	0,0	33,5
1996	0,0	0,0	49,1	89,9	64,7	23,3	20,7	11,0	0,0	0,0	18,8
1997	34,6	0,0	49,3	62,3	68,7	49,5	21,3	32,7	0,0	0,0	26,5
1998	0,0	0,0	0,0	128,7	70,7	55,1	22,1	0,0	0,0	0,0	17,3
1999	0,0	0,0	26,3	33,4	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
2000	0,0	0,0	111,6	249,0	160,1	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	32,1
2001	0,0	0,0	118,5	539,3	130,4	71,4	25,0	0,0	0,0	10,6	51,0
2002	0,0	0,0	91,8	408,9	181,8	112,8	53,4	11,0	0,0	0,0	51,5
2003	0,0	0,0	191,8	358,6	139,0	232,7	58,2	33,6	0,0	0,0	62,3
2004	0,0	0,0	66,2	318,0	272,6	82,3	62,9	11,5	0,0	0,0	48,2
2005	0,0	0,0	68,2	317,5	406,9	86,4	68,0	0,0	0,0	0,0	50,8
2006	0,0	0,0	0,0	435,9	264,3	90,0	36,5	24,2	0,0	0,0	57,6
2007	0,0	0,0	134,5	263,2	214,6	186,2	76,7	12,5	11,8	0,0	51,7
2008	0,0	0,0	172,8	352,7	375,6	47,3	39,5	39,7	23,4	0,0	69,6
12 - Chaudière-Appalaches											
1993	0,0	0,0	54,5	316,4	154,7	41,2	11,6	23,7	5,6	0,0	46,3
1994	0,0	0,0	65,8	169,6	84,9	65,5	28,9	13,1	0,0	0,0	34,0
1995	0,0	0,0	51,3	150,7	72,8	30,4	11,6	6,4	5,1	0,0	23,9
1996	0,0	0,0	37,9	221,6	106,2	44,1	28,9	0,0	0,0	0,0	30,6
1997	0,0	0,0	56,3	160,9	141,8	59,3	35,1	3,1	4,6	0,0	34,1
1998	0,0	0,0	50,5	216,2	84,1	48,8	17,5	9,2	0,0	0,0	30,9
1999	0,0	0,0	70,9	243,7	75,8	29,2	11,8	12,1	4,1	0,0	33,9
2000	0,0	0,0	26,6	262,2	134,0	68,3	23,9	15,0	0,0	3,5	39,4
2001	0,0	0,0	68,7	300,6	198,8	70,4	30,9	3,0	0,0	0,0	48,0
2002	0,0	0,0	78,7	335,5	185,6	96,5	25,8	8,9	3,6	0,0	52,9
2003	0,0	4,1	102,6	396,6	259,9	105,5	27,4	8,8	3,5	0,0	65,0
2004	0,0	0,0	181,0	378,1	250,2	115,0	43,1	23,6	0,0	0,0	71,4
2005	0,0	0,0	91,7	292,5	297,0	116,2	52,5	26,7	10,0	5,9	65,7
2006	0,0	0,0	91,9	300,5	310,6	114,9	93,5	15,0	3,3	2,8	66,1
2007	0,0	0,0	45,3	313,2	202,0	96,0	32,0	15,4	6,4	5,4	51,4
2008	0,0	0,0	90,0	290,6	245,3	140,4	64,7	25,4	3,1	0,0	60,3

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1993	0,0	0,0	273,0	477,4	286,0	95,2	55,4	41,8	0,0	4,7	97,9
1994	8,6	0,0	207,0	258,1	103,3	38,1	13,4	16,5	11,0	4,5	49,5
1995	0,0	0,0	142,0	255,1	117,2	39,1	13,1	12,1	0,0	0,0	42,6
1996	0,0	0,0	132,3	176,6	52,3	20,3	19,3	12,0	0,0	4,2	30,4
1997	0,0	4,5	79,2	176,5	90,0	34,7	6,3	3,9	5,2	0,0	28,4
1998	0,0	4,5	121,4	302,6	175,9	57,9	37,8	7,6	5,1	0,0	50,4
1999	0,0	0,0	96,5	306,5	140,4	99,0	25,3	33,3	9,9	0,0	52,4
2000	0,0	0,0	134,5	305,7	249,6	95,6	31,7	14,3	14,5	0,0	59,5
2001	0,0	0,0	127,4	418,2	276,1	97,8	25,8	31,2	0,0	0,0	68,8
2002	0,0	0,0	181,4	441,5	242,0	98,8	86,6	20,2	9,2	0,0	76,0
2003	0,0	0,0	182,4	548,0	294,9	91,6	48,5	29,4	17,9	0,0	85,4
2004	0,0	0,0	251,9	605,2	337,4	141,6	57,9	25,6	8,7	0,0	98,1
2005	0,0	0,0	225,8	584,4	381,5	124,3	75,0	34,7	12,8	3,2	100,1
2006	0,0	0,0	295,0	766,3	302,2	124,4	99,1	18,9	4,2	6,3	108,3
2007	0,0	0,0	196,3	651,9	337,6	220,7	108,7	31,7	12,2	6,1	107,6
2008	0,0	0,0	375,2	825,8	488,4	200,2	86,9	48,3	15,8	0,0	138,8
14 - Lanaudière											
1993	6,8	3,6	156,0	352,3	139,7	43,4	11,2	17,3	11,2	0,0	52,0
1994	0,0	0,0	112,0	240,2	157,1	49,4	43,6	30,1	5,3	4,6	47,3
1995	6,9	3,5	123,9	254,3	44,1	16,9	10,7	9,8	5,0	0,0	31,8
1996	0,0	0,0	121,6	257,0	73,1	29,7	5,2	9,5	0,0	0,0	32,0
1997	0,0	0,0	91,3	219,9	47,8	18,5	15,7	3,1	0,0	0,0	26,4
1998	0,0	0,0	97,6	248,3	165,3	6,5	20,8	3,0	4,2	0,0	33,8
1999	0,0	0,0	111,6	384,5	265,6	77,0	5,2	14,7	4,0	0,0	54,5
2000	0,0	0,0	127,1	342,4	136,3	74,7	16,0	8,6	3,9	0,0	45,5
2001	0,0	0,0	186,2	375,4	231,4	47,5	66,2	22,3	3,7	0,0	61,4
2002	0,0	0,0	121,4	270,1	250,2	48,6	40,4	16,3	3,6	0,0	48,7
2003	0,0	0,0	134,9	411,1	179,1	113,0	48,7	10,7	7,0	3,3	59,3
2004	0,0	0,0	83,7	410,7	237,3	155,3	64,3	28,9	3,4	3,1	65,9
2005	0,0	0,0	196,6	288,7	284,5	105,8	34,2	18,2	3,3	3,0	61,9
2006	0,0	3,6	215,7	565,1	329,6	154,3	56,8	20,9	6,5	0,0	89,0
2007	0,0	0,0	183,8	499,3	269,0	214,3	58,5	24,0	9,4	5,4	84,2
2008	0,0	3,9	277,9	630,6	367,3	132,4	66,3	16,4	9,2	0,0	99,2

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1993	0,0	0,0	211,2	486,2	226,3	33,8	45,7	34,3	14,7	3,9	75,0
1994	0,0	0,0	212,1	415,7	190,5	38,3	43,9	21,0	9,3	0,0	65,2
1995	0,0	0,0	119,9	335,3	165,4	48,2	47,4	14,4	0,0	0,0	50,0
1996	0,0	0,0	72,0	299,1	121,7	29,6	36,6	5,6	20,8	0,0	39,2
1997	0,0	0,0	83,3	165,9	104,4	15,1	32,0	8,2	3,9	0,0	27,8
1998	0,0	3,0	83,0	265,0	115,2	36,8	54,3	23,7	7,4	3,4	42,0
1999	0,0	0,0	127,2	349,9	147,1	33,3	18,1	7,7	0,0	3,2	44,1
2000	0,0	2,9	128,2	388,8	176,4	64,4	13,6	9,9	3,4	0,0	50,8
2001	0,0	0,0	207,9	400,9	204,0	98,0	36,5	16,7	6,5	3,0	63,7
2002	0,0	0,0	236,8	427,9	307,0	137,3	42,0	20,9	6,2	0,0	76,6
2003	0,0	0,0	282,2	608,6	244,9	176,1	58,5	15,8	6,0	8,1	91,5
2004	0,0	0,0	258,2	737,3	321,4	139,4	86,3	30,9	5,8	0,0	104,0
2005	0,0	0,0	191,0	589,9	336,2	189,4	68,9	28,3	25,1	2,5	95,8
2006	0,0	0,0	267,7	675,2	249,4	183,6	71,3	19,4	5,4	0,0	96,1
2007	0,0	0,0	185,8	653,3	350,5	155,0	67,4	23,9	15,8	0,0	95,4
2008	0,0	3,2	233,8	773,9	329,6	90,5	120,0	19,9	7,6	2,1	103,2
16 - Montérégie											
1993	2,1	1,1	138,7	266,6	118,9	59,5	15,7	14,1	4,7	1,3	47,9
1994	0,0	1,1	140,2	228,4	127,0	41,2	22,3	12,9	9,0	1,3	44,1
1995	0,0	0,0	100,5	208,4	117,4	41,9	13,6	12,7	2,9	2,6	36,8
1996	0,0	0,0	80,9	180,5	88,0	41,9	10,1	10,6	2,7	0,0	30,4
1997	0,0	0,0	74,5	152,5	109,0	39,7	10,1	6,7	6,5	1,2	28,5
1998	0,0	1,1	77,2	241,1	98,7	35,9	16,8	8,5	2,5	0,0	33,8
1999	0,0	0,0	84,4	225,3	129,0	59,0	22,0	11,1	1,2	0,0	37,4
2000	0,0	0,0	108,3	283,5	128,7	46,5	35,9	8,2	4,6	0,0	43,4
2001	0,0	0,0	108,7	345,5	178,6	75,9	37,1	8,0	2,3	1,1	52,1
2002	0,0	0,0	114,9	284,6	165,2	72,9	23,8	15,8	5,5	0,0	47,8
2003	2,9	0,0	136,4	333,3	183,4	81,0	26,9	14,7	2,1	2,0	54,2
2004	2,9	1,1	145,6	377,1	244,1	91,1	56,4	15,3	3,1	1,0	64,9
2005	0,0	0,0	124,4	299,3	193,7	120,0	52,5	17,0	7,2	2,7	56,8
2006	0,0	0,0	124,8	356,0	201,9	92,8	73,7	24,7	7,0	1,8	62,0
2007	0,0	1,2	162,4	413,9	244,3	111,6	49,0	26,8	7,9	1,7	70,8
2008	0,0	0,0	197,4	496,1	278,5	151,7	70,2	22,1	7,7	3,2	83,7

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)


Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1993	0,0	0,0	3 703,7	5 168,0	3 178,5	3 399,4	362,3	1 146,1	502,5	0,0	1 560,7
1994	0,0	195,7	2 722,8	4 986,9	2 347,4	1 152,7	0,0	520,8	469,5	0,0	1 117,7
1995	0,0	92,7	1 750,0	4 392,8	1 639,3	2 222,2	2 083,3	728,2	0,0	0,0	1 085,3
1996	0,0	0,0	1 678,7	4 672,9	4 683,8	2 452,3	2 000,0	245,7	458,7	0,0	1 408,5
1997	0,0	0,0	2 078,5	4 535,1	2 721,1	4 071,2	1 954,4	235,3	436,7	0,0	1 379,7
1998	0,0	0,0	3 418,8	2 657,0	2 714,9	3 155,3	3 761,8	1 345,3	0,0	0,0	1 466,0
1999	0,0	0,0	2 500,0	6 428,6	2 202,6	2 926,8	2 446,5	898,9	0,0	444,4	1 527,5
2000	0,0	0,0	2 686,0	5 036,0	2 460,9	1 590,9	1 510,6	1 687,8	366,3	0,0	1 309,8
2001	0,0	0,0	4 142,0	6 747,0	3 603,6	1 395,3	2 343,8	1 073,0	706,7	429,2	1 723,1
2002	0,0	0,0	4 280,2	5 733,9	2 746,0	2 137,8	2 056,6	789,0	346,0	0,0	1 565,8
2003	0,0	158,2	2 554,7	5 263,2	4 513,1	1 895,7	252,5	1 711,0	628,9	0,0	1 490,8
2004	0,0	0,0	1 573,4	5 752,2	4 761,9	1 643,2	738,9	1 279,7	302,1	421,9	1 397,5
2005	0,0	0,0	2 397,3	5 296,6	3 389,8	1 814,1	1 763,2	523,6	574,7	0,0	1 362,2
2006	0,0	0,0	2 306,4	4 402,5	3 846,2	2 331,0	759,5	495,9	547,9	0,0	1 273,8
2007	0,0	0,0	2 759,7	6 004,1	4 147,5	1 895,7	2 325,6	628,9	540,5	0,0	1 589,6
2008	0,0	0,0	4 975,1	4 492,2	4 827,6	1 956,0	2 325,6	462,2	0,0	0,0	1 699,8
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1993	0,0	0,0	160,8	170,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2
1994	0,0	0,0	332,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4
1995	0,0	0,0	167,8	158,7	847,5	216,9	0,0	0,0	0,0	0,0	139,5
1996	0,0	82,0	520,8	310,1	166,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,4
1997	0,0	0,0	349,7	616,3	474,7	0,0	251,9	0,0	0,0	0,0	163,9
1998	0,0	0,0	531,9	630,9	777,6	184,8	245,1	0,0	0,0	0,0	227,1
1999	0,0	0,0	351,5	331,7	149,0	0,0	235,8	0,0	0,0	0,0	95,6
2000	0,0	0,0	0,0	504,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9
2001	0,0	0,0	1 083,0	480,8	439,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,6
2002	0,0	0,0	347,2	869,6	721,5	645,2	0,0	289,0	0,0	0,0	266,8
2003	0,0	0,0	1 182,4	1 225,9	749,6	310,1	389,1	0,0	0,0	0,0	334,3
2004	0,0	0,0	1 791,5	2 241,4	772,8	300,8	561,8	262,5	402,4	0,0	542,6
2005	0,0	0,0	1 395,3	1 730,1	913,2	1 065,4	182,1	0,0	0,0	0,0	463,6
2006	0,0	0,0	2 377,4	2 292,8	928,8	609,8	180,2	0,0	181,2	0,0	582,4
2007	0,0	0,0	2 453,1	2 051,3	841,8	601,5	350,9	0,0	0,0	192,7	562,6
2008	0,0	0,0	2 908,6	3 231,3	681,4	1 875,0	512,8	0,0	0,0	0,0	815,7

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.


Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Figure 21 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, province de Québec, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).


Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 22 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Bas-Saint-Laurent, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 23 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 24 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Québec, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 25 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Mauricie et Centre-du-Québec, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 26 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Estrie, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 27 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Montréal, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 28 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Outaouais, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 29 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Abitibi-Témiscamingue, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 30 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Côte-Nord, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 31 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Nord-du-Québec, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 32 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 33 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Chaudière-Appalaches, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 34 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Laval, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 35 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Lanaudière, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MAD0, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 36 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Laurentides, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 37 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Montérégie, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MAD0, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 38 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Nunavik, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 39 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes



Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008)..

Tableau 9 Nombre de cas déclarés d'infection à *Chlamydia trachomatis* selon le type chez les moins d'un an, province de Québec, 1993 à 2008

Chlamydia	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	1993-2008
Génitale	14	8	5	2	3	5	3	1	3	1	7	2	2	3	2	1	62
Oculaire	21	11	8	9	6	3	5	4	6	1	6	5	1	1	3	1	91
Pulmonaire	5	10	8	5	4	4	6	5	6	4	5	2	1	2	2	1	70

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 10 Nombre de cas déclarés d'infection à *Chlamydia trachomatis* selon le type chez les moins d'un an, province de Québec hors Montréal, 1993 à 2008

Chlamydia	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	1993-2008
Génitale	12	7	4	2	3	4	2	1	2	1	7	2	1	2	1	1	52
Oculaire	16	8	5	4	3	2	3	1	2	0	4	1	0	1	1	1	52
Pulmonaire	3	6	6	5	3	3	3	1	5	3	5	0	1	1	1	1	47

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.


Tableau 11 Nombre de cas déclarés d'infection à *Chlamydia trachomatis* selon le type chez les moins d'un an, Montréal, 1993 à 2008

Chlamydia	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	1993-2008
Génitale	2	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	10
Oculaire	5	3	3	5	3	1	2	3	4	1	2	4	1	0	2	0	39
Pulmonaire	2	4	2	0	1	1	3	4	1	1	0	2	0	1	1	0	23

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 40 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, province de Québec, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	255	230	171	145	139	114	137	127	163	204	207	148	166	364	419	595
Hommes	495	516	430	324	410	374	485	541	664	672	673	678	730	908	989	1 053
Inconnu	5	6	5	9	6	8	2	6	4	4	4	0	5	2	1	1
Total	755	752	606	478	555	496	624	674	831	880	884	826	901	1 274	1 409	1 649

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 41 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Bas-Saint-Laurent, 1993 à 2008




Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	2	2	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	1	3
Hommes	4	4	4	0	6	5	5	4	1	3	1	1	2	4	2	1
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	6	6	6	0	6	5	5	4	1	6	1	2	3	5	3	4

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 42 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1993 à 2008




Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	7	4	1	0	0	4	1	0	0	3	4	2	1	3	0	4
Hommes	1	8	5	6	4	5	4	5	4	3	6	4	1	6	6	18
Inconnu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	9	12	6	6	4	9	5	5	4	6	10	6	2	9	6	22

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 43 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Québec, 1993 à 2008




Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	8	7	1	4	3	6	19	3	0	9	6	7	6	11	24	29
Hommes	26	48	26	12	23	23	44	42	41	29	45	26	41	47	60	66
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	34	55	27	16	26	29	63	45	41	38	51	33	47	58	84	95

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 44 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 1993 à 2008




Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	3	11	2	1	8	2	2	6	3	4	7	4	6	8	6	7
Hommes	9	8	6	3	5	6	4	16	9	12	11	8	14	24	21	24
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	12	19	8	4	13	8	6	22	12	16	18	12	20	32	27	31

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 45 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Estrie, 1993 à 2008




	Nombre de cas déclarés															
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	4	4	3	0	1	0	1	3	4	5	5	4	2	2	6	4
Hommes	8	8	4	3	7	2	5	5	18	11	13	5	8	10	7	8
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	12	12	7	3	8	2	6	8	22	16	18	9	10	12	13	12

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 46 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Montréal, 1993 à 2008




Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	84	107	98	89	66	46	74	72	98	88	79	69	77	185	231	250
Hommes	324	326	291	208	278	256	305	366	466	431	423	480	472	554	607	569
Inconnu	1	6	5	9	6	7	2	4	4	4	3	0	5	2	1	1
Total	409	439	394	306	350	309	381	442	568	523	505	549	554	741	839	820

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 47 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Outaouais, 1993 à 2008




	Nombre de cas déclarés															
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	8	5	4	5	4	7	6	4	4	7	7	6	7	15	11	32
Hommes	14	8	5	4	9	6	17	18	17	19	25	37	28	18	25	26
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Total	22	13	9	9	13	13	23	23	21	26	33	43	35	33	36	58

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 48 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 1993 à 2008




Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	1	2	8	6	3	5	1	0	6	0	7	2	1	2	1	3
Hommes	5	3	8	8	4	1	0	0	1	1	3	1	3	7	5	4
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	6	5	16	14	7	6	1	0	7	1	10	3	4	9	6	7

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 49 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Côte-Nord, 1993 à 2008




	Nombre de cas déclarés															
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	17	3	2	3	4	2	0	1	0	0	0	4	1	0	3	4
Hommes	11	3	5	6	2	0	0	2	1	1	2	2	0	0	2	3
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	28	6	7	9	6	2	0	3	1	1	2	6	1	0	5	7

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 50 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Nord-du-Québec, 1993 à 2008




Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	1

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 51 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 1993 à 2008




Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Hommes	1	0	2	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	1	2	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 52 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1993 à 2008




Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	4	5	0	2	1	0	0	0	0	3	1	1	2	1	6	4
Hommes	6	11	7	3	2	4	5	6	4	5	6	5	7	10	10	13
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	10	16	7	5	3	4	5	6	4	8	7	6	9	11	16	17

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 53 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Laval, 1993 à 2008




Nombre de cas déclarés		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes		9	4	5	3	5	4	2	4	9	4	14	3	12	20	28	39
Hommes		10	16	12	13	8	13	16	13	11	33	21	18	33	31	52	41
Inconnu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		19	20	17	16	13	17	18	17	20	37	35	21	45	51	80	80

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 54 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Lanaudière, 1993 à 2008




Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	3	7	3	6	1	1	4	2	3	3	8	5	3	18	17	23
Hommes	4	10	4	3	1	7	11	9	19	16	14	10	17	26	28	30
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	7	17	7	9	2	8	15	11	22	19	22	15	20	44	45	53

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 55 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Laurentides, 1993 à 2008




Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	6	3	7	1	3	5	6	4	9	15	11	7	4	15	13	13
Hommes	7	8	7	7	5	8	14	10	16	19	17	17	14	39	28	27
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	13	11	14	8	8	13	20	14	25	34	28	24	18	54	41	40

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 56 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Montérégie, 1993 à 2008




Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	20	16	11	6	19	13	16	11	16	27	23	15	20	41	44	72
Hommes	41	35	36	42	47	34	50	36	46	69	68	53	74	92	91	109
Inconnu	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	61	51	47	48	66	48	66	48	62	96	91	68	94	133	135	181

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 57 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Nunavik, 1993 à 2008




	Nombre de cas déclarés															
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	79	37	17	15	17	11	4	15	10	30	31	8	13	29	20	87
Hommes	24	20	6	2	6	2	5	9	8	17	13	8	14	32	40	104
Inconnu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	106	57	23	17	23	13	9	24	18	47	44	16	27	61	60	191

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 58 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	10	7	4	4	8	1	2	1	1	3	10	10	12	8	21
Hommes	0	0	2	1	2	2	0	0	1	0	3	3	2	8	3	8
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	10	9	5	6	10	1	2	2	1	6	13	12	20	11	29

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Province de Québec*												
1993	2	10	111	183	195	124	48	54	13	5	0	755
1994	1	4	112	164	170	142	60	65	20	2	0	752
1995	2	7	76	127	109	112	62	64	14	6	0	606
1996	0	3	64	99	83	71	67	48	21	4	0	478
1997	0	8	83	104	91	88	75	64	23	3	0	555
1998	1	4	54	105	84	83	70	55	18	3	0	496
1999	0	4	91	133	109	87	93	74	21	7	0	624
2000	0	4	86	130	120	95	117	91	20	4	0	674
2001	1	3	98	166	133	116	133	147	20	10	0	831
2002	1	2	124	229	137	117	120	111	25	11	0	880
2003	1	6	108	202	130	125	130	99	56	16	0	884
2004	1	2	88	190	140	105	108	137	44	8	0	826
2005	0	4	100	218	165	106	101	149	43	12	0	901
2006	2	7	180	308	216	142	121	171	69	18	0	1 274
2007	0	6	259	323	237	163	123	207	62	19	0	1 409
2008	0	12	284	489	305	190	113	179	60	14	0	1 649
Province de Québec hors Montréal												
1993	2	10	73	79	81	48	20	18	7	3	0	346
1994	1	2	56	73	72	47	21	27	10	1	0	313
1995	1	2	31	50	37	38	20	24	3	3	0	212
1996	0	2	25	33	34	25	21	20	9	2	0	172
1997	0	5	38	44	37	27	21	21	11	0	0	205
1998	1	1	27	60	26	17	25	25	4	1	0	187
1999	0	3	41	54	36	30	32	34	11	2	0	243
2000	0	4	34	53	37	29	30	30	11	4	0	232
2001	0	2	41	64	32	34	32	43	7	7	0	263
2002	1	2	62	114	47	36	38	42	12	3	0	357
2003	1	5	71	98	42	37	50	42	25	8	0	379
2004	0	2	48	72	40	23	31	41	17	3	0	277
2005	0	4	52	84	69	30	40	39	22	7	0	347
2006	0	6	94	135	91	48	41	72	31	13	0	533
2007	0	2	120	146	95	60	42	72	25	8	0	570
2008	0	10	181	256	134	94	55	62	30	7	0	829

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1993	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	6
1994	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	6
1995	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	6
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	2	0	0	0	1	2	1	0	0	6
1998	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5
1999	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	5
2000	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	4
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2002	0	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0	6
2003	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2004	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2005	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3
2006	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	5
2007	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
2008	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	4
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1993	0	1	1	1	5	1	0	0	0	0	0	9
1994	0	0	0	5	2	4	1	0	0	0	0	12
1995	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	6
1996	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	0	6
1997	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4
1998	0	0	0	5	0	0	2	2	0	0	0	9
1999	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	5
2000	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5
2001	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	4
2002	0	0	1	2	1	0	0	0	2	0	0	6
2003	0	0	0	4	2	1	1	1	1	0	0	10
2004	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	6
2005	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2006	0	0	0	6	0	1	0	1	1	0	0	9
2007	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	6
2008	0	0	3	9	3	3	1	2	1	0	0	22

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1993	0	0	0	8	9	7	7	2	1	0	0	34
1994	0	0	1	10	19	9	4	10	2	0	0	55
1995	0	0	0	4	5	9	2	5	1	1	0	27
1996	0	0	1	4	4	3	3	0	1	0	0	16
1997	0	0	1	2	6	7	4	6	0	0	0	26
1998	0	0	5	7	3	2	8	4	0	0	0	29
1999	0	0	18	13	8	6	8	6	3	1	0	63
2000	0	0	5	11	9	8	5	4	1	2	0	45
2001	0	0	4	7	7	3	10	7	2	1	0	41
2002	0	0	5	8	4	7	7	4	2	1	0	38
2003	0	0	7	14	7	5	9	5	4	0	0	51
2004	0	0	0	8	7	2	7	3	5	1	0	33
2005	0	0	2	5	12	4	11	6	4	3	0	47
2006	0	1	4	13	13	8	4	8	3	4	0	58
2007	0	0	9	26	15	9	8	13	2	2	0	84
2008	0	0	19	28	15	11	6	8	6	2	0	95
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1993	0	0	1	2	7	1	1	0	0	0	0	12
1994	0	1	0	7	3	4	2	2	0	0	0	19
1995	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	0	8
1996	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	4
1997	0	2	1	5	2	2	1	0	0	0	0	13
1998	0	0	0	4	2	1	0	1	0	0	0	8
1999	0	0	0	3	0	1	1	1	0	0	0	6
2000	0	0	2	6	2	1	3	7	1	0	0	22
2001	0	0	5	2	1	1	0	1	2	0	0	12
2002	0	0	1	4	3	5	2	1	0	0	0	16
2003	0	0	2	6	5	0	3	2	0	0	0	18
2004	0	0	2	5	3	0	0	2	0	0	0	12
2005	0	1	4	3	4	3	1	4	0	0	0	20
2006	0	0	10	7	2	2	3	5	3	0	0	32
2007	0	0	5	7	4	2	0	5	4	0	0	27
2008	0	1	4	12	7	3	2	2	0	0	0	31

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1993	0	0	1	3	2	2	0	2	0	0	0	12
1994	0	0	0	3	3	4	1	1	0	0	0	12
1995	0	0	0	3	0	1	0	2	0	1	0	7
1996	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
1997	0	0	3	1	1	0	0	0	3	0	0	8
1998	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	6
2000	0	1	2	0	1	0	2	2	0	0	0	8
2001	0	0	3	3	0	5	4	3	0	4	0	22
2002	0	0	3	7	1	3	1	1	0	0	0	16
2003	0	0	3	2	2	3	4	1	3	0	0	18
2004	0	0	2	3	2	1	0	0	0	1	0	9
2005	0	0	1	4	3	0	1	0	1	0	0	10
2006	0	0	0	5	1	1	2	2	0	1	0	12
2007	0	1	3	1	4	0	0	2	1	1	0	13
2008	0	0	0	2	3	3	1	1	1	1	0	12
06 - Montréal												
1993	0	0	38	104	114	76	28	36	6	2	0	409
1994	0	2	56	91	98	95	39	38	10	1	0	439
1995	1	5	45	77	72	74	42	40	11	3	0	394
1996	0	1	39	66	49	46	46	28	12	2	0	306
1997	0	3	45	60	54	61	54	43	12	3	0	350
1998	0	3	27	45	58	66	45	30	14	2	0	309
1999	0	1	50	79	73	57	61	40	10	5	0	381
2000	0	0	52	77	83	66	87	61	9	0	0	442
2001	1	1	57	102	101	82	101	104	13	3	0	568
2002	0	0	62	115	90	81	82	69	13	8	0	523
2003	0	1	37	104	88	88	80	57	31	8	0	505
2004	1	0	40	118	100	82	77	96	27	5	0	549
2005	0	0	48	134	96	76	61	110	21	5	0	554
2006	2	1	86	173	125	94	80	99	38	5	0	741
2007	0	4	139	177	142	103	81	135	37	11	0	839
2008	0	2	103	233	171	96	58	117	30	7	0	820

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1993	0	0	8	8	3	1	1	0	0	1	0	22
1994	0	1	4	4	2	1	0	1	0	0	0	13
1995	0	0	2	1	2	3	1	0	0	0	0	9
1996	0	0	1	2	2	2	1	0	1	0	0	9
1997	0	0	2	6	2	0	2	0	0	0	0	13
1998	0	0	4	4	1	0	1	1	2	0	0	13
1999	0	0	2	6	5	2	4	3	1	0	0	23
2000	0	0	0	3	8	2	2	6	2	0	0	23
2001	0	0	4	8	2	3	1	2	0	1	0	21
2002	0	0	7	10	2	2	3	2	0	0	0	26
2003	0	1	8	6	2	4	1	6	5	0	0	33
2004	0	0	4	10	3	6	8	9	3	0	0	43
2005	0	0	5	10	9	1	4	2	4	0	0	35
2006	0	0	2	15	8	2	2	0	2	2	0	33
2007	0	0	10	8	7	4	2	3	2	0	0	36
2008	0	0	8	23	9	8	5	3	2	0	0	58
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1993	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	6
1994	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	5
1995	0	0	2	5	3	3	3	0	0	0	0	16
1996	0	0	2	3	2	3	2	0	1	1	0	14
1997	0	0	0	2	1	2	0	0	2	0	0	7
1998	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	6
1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	7
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	1	5	3	0	0	0	1	0	0	0	10
2004	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
2005	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4
2006	0	0	1	0	0	1	3	0	3	1	0	9
2007	0	0	0	2	1	0	1	1	1	0	0	6
2008	0	0	1	2	2	0	1	0	1	0	0	7

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1993	0	1	11	9	5	1	0	1	0	0	0	28
1994	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	6
1995	0	0	0	2	2	0	1	2	0	0	0	7
1996	0	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	9
1997	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	6
1998	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
2001	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2004	0	0	0	1	2	1	0	2	0	0	0	6
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	5
2008	0	1	3	0	0	0	1	2	0	0	0	7
10 - Nord-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
2003	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1993	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1995	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
1996	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
2008	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
12 - Chaudière-Appalaches												
1993	0	0	1	1	2	3	1	2	0	0	0	10
1994	0	0	2	3	2	2	4	2	1	0	0	16
1995	0	0	2	1	2	0	0	0	0	1	0	7
1996	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	5
1997	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
1998	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4
1999	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	5
2000	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	6
2001	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4
2002	0	0	1	2	1	0	2	1	1	0	0	8
2003	0	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0	7
2004	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	6
2005	0	0	0	4	1	0	0	1	2	1	0	9
2006	0	0	2	2	2	0	0	3	2	0	0	11
2007	0	0	2	4	4	5	1	0	0	0	0	16
2008	0	0	4	5	3	1	0	3	1	0	0	17

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1993	0	1	1	4	2	5	1	5	0	0	0	19
1994	0	0	3	2	4	4	2	5	0	0	0	20
1995	0	0	1	6	4	3	2	1	0	0	0	17
1996	0	0	5	1	5	2	0	3	0	0	0	16
1997	0	0	3	4	1	3	2	0	0	0	0	13
1998	0	0	2	4	1	3	4	2	1	0	0	17
1999	0	0	0	1	5	3	3	3	3	0	0	18
2000	0	0	0	4	3	3	4	3	0	0	0	17
2001	0	0	3	7	2	1	4	2	1	0	0	20
2002	0	0	3	13	3	4	8	4	2	0	0	37
2003	1	0	9	10	3	1	3	6	1	1	0	35
2004	0	0	4	5	5	2	1	2	2	0	0	21
2005	0	2	11	13	7	4	2	2	4	0	0	45
2006	0	1	16	15	10	2	1	4	2	0	0	51
2007	0	0	19	20	12	12	4	11	0	2	0	80
2008	0	0	22	28	15	8	4	2	1	0	0	80
14 - Lanaudière												
1993	0	0	1	1	3	2	0	0	0	0	0	7
1994	0	0	3	1	8	1	1	1	2	0	0	17
1995	1	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	7
1996	0	0	0	2	4	0	1	2	0	0	0	9
1997	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
1998	0	0	0	3	2	1	0	2	0	0	0	8
1999	0	1	1	3	3	2	3	2	0	0	0	15
2000	0	0	0	1	3	4	2	0	1	0	0	11
2001	0	0	1	3	4	3	1	10	0	0	0	22
2002	0	0	4	7	2	1	2	2	1	0	0	19
2003	0	2	3	6	0	4	3	1	2	1	0	22
2004	0	0	4	1	1	2	2	4	1	0	0	15
2005	0	0	2	5	4	2	1	4	1	1	0	20
2006	0	2	7	12	9	3	2	9	0	0	0	44
2007	0	0	9	11	9	3	3	9	1	0	0	45
2008	0	5	18	13	4	7	1	3	2	0	0	53

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1993	0	2	4	1	3	0	1	0	2	0	0	13
1994	0	0	4	0	1	0	1	2	2	1	0	11
1995	0	0	1	3	4	2	3	1	0	0	0	14
1996	0	0	0	3	3	0	1	0	1	0	0	8
1997	0	0	2	1	2	2	1	0	0	0	0	8
1998	0	0	3	5	1	1	1	2	0	0	0	13
1999	0	1	4	3	4	4	2	1	1	0	0	20
2000	0	2	2	2	2	0	3	0	2	1	0	14
2001	0	2	6	8	1	3	2	2	0	1	0	25
2002	0	0	11	7	7	2	3	4	0	0	0	34
2003	0	0	3	9	1	4	4	2	3	2	0	28
2004	0	0	4	10	2	1	5	0	1	1	0	24
2005	0	0	4	4	3	3	1	2	1	0	0	18
2006	0	0	11	11	10	6	3	8	3	1	0	54
2007	0	0	13	11	6	2	1	4	3	1	0	41
2008	0	0	13	13	7	1	0	4	2	0	0	40
16 - Montérégie												
1993	0	0	11	9	16	11	4	4	3	1	0	61
1994	1	0	11	6	13	11	4	2	2	0	0	51
1995	0	0	7	9	10	7	4	7	2	0	0	47
1996	0	1	8	6	4	9	7	11	2	0	0	48
1997	0	1	15	11	12	7	8	8	4	0	0	66
1998	0	0	6	14	10	4	6	7	0	1	0	48
1999	0	0	10	18	9	8	7	11	3	0	0	66
2000	0	0	10	10	6	9	6	4	2	1	0	48
2001	0	0	6	11	9	11	10	12	2	0	0	62
2002	0	0	10	29	16	9	8	19	3	2	0	96
2003	0	0	9	20	12	10	17	13	6	4	0	91
2004	0	0	10	16	11	6	5	17	3	0	0	68
2005	0	0	11	24	12	9	14	18	4	2	0	94
2006	0	1	24	23	21	14	13	22	10	4	0	133
2007	0	1	29	33	18	19	11	15	7	2	0	135
2008	0	2	32	55	27	20	16	17	8	4	0	181

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1993	2	5	29	27	23	13	3	1	1	1	0	106
1994	0	0	17	23	9	3	1	1	1	0	0	57
1995	0	0	10	7	1	1	2	1	0	0	0	23
1996	0	0	2	5	4	2	4	0	0	0	0	17
1997	0	1	4	7	5	3	1	1	1	0	0	23
1998	0	1	3	4	3	0	1	0	1	0	0	13
1999	0	0	2	5	0	2	0	0	0	0	0	9
2000	0	1	11	11	0	0	0	1	0	0	0	24
2001	0	0	6	7	4	1	0	0	0	0	0	18
2002	1	1	16	20	6	2	1	0	0	0	0	47
2003	0	1	17	11	5	3	4	3	0	0	0	44
2004	0	1	3	6	2	1	3	0	0	0	0	16
2005	0	1	4	8	7	2	5	0	0	0	0	27
2006	0	0	9	16	12	7	7	9	1	0	0	61
2007	0	0	10	15	12	2	9	8	4	0	0	60
2008	0	1	41	53	34	27	16	15	4	0	0	191
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	0	10
1995	0	1	3	3	1	1	0	0	0	0	0	9
1996	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	5
1997	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	6
1998	1	0	0	6	1	1	0	1	0	0	0	10
1999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
2001	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
2002	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2003	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6
2004	0	0	12	0	0	0	0	1	0	0	0	13
2005	0	0	7	3	1	1	0	0	0	0	0	12
2006	0	1	7	8	2	1	0	0	1	0	0	20
2007	0	0	7	3	0	1	0	0	0	0	0	11
2008	0	0	11	13	3	1	1	0	0	0	0	29

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Province de Québec*												
1993	2	7	77	78	48	27	6	9	1	0	0	255
1994	1	4	79	78	26	18	6	8	4	1	0	230
1995	1	7	60	49	23	10	11	5	0	0	0	171
1996	0	3	47	43	22	14	8	4	1	0	0	145
1997	0	8	56	41	12	9	4	4	4	0	0	139
1998	0	4	41	42	14	4	2	2	3	1	0	114
1999	0	4	61	44	9	6	7	4	0	1	0	137
2000	0	4	48	38	17	7	2	6	3	1	0	127
2001	1	3	64	43	22	12	5	9	3	0	0	163
2002	1	2	73	70	24	13	10	7	3	0	0	204
2003	1	5	70	64	19	17	15	9	6	1	0	207
2004	1	2	52	42	20	12	8	5	5	1	0	148
2005	0	3	56	58	23	12	9	4	1	0	0	166
2006	2	6	112	124	48	27	10	12	4	4	0	364
2007	0	6	162	114	55	36	20	18	4	2	0	419
2008	0	8	197	215	75	49	23	17	9	0	0	595
Province de Québec hors Montréal												
1993	2	7	56	45	33	18	5	4	1	0	0	171
1994	1	2	41	42	17	8	4	3	2	0	0	123
1995	0	2	21	23	11	6	4	5	0	0	0	73
1996	0	2	13	17	13	4	3	2	1	0	0	56
1997	0	5	25	23	9	5	3	1	1	0	0	73
1998	0	1	21	32	8	1	0	2	2	1	0	68
1999	0	3	26	20	4	4	3	3	0	0	0	63
2000	0	4	21	16	6	2	1	4	0	1	0	55
2001	0	2	26	19	7	8	0	3	0	0	0	65
2002	1	2	40	42	15	4	7	3	2	0	0	116
2003	1	4	50	33	14	9	10	5	1	1	0	128
2004	0	2	29	17	10	8	4	3	5	1	0	79
2005	0	3	27	31	14	5	6	2	1	0	0	89
2006	0	5	63	52	26	13	6	7	3	3	0	179
2007	0	2	77	51	21	17	8	9	2	1	0	188
2008	0	6	114	119	40	38	16	7	5	0	0	345

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1993	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
1994	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
1995	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2007	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2008	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1993	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	7
1994	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
1999	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
2003	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	4
2004	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
2005	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	4

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1993	0	0	0	3	1	3	1	0	0	0	0	8
1994	0	0	1	4	0	1	1	0	0	0	0	7
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	4
1997	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3
1998	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6
1999	0	0	12	5	1	0	0	1	0	0	0	19
2000	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	3	2	1	2	1	0	0	0	0	9
2003	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	6
2004	0	0	0	1	2	1	0	0	3	0	0	7
2005	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	6
2006	0	1	2	1	2	2	1	0	1	1	0	11
2007	0	0	6	10	3	2	1	1	0	1	0	24
2008	0	0	10	11	2	4	0	1	1	0	0	29
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1993	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3
1994	0	1	0	6	3	0	1	0	0	0	0	11
1995	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1996	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1997	0	2	0	4	1	0	1	0	0	0	0	8
1998	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2000	0	0	1	3	1	0	0	1	0	0	0	6
2001	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2002	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4
2003	0	0	2	1	2	0	2	0	0	0	0	7
2004	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4
2005	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	6
2006	0	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	8
2007	0	0	1	3	1	0	0	0	1	0	0	6
2008	0	0	1	4	1	0	1	0	0	0	0	7

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1993	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4
1994	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4
1995	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2001	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	4
2002	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5
2003	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	5
2004	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	4
2005	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
2006	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2007	0	1	1	0	3	0	0	1	0	0	0	6
2008	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4
06 - Montréal												
1993	0	0	21	33	15	9	1	5	0	0	0	84
1994	0	2	38	36	9	10	2	5	2	1	0	107
1995	1	5	39	26	12	4	7	0	0	0	0	98
1996	0	1	34	26	9	10	5	2	0	0	0	89
1997	0	3	31	18	3	4	1	3	3	0	0	66
1998	0	3	20	10	6	3	2	0	1	0	0	46
1999	0	1	35	24	5	2	4	1	0	1	0	74
2000	0	0	27	22	11	5	1	2	3	0	0	72
2001	1	1	38	24	15	4	5	6	3	0	0	98
2002	0	0	33	28	9	9	3	4	1	0	0	88
2003	0	1	20	31	5	8	5	4	5	0	0	79
2004	1	0	23	25	10	4	4	2	0	0	0	69
2005	0	0	29	27	9	7	3	2	0	0	0	77
2006	2	1	49	72	22	14	4	5	1	1	0	185
2007	0	4	85	63	34	19	12	9	2	1	0	231
2008	0	2	83	96	35	11	7	10	4	0	0	250

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1993	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	0	8
1994	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	5
1995	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4
1996	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	5
1997	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
1998	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	7
1999	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	6
2000	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
2001	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	4
2002	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	7
2003	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	7
2004	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	6
2005	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	7
2006	0	0	1	7	4	1	1	0	0	1	0	15
2007	0	0	6	2	1	1	0	0	1	0	0	11
2008	0	0	8	18	6	0	0	0	0	0	0	32
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1993	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1995	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	8
1996	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	6
1997	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
1998	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	5
1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	6
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	1	3	2	0	0	0	1	0	0	0	7
2004	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
2007	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2008	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1993	0	1	8	5	3	0	0	0	0	0	0	17
1994	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
1995	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1996	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
1997	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4
1998	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	4
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
2008	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4
10 - Nord-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2003	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Chaudière-Appalaches												
1993	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	4
1994	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1997	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3
2003	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2005	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2006	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2007	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	6
2008	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1993	0	1	1	1	1	3	0	2	0	0	0	9
1994	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	4
1995	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	5
1996	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1997	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5
1998	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
1999	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
2000	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	4
2001	0	0	2	5	1	1	0	0	0	0	0	9
2002	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
2003	1	0	7	4	2	0	0	0	0	0	0	14
2004	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3
2005	0	2	6	2	0	0	1	0	1	0	0	12
2006	0	1	12	5	2	0	0	0	0	0	0	20
2007	0	0	15	6	3	2	0	2	0	0	0	28
2008	0	0	18	13	3	3	1	0	1	0	0	39
14 - Lanaudière												
1993	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
1994	0	0	3	1	2	0	0	0	1	0	0	7
1995	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
1996	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	6
1997	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1999	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4
2000	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
2001	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
2002	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2003	0	2	1	2	0	0	1	1	1	0	0	8
2004	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	5
2005	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
2006	0	1	6	6	2	1	0	2	0	0	0	18
2007	0	0	6	1	3	3	2	2	0	0	0	17
2008	0	3	9	3	1	5	0	0	2	0	0	23

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1993	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6
1994	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
1995	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	7
1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
1998	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5
1999	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	6
2000	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2001	0	2	5	1	0	1	0	0	0	0	0	9
2002	0	0	9	3	2	0	1	0	0	0	0	15
2003	0	0	2	6	0	2	1	0	0	0	0	11
2004	0	0	3	1	1	1	1	0	0	0	0	7
2005	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	4
2006	0	0	7	3	3	0	0	1	1	0	0	15
2007	0	0	7	4	0	2	0	0	0	0	0	13
2008	0	0	5	6	1	1	0	0	0	0	0	13
16 - Montérégie												
1993	0	0	7	1	6	3	1	1	1	0	0	20
1994	1	0	8	3	2	1	0	0	0	0	0	16
1995	0	0	4	0	3	2	2	0	0	0	0	11
1996	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	6
1997	0	1	12	5	1	0	0	0	0	0	0	19
1998	0	0	3	5	4	0	0	0	0	1	0	13
1999	0	0	6	5	1	3	0	1	0	0	0	16
2000	0	0	5	2	2	0	0	1	0	1	0	11
2001	0	0	6	2	4	1	0	3	0	0	0	16
2002	0	0	4	12	5	1	3	2	0	0	0	27
2003	0	0	6	6	3	3	2	2	0	1	0	23
2004	0	0	3	8	1	2	1	0	0	0	0	15
2005	0	0	7	7	4	0	2	0	0	0	0	20
2006	0	1	18	7	7	3	3	0	0	1	0	41
2007	0	1	20	15	2	3	1	2	0	0	0	44
2008	0	1	24	27	7	7	4	2	0	0	0	72

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1993	2	3	26	26	14	6	2	0	0	0	0	79
1994	0	0	13	15	4	2	1	0	0	0	0	37
1995	0	0	7	6	1	1	1	0	0	0	0	17
1996	0	0	2	5	3	2	3	0	0	0	0	15
1997	0	1	4	4	4	2	1	0	1	0	0	17
1998	0	1	3	4	2	0	0	0	1	0	0	11
1999	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
2000	0	1	7	6	0	0	0	1	0	0	0	15
2001	0	0	4	3	2	1	0	0	0	0	0	10
2002	1	1	13	10	3	1	1	0	0	0	0	30
2003	0	1	15	5	4	1	4	1	0	0	0	31
2004	0	1	3	1	1	1	1	0	0	0	0	8
2005	0	1	0	5	4	1	2	0	0	0	0	13
2006	0	0	7	11	5	3	0	3	0	0	0	29
2007	0	0	5	6	4	1	3	1	0	0	0	20
2008	0	1	26	22	13	14	6	4	1	0	0	87
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	0	10
1995	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	7
1996	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
1997	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
1998	0	0	0	5	1	1	0	1	0	0	0	8
1999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2002	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2003	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2004	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	10
2005	0	0	6	3	0	1	0	0	0	0	0	10
2006	0	1	3	6	1	1	0	0	0	0	0	12
2007	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	8
2008	0	0	7	10	2	1	1	0	0	0	0	21

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Province de Québec*												
1993	0	1	33	105	147	97	42	45	12	4	0	495
1994	0	0	32	85	144	120	54	57	16	1	0	516
1995	1	0	16	78	84	101	51	59	14	6	0	430
1996	0	0	17	55	61	57	56	44	20	4	0	324
1997	0	0	27	62	79	79	70	60	19	2	0	410
1998	1	0	13	61	70	79	68	53	15	2	0	374
1999	0	0	29	89	100	81	86	70	21	6	0	485
2000	0	0	38	92	103	88	115	84	15	3	0	541
2001	0	0	34	122	111	103	127	138	17	10	0	664
2002	0	0	51	158	113	103	110	104	21	11	0	672
2003	0	1	38	137	111	107	115	90	50	15	0	673
2004	0	0	36	148	120	93	100	132	39	7	0	678
2005	0	1	44	158	141	94	91	145	42	12	0	730
2006	0	1	68	183	168	115	111	159	64	14	0	908
2007	0	0	97	209	182	127	102	189	58	17	0	989
2008	0	4	87	274	230	140	90	162	51	14	0	1 053
Province de Québec hors Montréal												
1993	0	1	17	34	48	30	15	14	6	2	0	171
1994	0	0	15	31	55	39	17	24	8	1	0	190
1995	1	0	10	27	26	32	16	19	3	3	0	139
1996	0	0	12	16	21	21	18	18	8	2	0	116
1997	0	0	13	21	28	22	18	20	10	0	0	132
1998	1	0	6	27	18	16	25	23	2	0	0	118
1999	0	0	15	34	32	26	29	31	11	2	0	180
2000	0	0	13	37	31	27	29	25	10	3	0	175
2001	0	0	15	45	25	26	32	40	7	7	0	198
2002	0	0	22	72	32	32	31	39	10	3	0	241
2003	0	1	21	64	28	28	40	37	24	7	0	250
2004	0	0	19	55	30	15	27	38	12	2	0	198
2005	0	1	25	53	55	25	34	37	21	7	0	258
2006	0	1	31	83	65	35	35	65	28	10	0	354
2007	0	0	43	95	74	43	34	63	23	7	0	382
2008	0	4	67	137	94	56	39	55	25	7	0	484

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1993	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4
1994	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4
1995	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	2	0	0	0	1	2	1	0	0	6
1998	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5
1999	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	5
2000	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	4
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
2003	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
2006	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
2007	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1993	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	2	1	4	1	0	0	0	0	8
1995	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	5
1996	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	0	6
1997	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4
1998	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	5
1999	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	4
2000	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5
2001	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	4
2002	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
2003	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0	6
2004	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4
2005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	6
2007	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	6
2008	0	0	3	7	3	2	0	2	1	0	0	18

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1993	0	0	0	5	8	4	6	2	1	0	0	26
1994	0	0	0	6	19	8	3	10	2	0	0	48
1995	0	0	0	4	5	9	2	4	1	1	0	26
1996	0	0	1	2	3	3	3	0	0	0	0	12
1997	0	0	1	2	5	6	4	5	0	0	0	23
1998	0	0	2	4	3	2	8	4	0	0	0	23
1999	0	0	6	8	7	6	8	5	3	1	0	44
2000	0	0	2	11	9	8	5	4	1	2	0	42
2001	0	0	4	7	7	3	10	7	2	1	0	41
2002	0	0	2	6	3	5	6	4	2	1	0	29
2003	0	0	4	13	5	5	9	5	4	0	0	45
2004	0	0	0	7	5	1	7	3	2	1	0	26
2005	0	0	2	4	11	2	11	4	4	3	0	41
2006	0	0	2	12	11	6	3	8	2	3	0	47
2007	0	0	3	16	12	7	7	12	2	1	0	60
2008	0	0	9	17	13	7	6	7	5	2	0	66
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1993	0	0	1	1	6	1	0	0	0	0	0	9
1994	0	0	0	1	0	4	1	2	0	0	0	8
1995	0	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	6
1996	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
1997	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	5
1998	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	6
1999	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	4
2000	0	0	1	3	1	1	3	6	1	0	0	16
2001	0	0	3	1	1	1	0	1	2	0	0	9
2002	0	0	0	3	1	5	2	1	0	0	0	12
2003	0	0	0	5	3	0	1	2	0	0	0	11
2004	0	0	1	2	3	0	0	2	0	0	0	8
2005	0	1	1	1	4	2	1	4	0	0	0	14
2006	0	0	6	4	2	1	3	5	3	0	0	24
2007	0	0	4	4	3	2	0	5	3	0	0	21
2008	0	1	3	8	6	3	1	2	0	0	0	24

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1993	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	8
1994	0	0	0	2	2	2	1	1	0	0	0	8
1995	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	4
1996	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
1997	0	0	3	0	1	0	0	0	3	0	0	7
1998	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	5
2000	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	5
2001	0	0	1	2	0	4	4	3	0	4	0	18
2002	0	0	1	4	1	3	1	1	0	0	0	11
2003	0	0	1	1	1	2	4	1	3	0	0	13
2004	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	5
2005	0	0	0	4	2	0	1	0	1	0	0	8
2006	0	0	0	3	1	1	2	2	0	1	0	10
2007	0	0	2	1	1	0	0	1	1	1	0	7
2008	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	8
06 - Montréal												
1993	0	0	16	71	99	67	27	31	6	2	0	324
1994	0	0	17	54	89	81	37	33	8	0	0	326
1995	0	0	6	51	58	69	35	40	11	3	0	291
1996	0	0	5	39	40	36	38	26	12	2	0	208
1997	0	0	14	41	51	57	52	40	9	2	0	278
1998	0	0	7	34	52	63	43	30	13	2	0	256
1999	0	0	14	55	68	55	57	39	10	4	0	305
2000	0	0	25	55	72	61	86	59	5	0	0	366
2001	0	0	19	77	86	77	95	98	10	3	0	466
2002	0	0	29	86	81	71	79	65	11	8	0	431
2003	0	0	17	73	83	79	75	53	26	8	0	423
2004	0	0	17	93	90	78	73	94	27	5	0	480
2005	0	0	19	105	86	69	57	108	21	5	0	472
2006	0	0	37	100	103	80	76	94	36	4	0	554
2007	0	0	54	114	108	84	68	126	35	10	0	607
2008	0	0	20	137	136	84	51	107	26	7	0	569

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1993	0	0	3	6	2	1	1	0	0	1	0	14
1994	0	0	1	4	2	1	0	0	0	0	0	8
1995	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	5
1996	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	4
1997	0	0	2	3	2	0	2	0	0	0	0	9
1998	0	0	0	3	1	0	1	0	1	0	0	6
1999	0	0	2	1	5	2	4	2	1	0	0	17
2000	0	0	0	1	7	2	1	5	2	0	0	18
2001	0	0	2	7	2	2	1	2	0	1	0	17
2002	0	0	3	7	2	2	3	2	0	0	0	19
2003	0	1	2	4	2	4	1	6	5	0	0	25
2004	0	0	2	9	2	6	7	9	2	0	0	37
2005	0	0	3	6	8	1	4	2	4	0	0	28
2006	0	0	1	8	4	1	1	0	2	1	0	18
2007	0	0	4	6	6	3	2	3	1	0	0	25
2008	0	0	0	5	3	8	5	3	2	0	0	26
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1993	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	5
1994	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3
1995	0	0	0	3	1	1	3	0	0	0	0	8
1996	0	0	0	2	0	2	2	0	1	1	0	8
1997	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	4
1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2005	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
2006	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	7
2007	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	5
2008	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	4

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1993	0	0	3	4	2	1	0	1	0	0	0	11
1994	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3
1995	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	5
1996	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	6
1997	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
2001	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2004	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2008	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3
10 - Nord-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
2003	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1993	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
1996	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
2008	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
12 - Chaudière-Appalaches												
1993	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	6
1994	0	0	1	2	1	1	3	2	1	0	0	11
1995	0	0	2	1	2	0	0	0	0	1	0	7
1996	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3
1997	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
1998	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4
1999	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	5
2000	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	6
2001	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4
2002	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	5
2003	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	6
2004	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	5
2005	0	0	0	2	1	0	0	1	2	1	0	7
2006	0	0	1	2	2	0	0	3	2	0	0	10
2007	0	0	0	3	4	2	1	0	0	0	0	10
2008	0	0	2	3	3	1	0	3	1	0	0	13

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1993	0	0	0	3	1	2	1	3	0	0	0	10
1994	0	0	2	2	3	4	2	3	0	0	0	16
1995	0	0	0	4	2	3	2	1	0	0	0	12
1996	0	0	2	1	5	2	0	3	0	0	0	13
1997	0	0	0	2	1	3	2	0	0	0	0	8
1998	0	0	0	2	1	3	4	2	1	0	0	13
1999	0	0	0	1	4	3	2	3	3	0	0	16
2000	0	0	0	3	1	2	4	3	0	0	0	13
2001	0	0	1	2	1	0	4	2	1	0	0	11
2002	0	0	3	11	2	4	7	4	2	0	0	33
2003	0	0	2	6	1	1	3	6	1	1	0	21
2004	0	0	3	5	4	2	1	2	1	0	0	18
2005	0	0	5	11	7	4	1	2	3	0	0	33
2006	0	0	4	10	8	2	1	4	2	0	0	31
2007	0	0	4	14	9	10	4	9	0	2	0	52
2008	0	0	4	15	12	5	3	2	0	0	0	41
14 - Lanaudière												
1993	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	4
1994	0	0	0	0	6	1	1	1	1	0	0	10
1995	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	4
1996	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3
1997	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	2	2	1	0	2	0	0	0	7
1999	0	0	0	3	3	1	2	2	0	0	0	11
2000	0	0	0	0	3	3	2	0	1	0	0	9
2001	0	0	0	2	4	2	1	10	0	0	0	19
2002	0	0	2	6	2	1	2	2	1	0	0	16
2003	0	0	2	4	0	4	2	0	1	1	0	14
2004	0	0	1	1	1	1	2	3	1	0	0	10
2005	0	0	2	2	4	2	1	4	1	1	0	17
2006	0	1	1	6	7	2	2	7	0	0	0	26
2007	0	0	3	10	6	0	1	7	1	0	0	28
2008	0	2	9	10	3	2	1	3	0	0	0	30

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1993	0	0	0	1	3	0	1	0	2	0	0	7
1994	0	0	2	0	1	0	1	2	1	1	0	8
1995	0	0	0	1	3	1	2	0	0	0	0	7
1996	0	0	0	3	2	0	1	0	1	0	0	7
1997	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	5
1998	0	0	1	2	1	1	1	2	0	0	0	8
1999	0	0	0	3	4	4	1	1	1	0	0	14
2000	0	0	0	2	2	0	3	0	2	1	0	10
2001	0	0	1	7	1	2	2	2	0	1	0	16
2002	0	0	2	4	5	2	2	4	0	0	0	19
2003	0	0	1	3	1	2	3	2	3	2	0	17
2004	0	0	1	9	1	0	4	0	1	1	0	17
2005	0	0	3	2	3	3	0	2	1	0	0	14
2006	0	0	4	8	7	6	3	7	2	1	0	39
2007	0	0	6	7	6	0	1	4	3	1	0	28
2008	0	0	8	7	6	0	0	4	2	0	0	27
16 - Montérégie												
1993	0	0	4	8	10	8	3	3	2	1	0	41
1994	0	0	3	3	11	10	4	2	2	0	0	35
1995	0	0	3	9	7	5	2	7	2	0	0	36
1996	0	0	5	5	3	9	7	11	2	0	0	42
1997	0	0	3	6	11	7	8	8	4	0	0	47
1998	0	0	3	8	6	4	6	7	0	0	0	34
1999	0	0	4	13	8	5	7	10	3	0	0	50
2000	0	0	5	8	4	9	6	3	1	0	0	36
2001	0	0	0	9	5	10	10	9	2	0	0	46
2002	0	0	6	17	11	8	5	17	3	2	0	69
2003	0	0	3	14	9	7	15	11	6	3	0	68
2004	0	0	7	8	10	4	4	17	3	0	0	53
2005	0	0	4	17	8	9	12	18	4	2	0	74
2006	0	0	6	16	14	11	10	22	10	3	0	92
2007	0	0	9	18	16	16	10	13	7	2	0	91
2008	0	1	8	28	20	13	12	15	8	4	0	109

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1993	0	1	3	1	9	7	1	1	1	0	0	24
1994	0	0	4	8	5	1	0	1	1	0	0	20
1995	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0	6
1996	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1997	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	6
1998	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	5
2000	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	9
2001	0	0	2	4	2	0	0	0	0	0	0	8
2002	0	0	3	10	3	1	0	0	0	0	0	17
2003	0	0	2	6	1	2	0	2	0	0	0	13
2004	0	0	0	5	1	0	2	0	0	0	0	8
2005	0	0	4	3	3	1	3	0	0	0	0	14
2006	0	0	2	5	7	4	7	6	1	0	0	32
2007	0	0	5	9	8	1	6	7	4	0	0	40
2008	0	0	15	31	21	13	10	11	3	0	0	104
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
1998	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2004	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2005	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
2006	0	0	4	2	1	0	0	0	1	0	0	8
2007	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
2008	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	8

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Province de Québec*											
1993	0,4	1,1	23,2	38,4	34,1	18,8	7,5	5,1	1,8	0,4	10,6
1994	0,2	0,4	22,9	34,9	31,3	21,7	9,3	5,9	2,7	0,2	10,5
1995	0,4	0,8	15,4	27,1	21,1	17,4	9,5	5,7	1,8	0,5	8,4
1996	0,0	0,3	12,8	21,0	16,6	11,4	10,2	4,2	2,6	0,3	6,6
1997	0,0	0,9	16,7	21,8	18,8	14,7	11,4	5,5	2,8	0,3	7,6
1998	0,2	0,4	10,9	21,6	17,7	14,6	10,7	4,7	2,1	0,2	6,8
1999	0,0	0,4	18,6	26,8	23,2	16,1	14,3	6,2	2,3	0,6	8,5
2000	0,0	0,4	18,0	25,7	25,6	18,4	18,3	7,4	2,1	0,3	9,2
2001	0,3	0,3	21,0	32,2	28,1	23,1	21,4	11,8	2,1	0,8	11,2
2002	0,3	0,2	26,9	44,3	28,2	23,7	19,9	8,8	2,5	0,8	11,8
2003	0,3	0,7	23,7	39,4	26,1	25,7	22,6	7,8	5,5	1,2	11,8
2004	0,3	0,2	19,3	37,5	27,3	21,7	19,6	10,7	4,2	0,6	11,0
2005	0,0	0,5	21,6	44,1	31,6	21,8	19,1	11,6	4,0	0,8	11,9
2006	0,5	0,8	37,9	63,7	40,7	29,0	23,6	13,4	6,2	1,2	16,8
2007	0,0	0,7	53,3	67,9	44,8	32,6	24,5	16,4	5,5	1,2	18,4
2008	0,0	1,5	57,4	103,8	58,2	37,1	22,8	14,5	5,2	0,9	21,5
Province de Québec hors Montréal											
1993	0,5	1,3	19,2	23,3	20,0	9,6	4,1	2,2	1,3	0,4	6,5
1994	0,3	0,3	14,4	21,7	18,9	9,6	4,2	3,2	1,8	0,1	5,8
1995	0,3	0,3	7,9	14,9	10,3	7,9	4,0	2,8	0,5	0,4	3,9
1996	0,0	0,3	6,3	9,7	9,8	5,4	4,2	2,3	1,5	0,2	3,2
1997	0,0	0,7	9,5	12,7	11,0	6,1	4,2	2,3	1,7	0,0	3,7
1998	0,3	0,1	6,8	17,1	7,9	4,1	5,0	2,7	0,6	0,1	3,4
1999	0,0	0,4	10,5	15,1	11,2	7,6	6,5	3,7	1,6	0,2	4,4
2000	0,0	0,5	9,0	14,5	11,5	7,8	6,2	3,2	1,5	0,4	4,2
2001	0,0	0,3	11,1	17,4	9,9	9,5	6,8	4,5	0,9	0,7	4,7
2002	0,4	0,3	17,1	30,5	14,2	10,3	8,4	4,3	1,6	0,3	6,4
2003	0,4	0,7	19,8	26,1	12,3	10,8	11,7	4,3	3,2	0,8	6,7
2004	0,0	0,3	13,4	19,2	11,3	6,7	7,6	4,1	2,1	0,3	4,9
2005	0,0	0,6	14,4	22,8	18,9	8,8	10,4	3,9	2,6	0,7	6,1
2006	0,0	0,9	25,4	37,5	24,4	14,0	11,0	7,3	3,6	1,2	9,3
2007	0,0	0,3	31,7	41,4	25,3	17,1	11,6	7,5	2,8	0,7	10,0
2008	0,0	1,6	47,1	73,6	35,9	26,2	15,4	6,6	3,3	0,6	14,4

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1993	0,0	0,0	12,5	25,2	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
1994	0,0	0,0	6,1	8,4	8,1	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
1995	0,0	0,0	0,0	16,2	8,7	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	5,5	5,7	4,2	0,0	2,9
1998	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	5,7	5,6	0,0	0,0	2,4
1999	0,0	0,0	6,3	0,0	9,4	0,0	5,9	2,8	0,0	2,5	2,4
2000	0,0	0,0	6,6	7,4	0,0	0,0	6,1	0,0	3,6	0,0	1,9
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,5
2002	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	9,3	0,0	5,5	3,3	0,0	2,9
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2004	0,0	4,5	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,5
2006	0,0	0,0	7,9	15,7	8,3	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	2,5
2007	0,0	0,0	15,9	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
2008	0,0	0,0	8,1	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	2,0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1993	0,0	2,2	4,1	5,8	25,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
1994	0,0	0,0	0,0	28,9	11,0	15,3	3,6	0,0	0,0	0,0	4,1
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,8	0,0	0,0	2,1
1996	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	4,3	0,0	6,4	3,2	0,0	2,1
1997	0,0	0,0	0,0	5,1	6,6	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	1,4
1998	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	7,6	4,1	0,0	0,0	3,1
1999	0,0	0,0	4,1	4,7	0,0	0,0	3,9	4,0	0,0	0,0	1,7
2000	0,0	0,0	0,0	4,7	6,6	6,0	4,1	2,0	0,0	0,0	1,7
2001	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	6,4	0,0	3,9	0,0	0,0	1,4
2002	0,0	0,0	4,9	9,5	6,3	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	2,1
2003	0,0	0,0	0,0	19,3	12,3	6,9	5,2	1,9	2,5	0,0	3,6
2004	0,0	0,0	10,8	14,8	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
2005	0,0	0,0	5,5	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2006	0,0	0,0	0,0	32,4	0,0	6,9	0,0	2,1	2,3	0,0	3,3
2007	0,0	0,0	0,0	17,0	5,6	6,7	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2
2008	0,0	0,0	16,7	53,0	16,7	19,4	7,0	4,5	2,2	0,0	8,1

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	16,7	17,4	12,1	12,0	2,0	1,5	0,0	5,3
1994	0,0	0,0	2,4	21,3	38,6	15,8	6,8	9,7	2,9	0,0	8,6
1995	0,0	0,0	0,0	8,7	10,6	16,2	3,5	4,8	1,4	0,9	4,2
1996	0,0	0,0	2,3	8,8	8,8	5,6	5,2	0,0	1,3	0,0	2,5
1997	0,0	0,0	2,4	4,3	13,5	13,6	7,0	5,6	0,0	0,0	4,0
1998	0,0	0,0	12,1	15,1	6,9	4,1	14,3	3,7	0,0	0,0	4,5
1999	0,0	0,0	44,6	27,7	18,5	13,1	14,4	5,4	3,5	0,9	9,7
2000	0,0	0,0	12,8	22,9	21,0	18,4	9,2	3,6	1,1	1,7	6,9
2001	0,0	0,0	10,4	14,1	16,4	7,1	19,1	6,3	2,2	0,8	6,3
2002	0,0	0,0	13,5	16,2	9,0	16,8	13,9	3,5	2,1	0,8	5,8
2003	0,0	0,0	19,2	29,1	15,1	12,0	18,7	4,4	4,1	0,0	7,7
2004	0,0	0,0	0,0	17,3	14,5	4,8	15,3	2,6	5,0	0,7	5,0
2005	0,0	0,0	5,4	11,3	24,2	9,5	25,1	5,3	3,9	2,2	7,0
2006	0,0	1,5	10,6	30,8	25,9	18,7	9,3	7,2	2,9	2,8	8,7
2007	0,0	0,0	23,4	64,1	30,3	20,4	19,0	12,0	1,9	1,3	12,5
2008	0,0	0,0	48,6	70,5	31,3	24,2	14,4	7,6	5,5	1,3	14,1
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1993	0,0	0,0	2,9	7,2	21,3	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	2,5
1994	0,0	1,6	0,0	25,3	9,9	9,9	4,7	2,7	0,0	0,0	4,0
1995	0,0	0,0	2,8	7,1	7,0	5,1	0,0	1,3	0,0	0,0	1,7
1996	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	5,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,8
1997	0,0	3,3	2,7	16,6	7,5	5,6	2,4	0,0	0,0	0,0	2,7
1998	0,0	0,0	0,0	12,8	7,7	3,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,7
1999	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	3,2	2,5	1,2	0,0	0,0	1,2
2000	0,0	0,0	5,9	18,4	7,7	3,4	7,6	8,5	1,5	0,0	4,6
2001	0,0	0,0	15,4	6,1	3,8	3,6	0,0	1,2	3,0	0,0	2,5
2002	0,0	0,0	3,2	12,0	11,1	18,8	5,6	1,2	0,0	0,0	3,3
2003	0,0	0,0	6,5	18,0	17,8	0,0	9,0	2,4	0,0	0,0	3,7
2004	0,0	0,0	6,7	15,1	10,3	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,5
2005	0,0	1,9	13,5	9,3	13,2	11,7	3,4	4,9	0,0	0,0	4,1
2006	0,0	0,0	33,5	22,4	6,4	7,7	10,7	6,2	4,0	0,0	6,6
2007	0,0	0,0	16,5	23,2	12,7	7,4	0,0	6,4	5,2	0,0	5,6
2008	0,0	2,1	13,2	40,9	22,3	10,8	7,6	2,7	0,0	0,0	6,4

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1993	0,0	0,0	5,0	16,1	10,0	8,5	0,0	4,9	0,0	0,0	4,3
1994	0,0	0,0	0,0	16,3	15,7	17,2	4,2	2,4	0,0	0,0	4,3
1995	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	4,4	0,0	4,7	0,0	2,1	2,5
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	6,5	0,0	1,1
1997	0,0	0,0	14,3	5,0	5,7	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	2,8
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,7
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,1	4,3	6,5	0,0	0,0	2,1
2000	0,0	2,7	10,0	0,0	5,8	0,0	8,6	4,3	0,0	0,0	2,8
2001	0,0	0,0	15,4	14,2	0,0	27,8	17,8	6,4	0,0	7,4	7,6
2002	0,0	0,0	15,6	32,8	5,5	17,0	4,6	2,1	0,0	0,0	5,4
2003	0,0	0,0	15,7	9,5	10,4	17,1	19,2	2,1	7,1	0,0	6,1
2004	0,0	0,0	10,6	14,2	10,0	5,7	0,0	0,0	0,0	1,7	3,0
2005	0,0	0,0	5,3	19,4	14,5	0,0	5,2	0,0	2,3	0,0	3,3
2006	0,0	0,0	0,0	25,0	4,7	5,5	10,7	4,2	0,0	1,6	4,0
2007	0,0	3,0	15,2	5,1	18,9	0,0	0,0	4,3	2,2	1,5	4,3
2008	0,0	0,0	0,0	10,3	14,4	15,3	5,5	2,2	2,1	1,5	3,9
06 - Montréal											
1993	0,0	0,0	38,2	75,2	68,0	47,0	18,9	14,4	3,2	0,6	22,8
1994	0,0	1,1	55,7	67,7	60,7	58,7	26,0	14,9	5,3	0,3	24,4
1995	0,9	2,7	44,4	58,0	46,2	45,5	27,6	15,4	5,8	0,9	21,9
1996	0,0	0,5	38,7	50,4	32,4	28,4	29,8	10,7	6,2	0,6	17,0
1997	0,0	1,6	45,5	45,5	36,2	38,9	35,0	16,1	6,0	0,9	19,4
1998	0,0	1,6	27,3	33,8	39,4	43,9	29,3	11,1	6,9	0,6	17,2
1999	0,0	0,5	50,5	57,7	49,7	38,9	39,5	14,6	4,8	1,4	21,0
2000	0,0	0,0	52,4	54,3	56,3	45,7	56,1	21,8	4,2	0,0	24,1
2001	1,0	0,5	57,3	68,7	67,2	56,5	65,8	36,7	5,9	0,8	30,7
2002	0,0	0,0	63,2	80,4	58,4	56,2	54,1	24,0	5,8	2,2	28,1
2003	0,0	0,5	37,8	75,7	56,3	61,5	54,1	19,6	13,5	2,2	27,1
2004	1,0	0,0	40,3	89,5	63,3	57,5	53,4	32,6	11,5	1,4	29,3
2005	0,0	0,0	47,2	105,5	60,6	52,8	43,1	37,0	8,7	1,3	29,4
2006	2,0	0,5	82,2	139,6	79,5	64,3	56,9	33,2	15,5	1,3	39,1
2007	0,0	2,0	129,0	144,2	92,1	68,5	57,9	45,3	14,8	2,8	43,9
2008	0,0	1,0	92,8	189,3	113,5	62,5	41,5	39,4	11,7	1,8	42,6

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1993	0,0	0,0	40,5	38,8	11,0	3,2	3,4	0,0	0,0	2,7	7,3
1994	0,0	2,4	20,3	19,5	7,7	3,2	0,0	2,1	0,0	0,0	4,2
1995	0,0	0,0	10,2	4,9	8,2	9,8	3,3	0,0	0,0	0,0	2,9
1996	0,0	0,0	5,0	10,0	8,7	6,7	3,2	0,0	3,2	0,0	2,9
1997	0,0	0,0	9,9	30,4	9,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	4,1
1998	0,0	0,0	19,6	20,4	4,6	0,0	3,3	1,9	5,6	0,0	4,1
1999	0,0	0,0	9,7	30,7	23,5	7,7	13,1	5,5	2,7	0,0	7,3
2000	0,0	0,0	0,0	15,1	38,1	8,2	6,6	10,7	5,1	0,0	7,2
2001	0,0	0,0	18,9	39,3	9,5	12,7	3,3	3,5	0,0	2,2	6,5
2002	0,0	0,0	32,4	48,3	9,3	8,6	10,3	3,4	0,0	0,0	7,9
2003	0,0	2,2	36,6	28,1	9,1	17,3	3,5	9,9	11,3	0,0	9,9
2004	0,0	0,0	17,9	45,5	13,4	25,8	29,6	14,7	6,5	0,0	12,7
2005	0,0	0,0	21,8	45,0	39,6	4,3	15,5	3,2	8,3	0,0	10,2
2006	0,0	0,0	8,5	66,4	34,7	8,6	7,9	0,0	4,0	3,5	9,6
2007	0,0	0,0	41,3	35,3	30,3	17,1	8,1	4,9	3,9	0,0	10,3
2008	0,0	0,0	32,4	101,5	38,6	33,7	20,6	5,0	3,8	0,0	16,5
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1993	0,0	0,0	16,6	10,1	8,0	0,0	7,0	4,6	0,0	0,0	3,9
1994	0,0	0,0	16,2	10,2	8,5	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
1995	0,0	0,0	16,1	50,4	27,3	21,1	20,3	0,0	0,0	0,0	10,3
1996	0,0	0,0	16,0	29,7	19,0	22,0	13,4	0,0	6,6	4,8	9,0
1997	0,0	0,0	0,0	20,1	9,7	15,5	0,0	0,0	12,6	0,0	4,5
1998	0,0	0,0	24,1	10,0	10,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
1999	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	17,9	42,5	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,7
2003	0,0	5,0	47,9	31,6	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	6,8
2004	0,0	0,0	9,8	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	2,1
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
2006	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	12,3	32,9	0,0	13,8	3,8	6,3
2007	0,0	0,0	0,0	21,4	11,7	0,0	11,4	4,1	4,5	0,0	4,2
2008	0,0	0,0	9,8	21,9	23,2	0,0	11,7	0,0	4,4	0,0	4,9

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1993	0,0	6,4	128,9	123,1	54,0	9,9	0,0	6,2	0,0	0,0	26,6
1994	0,0	0,0	23,7	14,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
1995	0,0	0,0	0,0	28,1	25,0	0,0	10,2	12,0	0,0	0,0	6,7
1996	0,0	0,0	47,0	13,9	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
1997	0,0	6,9	11,8	27,7	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
1998	0,0	0,0	12,2	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	13,5	0,0	0,0	7,7	0,0	3,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	1,0
2003	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
2004	0,0	0,0	0,0	16,1	35,0	16,5	0,0	11,3	0,0	0,0	6,2
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	31,5	34,5	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	5,3
2008	0,0	9,6	46,9	0,0	0,0	0,0	16,6	12,2	0,0	0,0	7,5
10 - Nord-du-Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	120,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	270,3	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
2003	0,0	0,0	83,7	86,1	0,0	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1993	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
1994	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
1995	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
1996	0,0	0,0	12,7	15,5	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	1,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	1,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	1,1
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	2,1
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
12 - Chaudière-Appalaches											
1993	0,0	0,0	3,5	4,3	7,5	9,0	3,0	3,5	0,0	0,0	2,6
1994	0,0	0,0	6,8	12,7	8,0	6,1	11,7	3,4	2,7	0,0	4,2
1995	0,0	0,0	6,6	4,2	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,8
1996	0,0	0,0	0,0	8,3	4,3	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	1,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,1	0,0	0,0	0,8
1998	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	7,1	0,0	1,5	0,0	0,0	1,0
1999	0,0	0,0	3,3	3,8	0,0	3,8	3,0	1,5	0,0	0,0	1,3
2000	0,0	0,0	0,0	7,3	8,7	0,0	3,1	1,5	0,0	0,0	1,5
2001	0,0	0,0	3,6	7,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2002	0,0	0,0	3,7	7,1	4,3	0,0	6,6	1,5	1,8	0,0	2,0
2003	0,0	0,0	0,0	7,1	8,3	4,3	3,5	1,5	0,0	0,0	1,8
2004	0,0	0,0	0,0	7,1	8,0	0,0	0,0	1,5	1,7	0,0	1,5
2005	0,0	0,0	0,0	14,6	3,9	0,0	0,0	1,5	3,3	1,3	2,3
2006	0,0	0,0	7,8	7,5	7,5	0,0	0,0	4,6	3,3	0,0	2,8
2007	0,0	0,0	7,8	15,5	14,8	21,1	4,2	0,0	0,0	0,0	4,0
2008	0,0	0,0	15,5	19,9	11,1	4,1	0,0	4,9	1,6	0,0	4,3

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1993	0,0	2,4	4,6	18,3	7,7	15,8	3,4	10,3	0,0	0,0	5,8
1994	0,0	0,0	13,8	9,4	16,2	12,8	6,6	10,1	0,0	0,0	6,0
1995	0,0	0,0	4,6	28,7	17,0	9,8	6,5	2,0	0,0	0,0	5,1
1996	0,0	0,0	22,7	4,8	22,0	6,8	0,0	5,8	0,0	0,0	4,8
1997	0,0	0,0	13,5	19,3	4,6	10,5	6,4	0,0	0,0	0,0	3,9
1998	0,0	0,0	9,0	19,0	4,7	11,0	12,6	3,7	2,4	0,0	5,0
1999	0,0	0,0	0,0	4,6	23,8	11,5	9,6	5,4	7,2	0,0	5,3
2000	0,0	0,0	0,0	18,0	14,2	12,0	12,8	5,3	0,0	0,0	4,9
2001	0,0	0,0	14,0	30,8	9,4	4,1	13,0	3,4	2,3	0,0	5,7
2002	0,0	0,0	14,0	56,6	13,7	16,6	26,8	6,6	4,4	0,0	10,4
2003	5,5	0,0	42,1	43,3	13,2	4,2	10,4	9,7	2,2	1,5	9,8
2004	0,0	0,0	18,4	21,9	21,2	8,4	3,6	3,2	4,2	0,0	5,8
2005	0,0	4,4	48,9	58,0	29,3	16,7	7,5	3,1	8,2	0,0	12,3
2006	0,0	2,3	68,9	68,4	41,1	8,3	3,8	6,3	4,0	0,0	13,8
2007	0,0	0,0	78,8	91,8	49,6	49,1	15,5	17,5	0,0	2,7	21,6
2008	0,0	0,0	89,0	128,6	62,6	32,0	15,8	3,2	1,9	0,0	21,4
14 - Lanaudière											
1993	0,0	0,0	4,1	5,2	11,3	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
1994	0,0	0,0	11,8	5,1	32,1	2,7	2,7	1,7	5,4	0,0	4,6
1995	3,5	1,8	7,7	5,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	1,9
1996	0,0	0,0	0,0	9,9	17,8	0,0	2,6	3,2	0,0	0,0	2,4
1997	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1998	0,0	0,0	0,0	14,0	9,6	3,2	0,0	3,0	0,0	0,0	2,1
1999	0,0	1,7	3,6	13,7	14,7	6,9	7,9	3,0	0,0	0,0	3,8
2000	0,0	0,0	0,0	4,5	14,6	14,7	5,3	0,0	2,0	0,0	2,8
2001	0,0	0,0	3,8	13,3	19,3	11,6	2,8	14,0	0,0	0,0	5,6
2002	0,0	0,0	14,9	29,7	9,3	4,0	5,7	2,7	1,8	0,0	4,7
2003	0,0	3,4	11,0	24,7	0,0	16,0	9,1	1,3	3,5	1,5	5,4
2004	0,0	0,0	14,5	4,0	4,3	8,1	6,4	5,3	1,7	0,0	3,6
2005	0,0	0,0	7,0	20,0	16,6	8,1	3,4	5,2	1,7	1,4	4,8
2006	0,0	3,7	23,7	48,1	36,0	12,1	7,0	11,8	0,0	0,0	10,5
2007	0,0	0,0	29,7	44,0	35,5	11,9	10,9	12,1	1,6	0,0	10,7
2008	0,0	10,0	57,7	52,0	15,7	27,4	3,7	4,1	3,0	0,0	12,5

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1993	0,0	3,4	14,7	4,3	9,3	0,0	2,6	0,0	5,0	0,0	3,1
1994	0,0	0,0	14,2	0,0	3,3	0,0	2,5	3,1	4,7	1,7	2,6
1995	0,0	0,0	3,5	12,6	13,7	4,8	7,2	1,5	0,0	0,0	3,2
1996	0,0	0,0	0,0	12,6	10,6	0,0	2,3	0,0	2,1	0,0	1,8
1997	0,0	0,0	6,6	4,1	7,4	5,0	2,3	0,0	0,0	0,0	1,8
1998	0,0	0,0	9,8	19,8	3,8	2,6	2,3	2,7	0,0	0,0	2,9
1999	0,0	1,5	13,1	11,5	15,4	11,1	4,5	1,3	1,8	0,0	4,4
2000	0,0	3,0	6,6	7,4	7,7	0,0	6,7	0,0	3,4	1,4	3,0
2001	0,0	2,9	20,2	29,3	3,8	9,2	4,6	2,4	0,0	1,4	5,3
2002	0,0	0,0	36,5	24,6	25,8	6,2	7,0	4,7	0,0	0,0	7,1
2003	0,0	0,0	9,7	30,7	3,5	12,6	9,7	2,3	4,5	2,5	5,7
2004	0,0	0,0	12,7	33,4	6,8	3,2	12,7	0,0	1,5	1,2	4,8
2005	0,0	0,0	12,2	13,3	9,8	9,5	2,7	2,2	1,4	0,0	3,6
2006	0,0	0,0	32,2	36,5	31,6	19,1	8,2	8,7	4,1	1,1	10,5
2007	0,0	0,0	36,5	36,4	18,7	6,2	2,8	4,4	3,9	1,1	7,9
2008	0,0	0,0	35,5	42,6	21,6	3,0	0,0	4,4	2,5	0,0	7,6
16 - Montérégie											
1993	0,0	0,0	12,3	11,3	16,7	9,4	3,5	2,0	2,4	0,6	4,8
1994	1,1	0,0	12,0	7,6	14,5	9,4	3,4	1,0	1,5	0,0	4,0
1995	0,0	0,0	7,6	11,6	11,8	6,1	3,4	3,4	1,4	0,0	3,7
1996	0,0	0,6	8,6	7,7	4,9	8,2	5,9	5,3	1,4	0,0	3,7
1997	0,0	0,6	16,1	13,9	15,3	6,6	6,7	3,8	2,6	0,0	5,1
1998	0,0	0,0	6,5	17,3	13,1	4,0	5,0	3,3	0,0	0,5	3,7
1999	0,0	0,0	10,9	21,6	12,1	8,4	5,9	5,0	1,8	0,0	5,1
2000	0,0	0,0	11,2	11,8	8,1	10,0	5,1	1,8	1,2	0,5	3,7
2001	0,0	0,0	6,9	12,8	11,9	12,7	8,8	5,3	1,1	0,0	4,7
2002	0,0	0,0	11,6	33,3	20,6	10,6	7,3	8,3	1,6	0,9	7,2
2003	0,0	0,0	10,5	22,7	14,9	12,0	16,3	5,6	3,2	1,8	6,8
2004	0,0	0,0	11,7	18,2	13,2	7,3	5,0	7,2	1,5	0,0	5,0
2005	0,0	0,0	12,5	27,7	13,9	10,9	14,7	7,6	2,0	0,8	6,9
2006	0,0	0,6	26,5	27,0	23,7	16,9	14,1	9,3	4,9	1,6	9,7
2007	0,0	0,6	31,1	39,4	20,3	22,4	12,3	6,5	3,4	0,8	9,8
2008	0,0	1,3	33,5	66,4	30,5	23,0	18,2	7,5	3,8	1,5	13,1

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1993	148,0	260,0	3 717,9	3 497,4	2 952,5	1 878,6	618,6	145,8	243,3	229,9	1 275,0
1994	0,0	0,0	2 210,7	3 050,4	1 077,8	449,1	201,6	134,0	237,5	0,0	675,3
1995	0,0	0,0	1 280,4	913,8	120,5	143,5	386,8	127,4	0,0	0,0	265,3
1996	0,0	0,0	246,3	595,9	481,3	273,6	711,7	0,0	0,0	0,0	192,7
1997	0,0	44,5	483,7	814,0	570,8	395,3	170,6	122,7	217,9	0,0	250,5
1998	0,0	44,0	334,1	495,0	333,3	0,0	162,1	0,0	209,2	0,0	138,7
1999	0,0	0,0	213,4	625,8	0,0	254,1	0,0	0,0	0,0	0,0	94,9
2000	0,0	41,7	1 154,2	1 387,1	0,0	0,0	0,0	113,5	0,0	0,0	246,5
2001	0,0	0,0	601,8	870,6	456,6	123,2	0,0	0,0	0,0	0,0	182,5
2002	76,0	41,2	1 554,9	2 395,2	686,5	247,2	140,1	0,0	0,0	0,0	470,2
2003	0,0	40,8	1 597,7	1 258,6	604,6	367,6	537,6	304,0	0,0	0,0	435,0
2004	0,0	40,3	277,0	665,9	241,5	121,7	399,5	0,0	0,0	0,0	156,2
2005	0,0	40,2	358,4	871,5	863,1	236,4	677,5	0,0	0,0	0,0	260,2
2006	0,0	0,0	788,1	1 707,6	1 496,3	830,4	938,3	789,5	143,9	0,0	581,1
2007	0,0	0,0	864,3	1 552,8	1 451,0	238,1	1 209,7	672,8	568,2	0,0	565,2
2008	0,0	41,8	3 580,8	5 342,7	3 953,5	3 383,5	2 136,2	1 230,5	551,0	0,0	1 779,9
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	339,8	413,9	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,5
1995	0,0	42,9	262,5	235,5	92,0	112,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8
1996	0,0	0,0	0,0	232,9	0,0	0,0	136,6	0,0	0,0	0,0	42,9
1997	0,0	0,0	267,4	158,5	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3
1998	63,0	0,0	0,0	493,8	78,4	99,8	0,0	93,1	0,0	0,0	82,6
1999	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
2000	0,0	0,0	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	0,0	0,0	15,9
2001	0,0	0,0	0,0	80,6	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
2002	0,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
2003	0,0	0,0	337,6	171,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5
2004	0,0	0,0	982,8	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	0,0	0,0	94,6
2005	0,0	0,0	561,3	258,6	77,3	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0
2006	0,0	34,2	538,0	702,4	158,0	76,4	0,0	0,0	92,4	0,0	141,7
2007	0,0	0,0	533,1	253,8	0,0	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2
2008	0,0	0,0	793,1	1 119,7	253,6	79,1	89,5	0,0	0,0	0,0	201,7

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Province de Québec*											
1993	0,9	1,5	32,9	33,4	17,1	8,3	1,9	1,7	0,3	0,0	7,0
1994	0,4	0,9	33,2	33,8	9,7	5,6	1,9	1,5	1,1	0,2	6,3
1995	0,4	1,6	24,9	21,2	9,1	3,2	3,4	0,9	0,0	0,0	4,7
1996	0,0	0,7	19,3	18,6	9,0	4,6	2,4	0,7	0,2	0,0	3,9
1997	0,0	1,8	23,1	17,6	5,1	3,1	1,2	0,7	0,9	0,0	3,8
1998	0,0	0,9	17,1	17,7	6,0	1,4	0,6	0,3	0,7	0,1	3,1
1999	0,0	0,9	25,7	18,2	3,9	2,3	2,2	0,7	0,0	0,1	3,7
2000	0,0	0,9	20,7	15,4	7,4	2,8	0,6	1,0	0,6	0,1	3,4
2001	0,5	0,7	28,2	17,1	9,5	4,9	1,6	1,4	0,6	0,0	4,3
2002	0,6	0,4	32,6	27,8	10,1	5,4	3,4	1,1	0,6	0,0	5,4
2003	0,6	1,1	31,5	25,6	7,8	7,2	5,3	1,4	1,2	0,1	5,5
2004	0,6	0,5	23,4	17,1	8,0	5,1	3,0	0,8	0,9	0,1	3,9
2005	0,0	0,7	24,7	24,1	9,1	5,1	3,5	0,6	0,2	0,0	4,3
2006	1,1	1,4	48,3	52,7	18,6	11,3	4,0	1,9	0,7	0,5	9,5
2007	0,0	1,5	68,2	49,2	21,3	14,8	8,1	2,9	0,7	0,2	10,8
2008	0,0	2,0	81,5	93,6	29,3	19,7	9,5	2,8	1,5	0,0	15,3
Province de Québec hors Montréal											
1993	1,1	1,9	30,3	27,5	16,5	7,3	2,1	1,0	0,4	0,0	6,3
1994	0,6	0,6	21,8	25,9	9,0	3,3	1,6	0,7	0,7	0,0	4,5
1995	0,0	0,6	11,0	14,1	6,2	2,5	1,6	1,2	0,0	0,0	2,7
1996	0,0	0,6	6,7	10,4	7,6	1,7	1,2	0,5	0,3	0,0	2,0
1997	0,0	1,4	12,9	13,8	5,5	2,3	1,2	0,2	0,3	0,0	2,6
1998	0,0	0,3	11,0	18,9	5,0	0,5	0,0	0,4	0,6	0,2	2,5
1999	0,0	0,8	13,8	11,6	2,5	2,0	1,2	0,6	0,0	0,0	2,3
2000	0,0	1,1	11,5	9,2	3,8	1,1	0,4	0,8	0,0	0,2	2,0
2001	0,0	0,6	14,6	10,8	4,4	4,5	0,0	0,6	0,0	0,0	2,3
2002	0,7	0,6	22,7	23,5	9,3	2,3	3,1	0,6	0,5	0,0	4,1
2003	0,8	1,1	28,7	18,3	8,4	5,3	4,7	1,0	0,3	0,2	4,5
2004	0,0	0,6	16,7	9,4	5,8	4,8	2,0	0,6	1,2	0,2	2,8
2005	0,0	0,9	15,3	17,5	7,9	3,0	3,1	0,4	0,2	0,0	3,1
2006	0,0	1,5	35,0	30,0	14,4	7,7	3,3	1,4	0,7	0,5	6,2
2007	0,0	0,6	41,8	29,9	11,6	9,9	4,5	1,9	0,5	0,2	6,5
2008	0,0	2,0	61,0	70,7	22,1	21,7	9,1	1,5	1,1	0,0	11,9

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1993	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
1994	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
1995	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	2,9
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2006	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2007	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2008	0,0	0,0	16,6	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1993	0,0	0,0	8,6	12,4	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
1994	0,0	0,0	0,0	36,8	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,7
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
1999	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	10,2	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	2,1
2003	0,0	0,0	0,0	30,9	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
2004	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
2005	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2006	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	14,1	0,0	0,0	4,7	0,0	2,2
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	24,9	0,0	13,6	14,3	0,0	0,0	0,0	2,9

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	12,9	4,0	10,6	3,4	0,0	0,0	0,0	2,4
1994	0,0	0,0	4,8	17,4	0,0	3,6	3,4	0,0	0,0	0,0	2,1
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,3
1996	0,0	0,0	0,0	8,9	4,6	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	1,2
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,9
1998	0,0	0,0	14,8	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
1999	0,0	0,0	60,4	21,6	4,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	5,7
2000	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	16,5	8,2	4,7	10,0	4,1	0,0	0,0	0,0	2,7
2003	0,0	0,0	16,8	4,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
2004	0,0	0,0	0,0	4,3	8,6	5,0	0,0	0,0	5,8	0,0	2,1
2005	0,0	0,0	0,0	4,6	4,2	9,9	0,0	3,6	0,0	0,0	1,8
2006	0,0	3,1	10,7	4,8	8,1	9,8	4,8	0,0	1,8	1,2	3,2
2007	0,0	0,0	31,5	49,8	12,3	9,5	4,9	1,9	0,0	1,2	7,0
2008	0,0	0,0	51,7	56,0	8,5	18,2	0,0	1,9	1,8	0,0	8,4
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	7,5	6,3	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	1,2
1994	0,0	3,2	0,0	45,2	20,3	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	4,5
1995	0,0	0,0	5,7	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
1996	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
1997	0,0	6,7	0,0	27,3	7,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	3,3
1998	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
1999	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
2000	0,0	0,0	6,1	19,3	8,1	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5
2001	0,0	0,0	12,6	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
2002	0,0	0,0	6,5	6,3	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
2003	0,0	0,0	13,4	6,3	14,9	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	2,9
2004	0,0	0,0	6,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
2005	0,0	0,0	21,0	12,9	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
2006	0,0	0,0	27,8	20,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
2007	0,0	0,0	6,9	20,7	6,7	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,5
2008	0,0	0,0	6,9	28,3	6,7	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	2,9

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1993	0,0	0,0	10,3	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
1994	0,0	0,0	0,0	11,1	10,8	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
1995	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	2,1
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2000	0,0	5,6	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
2001	0,0	0,0	21,2	10,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
2002	0,0	0,0	21,7	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
2003	0,0	0,0	21,6	9,8	10,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
2004	0,0	0,0	21,8	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,7
2005	0,0	0,0	10,8	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
2006	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
2007	0,0	6,2	10,4	0,0	29,5	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	3,9
2008	0,0	0,0	0,0	10,7	10,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
06 - Montréal											
1993	0,0	0,0	42,6	47,3	18,5	11,4	1,3	3,8	0,0	0,0	9,0
1994	0,0	2,2	76,4	52,6	11,5	12,8	2,7	3,8	2,0	0,5	11,5
1995	1,9	5,6	77,6	38,3	15,8	5,1	9,3	0,0	0,0	0,0	10,5
1996	0,0	1,1	68,1	39,0	12,2	12,9	6,6	1,5	0,0	0,0	9,5
1997	0,0	3,3	63,6	26,8	4,1	5,4	1,3	2,2	2,9	0,0	7,1
1998	0,0	3,3	41,1	14,8	8,3	4,2	2,7	0,0	0,9	0,0	4,9
1999	0,0	1,1	71,8	34,6	7,0	2,8	5,3	0,7	0,0	0,5	7,9
2000	0,0	0,0	55,2	30,6	15,1	7,2	1,3	1,4	2,7	0,0	7,6
2001	2,1	1,0	77,1	31,9	20,4	5,8	6,8	4,2	2,6	0,0	10,2
2002	0,0	0,0	68,4	38,6	11,9	13,0	4,2	2,8	0,8	0,0	9,2
2003	0,0	1,0	41,4	44,7	6,5	11,7	7,1	2,8	4,1	0,0	8,2
2004	2,1	0,0	47,1	37,7	12,9	5,8	5,8	1,4	0,0	0,0	7,2
2005	0,0	0,0	57,8	42,4	11,6	10,1	4,4	1,4	0,0	0,0	8,0
2006	4,1	1,0	94,8	116,6	28,3	19,9	5,9	3,4	0,8	0,4	19,0
2007	0,0	4,1	159,2	103,2	44,6	26,2	17,9	6,2	1,5	0,4	23,6
2008	0,0	2,1	151,2	156,7	47,1	14,8	10,4	6,9	3,0	0,0	25,4

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1993	0,0	0,0	52,1	19,5	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
1994	0,0	4,8	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	3,2
1995	0,0	0,0	20,8	10,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
1996	0,0	0,0	10,2	20,2	8,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
1997	0,0	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
1998	0,0	0,0	40,2	10,2	0,0	0,0	0,0	3,8	5,7	0,0	4,4
1999	0,0	0,0	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,8
2000	0,0	0,0	0,0	20,4	9,6	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	2,5
2001	0,0	0,0	19,5	9,9	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
2002	0,0	0,0	38,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
2003	0,0	0,0	56,4	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
2004	0,0	0,0	18,5	9,3	8,9	0,0	7,3	0,0	4,3	0,0	3,5
2005	0,0	0,0	17,9	36,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
2006	0,0	0,0	8,7	63,1	34,6	8,6	7,9	0,0	0,0	3,2	8,6
2007	0,0	0,0	50,5	17,9	8,7	8,5	0,0	0,0	3,9	0,0	6,2
2008	0,0	0,0	66,2	161,7	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1993	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
1994	0,0	0,0	16,5	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
1995	0,0	0,0	32,7	42,3	37,1	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
1996	0,0	0,0	32,9	20,8	38,8	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
1997	0,0	0,0	0,0	21,1	19,6	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
1998	0,0	0,0	50,4	20,6	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
1999	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	37,4	64,7	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	10,2	59,4	43,8	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	9,7
2004	0,0	0,0	20,0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
2006	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	2,8
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
2008	0,0	0,0	19,9	0,0	24,0	0,0	23,9	0,0	0,0	0,0	4,3

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1993	0,0	13,2	192,3	144,8	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2
1994	0,0	0,0	24,5	29,5	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
1995	0,0	0,0	0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
1996	0,0	0,0	48,6	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
1997	0,0	14,0	0,0	57,6	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
1998	0,0	0,0	25,3	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	33,9	36,5	33,7	0,0	11,6	0,0	0,0	8,5
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	32,3	36,0	0,0	0,0	32,4	0,0	0,0	0,0	6,5
2008	0,0	19,8	64,2	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	8,7
10 - Nord-du-Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	255,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	375,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9
2003	0,0	0,0	177,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	2,1
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Chaudière-Appalaches											
1993	0,0	0,0	7,2	9,0	0,0	6,1	0,0	3,5	0,0	0,0	2,1
1994	0,0	0,0	7,0	9,0	8,2	6,1	6,0	0,0	0,0	0,0	2,6
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,5
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	7,6	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	1,5
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2005	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2006	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2007	0,0	0,0	15,9	8,1	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
2008	0,0	0,0	16,1	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1993	0,0	4,8	9,5	9,6	7,9	19,0	0,0	8,1	0,0	0,0	5,4
1994	0,0	0,0	9,4	0,0	8,3	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	2,4
1995	0,0	0,0	9,4	20,1	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
1996	0,0	0,0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
1997	0,0	0,0	27,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
1998	0,0	0,0	18,6	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	1,1
2000	0,0	0,0	0,0	9,3	19,4	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
2001	0,0	0,0	19,2	45,3	9,6	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
2002	0,0	0,0	0,0	17,9	9,3	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	2,2
2003	11,2	0,0	67,3	35,6	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
2004	0,0	0,0	9,4	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	1,6
2005	0,0	9,0	54,8	18,2	0,0	0,0	7,5	0,0	4,0	0,0	6,4
2006	0,0	4,6	105,6	46,7	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
2007	0,0	0,0	126,3	56,6	24,9	16,4	0,0	6,4	0,0	0,0	14,8
2008	0,0	0,0	147,6	122,3	25,2	24,0	7,9	0,0	3,7	0,0	20,4
14 - Lanaudière											
1993	0,0	0,0	0,0	10,6	7,3	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
1994	0,0	0,0	24,7	10,5	15,6	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	3,8
1995	0,0	3,7	8,1	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
1996	0,0	0,0	0,0	10,3	25,9	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	3,2
1997	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1998	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1999	0,0	3,5	7,6	0,0	0,0	6,7	5,3	0,0	0,0	0,0	2,1
2000	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2001	0,0	0,0	7,9	9,5	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
2002	0,0	0,0	15,5	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
2003	0,0	7,0	7,6	17,5	0,0	0,0	6,0	2,7	3,5	0,0	3,9
2004	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	8,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,4
2005	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
2006	0,0	3,8	42,2	50,6	16,3	8,1	0,0	5,3	0,0	0,0	8,6
2007	0,0	0,0	41,3	8,4	24,3	23,9	14,4	5,4	0,0	0,0	8,1
2008	0,0	12,4	60,0	25,0	8,0	39,3	0,0	0,0	6,1	0,0	10,9

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1993	0,0	7,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
1994	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	1,4
1995	0,0	0,0	7,2	17,2	6,8	4,7	4,8	3,0	0,0	0,0	3,2
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1997	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
1998	0,0	0,0	13,4	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
1999	0,0	3,1	27,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	2,6
2000	0,0	6,1	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
2001	0,0	6,0	35,0	7,6	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
2002	0,0	0,0	62,0	21,9	14,9	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	6,2
2003	0,0	0,0	13,5	42,3	0,0	12,6	4,9	0,0	0,0	0,0	4,5
2004	0,0	0,0	19,8	6,9	6,9	6,3	5,1	0,0	0,0	0,0	2,8
2005	0,0	0,0	6,3	13,7	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	1,6
2006	0,0	0,0	42,0	20,6	19,3	0,0	0,0	2,2	2,7	0,0	5,8
2007	0,0	0,0	40,3	27,4	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
2008	0,0	0,0	28,1	40,7	6,3	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
16 - Montérégie											
1993	0,0	0,0	16,1	2,6	12,6	5,1	1,7	1,0	1,6	0,0	3,1
1994	2,2	0,0	18,0	7,9	4,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
1995	0,0	0,0	8,9	0,0	7,1	3,5	3,4	0,0	0,0	0,0	1,7
1996	0,0	1,2	6,7	2,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
1997	0,0	1,1	26,6	13,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
1998	0,0	0,0	6,7	12,9	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0
1999	0,0	0,0	13,6	12,6	2,7	6,3	0,0	0,9	0,0	0,0	2,4
2000	0,0	0,0	11,6	4,9	5,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	1,7
2001	0,0	0,0	14,3	4,9	10,9	2,3	0,0	2,6	0,0	0,0	2,4
2002	0,0	0,0	9,5	28,9	13,2	2,4	5,5	1,7	0,0	0,0	4,0
2003	0,0	0,0	14,4	14,3	7,7	7,2	3,8	1,7	0,0	0,8	3,4
2004	0,0	0,0	7,2	19,0	2,5	4,9	2,0	0,0	0,0	0,0	2,2
2005	0,0	0,0	16,4	16,9	9,6	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	2,9
2006	0,0	1,2	40,9	17,1	16,3	7,4	6,5	0,0	0,0	0,7	6,0
2007	0,0	1,3	44,1	37,0	4,7	7,2	2,2	1,7	0,0	0,0	6,4
2008	0,0	1,3	51,6	67,3	16,3	16,4	9,1	1,8	0,0	0,0	10,4

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1993	305,3	324,3	6 933,3	6 753,2	3 783,8	1 769,9	956,9	0,0	0,0	0,0	1 964,7
1994	0,0	0,0	3 561,6	4 021,4	978,0	623,1	452,5	0,0	0,0	0,0	912,0
1995	0,0	0,0	1 837,3	1 583,1	248,1	296,7	436,7	0,0	0,0	0,0	409,3
1996	0,0	0,0	506,3	1 216,5	742,6	549,5	1 145,0	0,0	0,0	0,0	350,5
1997	0,0	92,3	1 015,2	954,7	919,5	546,4	358,4	0,0	434,8	0,0	380,1
1998	0,0	90,8	697,7	1 015,2	436,7	0,0	0,0	0,0	416,7	0,0	242,9
1999	0,0	0,0	437,6	527,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,4
2000	0,0	86,3	1 492,5	1 595,7	0,0	0,0	0,0	245,7	0,0	0,0	319,3
2001	0,0	0,0	816,3	771,2	463,0	261,8	0,0	0,0	0,0	0,0	210,3
2002	156,7	85,9	2 524,3	2 506,3	686,5	257,7	307,7	0,0	0,0	0,0	622,1
2003	0,0	84,5	2 907,0	1 144,2	985,2	253,8	1 149,4	216,9	0,0	0,0	635,0
2004	0,0	82,8	587,1	222,7	245,1	252,5	289,9	0,0	0,0	0,0	161,6
2005	0,0	82,2	0,0	1 121,1	1 005,0	246,9	586,5	0,0	0,0	0,0	259,2
2006	0,0	0,0	1 308,4	2 391,3	1 295,3	724,6	0,0	560,7	0,0	0,0	570,9
2007	0,0	0,0	924,2	1 242,2	1 017,8	239,2	840,3	180,8	0,0	0,0	389,0
2008	0,0	85,3	4 797,0	4 583,3	3 058,8	3 599,0	1 657,5	701,8	289,9	0,0	1 672,8
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	694,4	843,2	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,1
1995	0,0	86,0	365,6	465,8	201,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,4
1996	0,0	0,0	0,0	466,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3
1997	0,0	0,0	545,5	163,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7
1998	0,0	0,0	0,0	860,6	158,0	216,9	0,0	190,5	0,0	0,0	134,7
1999	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
2000	0,0	0,0	174,2	0,0	0,0	0,0	0,0	164,5	0,0	0,0	32,1
2001	0,0	0,0	0,0	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
2002	0,0	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
2003	0,0	0,0	337,3	168,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3
2004	0,0	0,0	1 482,7	0,0	0,0	0,0	0,0	139,1	0,0	0,0	148,5
2005	0,0	0,0	996,7	515,5	0,0	153,1	0,0	0,0	0,0	0,0	146,5
2006	0,0	70,1	477,7	1 049,0	161,3	153,1	0,0	0,0	0,0	0,0	173,8
2007	0,0	0,0	967,7	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,8
2008	0,0	0,0	1 052,6	1 745,2	335,6	160,3	188,0	0,0	0,0	0,0	299,1

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Province de Québec*											
1993	0,0	0,2	13,4	43,1	50,5	29,1	13,1	8,5	3,4	0,8	14,0
1994	0,0	0,0	12,8	35,5	52,2	36,3	16,6	10,5	4,4	0,2	14,6
1995	0,4	0,0	6,3	32,7	32,0	30,9	15,5	10,6	3,7	1,2	12,1
1996	0,0	0,0	6,6	22,9	24,0	18,0	16,9	7,7	5,1	0,8	9,1
1997	0,0	0,0	10,6	25,4	31,9	25,8	21,1	10,4	4,6	0,4	11,4
1998	0,5	0,0	5,1	24,6	28,9	27,3	20,6	9,0	3,5	0,4	10,4
1999	0,0	0,0	11,6	35,0	41,7	29,4	26,2	11,7	4,7	1,1	13,4
2000	0,0	0,0	15,5	35,3	42,9	33,3	35,4	13,8	3,2	0,6	14,9
2001	0,0	0,0	14,1	46,0	45,7	40,1	40,1	22,3	3,6	1,8	18,2
2002	0,0	0,0	21,6	59,6	45,3	40,8	35,9	16,5	4,3	1,9	18,3
2003	0,0	0,2	16,2	52,1	43,3	42,9	39,2	14,1	9,9	2,5	18,2
2004	0,0	0,0	15,4	56,9	45,6	37,5	35,7	20,5	7,5	1,1	18,2
2005	0,0	0,2	18,6	62,2	52,5	37,8	33,8	22,4	7,9	1,9	19,5
2006	0,0	0,2	28,0	73,7	61,8	45,8	42,3	24,7	11,7	2,1	24,2
2007	0,0	0,0	39,0	85,7	67,0	49,5	39,7	29,7	10,4	2,5	26,2
2008	0,0	1,0	34,4	113,5	85,6	53,3	35,5	26,0	9,0	2,0	27,8
Province de Québec hors Montréal											
1993	0,0	0,3	8,7	19,4	23,5	12,0	6,1	3,4	2,3	0,6	6,4
1994	0,0	0,0	7,5	17,8	28,5	15,8	6,8	5,7	2,9	0,3	7,1
1995	0,5	0,0	4,9	15,5	14,2	13,2	6,4	4,4	1,0	0,8	5,2
1996	0,0	0,0	5,9	9,1	11,9	9,0	7,1	4,1	2,7	0,6	4,3
1997	0,0	0,0	6,3	11,7	16,4	9,8	7,1	4,5	3,2	0,0	4,9
1998	0,6	0,0	2,9	14,8	10,8	7,6	10,0	5,0	0,6	0,0	4,3
1999	0,0	0,0	7,5	18,2	19,4	13,0	11,7	6,7	3,2	0,5	6,6
2000	0,0	0,0	6,7	19,4	18,8	14,3	11,9	5,3	2,8	0,7	6,4
2001	0,0	0,0	7,9	23,5	15,1	14,3	13,5	8,3	1,9	1,7	7,2
2002	0,0	0,0	11,8	37,0	18,7	18,1	13,7	8,0	2,6	0,7	8,7
2003	0,0	0,3	11,4	32,8	15,9	16,0	18,6	7,5	6,1	1,6	9,0
2004	0,0	0,0	10,4	28,3	16,5	8,6	13,2	7,7	3,0	0,4	7,1
2005	0,0	0,3	13,5	27,8	29,3	14,4	17,4	7,4	5,0	1,5	9,2
2006	0,0	0,3	16,3	44,6	33,8	20,0	18,5	13,2	6,6	2,0	12,5
2007	0,0	0,0	22,2	52,2	38,3	24,1	18,5	13,1	5,3	1,3	13,4
2008	0,0	1,3	34,0	76,3	48,9	30,5	21,5	11,7	5,6	1,3	17,0

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1993	0,0	0,0	12,1	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
1994	0,0	0,0	0,0	16,1	15,9	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	11,1	11,2	8,4	0,0	5,8
1998	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	14,9	11,4	11,0	0,0	0,0	4,9
1999	0,0	0,0	12,3	0,0	18,3	0,0	11,8	5,5	0,0	5,8	4,9
2000	0,0	0,0	13,0	13,8	0,0	0,0	12,2	0,0	7,2	0,0	3,9
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	1,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	5,5	6,6	0,0	3,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2004	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	2,0
2006	0,0	0,0	0,0	30,3	15,7	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0	4,0
2007	0,0	0,0	15,5	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	1,0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
1994	0,0	0,0	0,0	21,8	10,9	30,3	7,0	0,0	0,0	0,0	5,5
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	12,9	0,0	0,0	3,4
1996	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	8,5	0,0	12,5	6,5	0,0	4,1
1997	0,0	0,0	0,0	9,6	12,7	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	2,8
1998	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	14,9	7,9	0,0	0,0	3,4
1999	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	7,7	7,8	0,0	0,0	2,8
2000	0,0	0,0	0,0	8,8	12,7	11,6	8,0	3,9	0,0	0,0	3,5
2001	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	12,4	0,0	7,7	0,0	0,0	2,8
2002	0,0	0,0	0,0	8,9	12,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	2,1
2003	0,0	0,0	0,0	9,0	23,3	0,0	10,2	3,8	4,9	0,0	4,3
2004	0,0	0,0	10,4	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
2005	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2006	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,4
2007	0,0	0,0	0,0	32,2	10,5	12,8	0,0	4,3	0,0	0,0	4,4
2008	0,0	0,0	32,4	78,2	31,5	24,7	0,0	9,0	4,2	0,0	13,2

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	20,3	30,0	13,5	20,7	4,1	3,1	0,0	8,3
1994	0,0	0,0	0,0	24,9	74,3	27,5	10,3	19,9	6,0	0,0	15,4
1995	0,0	0,0	0,0	17,0	20,5	31,5	6,9	7,8	2,9	2,3	8,3
1996	0,0	0,0	4,6	8,6	12,7	10,8	10,4	0,0	0,0	0,0	3,8
1997	0,0	0,0	4,7	8,6	21,7	22,5	13,9	9,4	0,0	0,0	7,3
1998	0,0	0,0	9,5	17,0	13,2	8,0	28,1	7,4	0,0	0,0	7,3
1999	0,0	0,0	29,2	33,6	31,1	25,3	28,3	9,2	7,2	2,1	14,0
2000	0,0	0,0	10,0	45,2	40,3	35,4	18,0	7,3	2,3	4,1	13,3
2001	0,0	0,0	20,6	27,9	31,1	13,7	37,3	12,7	4,4	2,0	12,9
2002	0,0	0,0	10,6	24,1	12,9	23,0	23,3	7,2	4,3	1,9	9,1
2003	0,0	0,0	21,5	53,8	20,8	23,0	36,6	8,8	8,4	0,0	14,0
2004	0,0	0,0	0,0	30,1	20,1	4,6	29,8	5,3	4,1	1,8	8,0
2005	0,0	0,0	10,8	18,0	43,1	9,1	48,7	7,1	8,0	5,1	12,6
2006	0,0	0,0	10,6	56,4	42,9	26,7	13,5	14,3	3,9	4,9	14,4
2007	0,0	0,0	15,5	78,1	47,6	30,4	32,1	21,9	3,9	1,6	18,4
2008	0,0	0,0	45,5	84,6	53,4	29,7	27,7	13,1	9,5	3,0	20,2
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1993	0,0	0,0	5,8	7,0	35,3	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
1994	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	19,7	4,6	5,4	0,0	0,0	3,4
1995	0,0	0,0	0,0	6,8	13,5	10,1	0,0	2,6	0,0	0,0	2,5
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	4,7	0,0	0,0	0,0	1,3
1997	0,0	0,0	5,3	6,4	7,2	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
1998	0,0	0,0	0,0	12,4	14,9	5,9	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5
1999	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,3	4,9	2,4	0,0	0,0	1,7
2000	0,0	0,0	5,8	17,6	7,4	6,6	15,1	14,5	3,1	0,0	6,7
2001	0,0	0,0	18,1	5,8	7,4	7,0	0,0	2,4	6,0	0,0	3,8
2002	0,0	0,0	0,0	17,1	7,1	36,3	11,1	2,4	0,0	0,0	5,0
2003	0,0	0,0	0,0	28,5	20,4	0,0	5,9	4,8	0,0	0,0	4,6
2004	0,0	0,0	6,5	11,6	19,6	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,3
2005	0,0	3,6	6,5	6,0	25,1	15,1	6,6	9,7	0,0	0,0	5,8
2006	0,0	0,0	38,7	24,7	12,2	7,4	20,8	12,4	7,9	0,0	10,0
2007	0,0	0,0	25,5	25,5	18,1	14,4	0,0	12,7	7,7	0,0	8,8
2008	0,0	4,0	19,0	52,5	36,4	20,7	7,4	5,3	0,0	0,0	10,0

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	17,1	0,0	9,7	0,0	0,0	5,9
1994	0,0	0,0	0,0	21,4	20,1	17,2	8,5	4,7	0,0	0,0	5,8
1995	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	4,8	2,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	13,1	0,0	2,1
1997	0,0	0,0	28,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	5,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	1,4
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	8,5	13,0	0,0	0,0	3,5
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	17,1	8,5	0,0	0,0	3,5
2001	0,0	0,0	9,9	18,1	0,0	42,9	35,2	12,7	0,0	17,2	12,5
2002	0,0	0,0	10,0	36,2	10,6	32,8	9,0	4,2	0,0	0,0	7,6
2003	0,0	0,0	10,2	9,1	10,0	22,0	37,6	4,1	14,3	0,0	8,9
2004	0,0	0,0	0,0	27,6	9,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
2005	0,0	0,0	0,0	37,6	18,5	0,0	10,1	0,0	4,5	0,0	5,4
2006	0,0	0,0	0,0	28,9	9,0	10,7	20,6	8,3	0,0	3,6	6,7
2007	0,0	0,0	19,7	9,8	9,1	0,0	0,0	4,2	4,3	3,4	4,6
2008	0,0	0,0	0,0	10,0	18,5	9,8	10,7	4,3	4,3	3,3	5,3
06 - Montréal											
1993	0,0	0,0	31,8	103,8	114,4	80,8	36,4	25,7	6,7	1,4	37,6
1994	0,0	0,0	33,5	81,9	106,9	96,6	49,1	26,8	8,9	0,0	37,8
1995	0,0	0,0	11,7	78,7	72,6	81,6	45,6	31,8	12,2	2,1	33,7
1996	0,0	0,0	9,8	60,8	51,7	42,5	48,5	20,4	13,2	1,4	24,1
1997	0,0	0,0	27,9	63,2	66,3	69,3	65,9	30,9	9,6	1,4	32,1
1998	0,0	0,0	14,0	51,8	69,2	80,7	54,7	22,8	13,5	1,4	29,5
1999	0,0	0,0	27,9	81,6	90,7	72,3	71,6	29,0	10,1	2,8	34,9
2000	0,0	0,0	49,6	78,6	96,2	81,4	106,8	42,9	4,9	0,0	41,4
2001	0,0	0,0	37,8	105,1	112,0	101,7	118,3	70,0	9,6	2,1	52,0
2002	0,0	0,0	58,2	121,9	102,9	94,5	99,5	45,5	10,3	5,4	47,8
2003	0,0	0,0	34,2	107,4	103,9	106,0	96,8	36,3	23,8	5,4	46,7
2004	0,0	0,0	33,8	141,8	111,6	105,4	96,8	63,2	24,2	3,3	52,7
2005	0,0	0,0	36,8	165,6	106,8	92,6	77,1	71,6	18,3	3,3	51,5
2006	0,0	0,0	69,9	160,9	129,3	105,5	103,8	61,7	30,6	2,6	60,0
2007	0,0	0,0	99,3	184,6	138,4	107,9	93,4	82,6	29,1	6,2	65,2
2008	0,0	0,0	35,7	221,6	178,1	105,6	70,1	70,3	21,1	4,3	60,6

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1993	0,0	0,0	29,5	57,7	15,0	6,5	6,8	0,0	0,0	5,9	9,3
1994	0,0	0,0	9,9	38,6	15,7	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	19,7	6,6	0,0	0,0	0,0	3,3
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	6,7	6,6	0,0	6,2	0,0	2,6
1997	0,0	0,0	19,3	30,3	17,9	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	5,8
1998	0,0	0,0	0,0	30,6	9,1	0,0	6,6	0,0	5,6	0,0	3,8
1999	0,0	0,0	18,9	10,2	46,6	15,7	26,5	7,4	5,3	0,0	10,8
2000	0,0	0,0	0,0	10,0	66,0	16,6	6,7	18,1	10,2	0,0	11,4
2001	0,0	0,0	18,4	68,3	18,9	16,9	6,8	7,0	0,0	4,8	10,6
2002	0,0	0,0	27,1	66,2	18,7	17,1	20,8	6,9	0,0	0,0	11,7
2003	0,0	4,4	17,8	36,9	18,2	34,3	7,2	20,1	22,7	0,0	15,2
2004	0,0	0,0	17,5	80,2	18,0	51,2	52,5	29,7	8,7	0,0	22,1
2005	0,0	0,0	25,4	52,9	70,7	8,5	31,2	6,5	16,8	0,0	16,6
2006	0,0	0,0	8,3	69,6	34,8	8,6	7,9	0,0	8,1	3,9	10,6
2007	0,0	0,0	32,4	52,1	51,5	25,7	16,2	9,9	3,9	0,0	14,6
2008	0,0	0,0	0,0	43,4	25,6	67,6	41,1	10,1	7,7	0,0	15,0
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1993	0,0	0,0	16,3	19,5	15,7	0,0	13,5	8,7	0,0	0,0	6,3
1994	0,0	0,0	15,9	0,0	16,8	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
1995	0,0	0,0	0,0	57,8	17,9	13,8	39,0	0,0	0,0	0,0	10,1
1996	0,0	0,0	0,0	37,7	0,0	28,6	25,9	0,0	12,9	10,4	10,1
1997	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	15,2	0,0	0,0	24,5	0,0	5,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	1,3
2003	0,0	0,0	37,1	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	1,4
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	43,3	0,0	26,9	8,3	9,7
2007	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	22,5	7,9	8,7	0,0	7,0
2008	0,0	0,0	0,0	42,1	22,4	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	5,6

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1993	0,0	0,0	68,6	103,7	42,3	19,6	0,0	11,9	0,0	0,0	20,3
1994	0,0	0,0	23,0	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3	0,0	19,9	22,8	0,0	0,0	9,3
1996	0,0	0,0	45,4	26,5	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
1997	0,0	0,0	22,8	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	14,6	0,0	3,9
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	2,0
2003	0,0	0,0	0,0	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	4,1
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	30,8	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
2008	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	0,0	0,0	6,3
10 - Nord-du-Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	173,0	168,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
2003	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1993	0,0	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
1996	0,0	0,0	24,6	30,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	2,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	2,1
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	0,0	38,4	0,0	0,0	0,0	4,3
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
12 - Chaudière-Appalaches											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	11,8	5,8	3,4	0,0	0,0	3,2
1994	0,0	0,0	6,6	16,2	7,7	6,0	17,3	6,6	5,4	0,0	5,7
1995	0,0	0,0	12,8	7,9	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,6
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	3,1	0,0	3,7	1,6
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	1,0
1998	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	13,9	0,0	3,1	0,0	0,0	2,1
1999	0,0	0,0	6,4	7,2	0,0	7,3	5,9	3,0	0,0	0,0	2,6
2000	0,0	0,0	0,0	13,8	16,7	0,0	6,0	3,0	0,0	0,0	3,1
2001	0,0	0,0	6,9	13,7	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
2002	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	12,9	3,0	0,0	0,0	2,5
2003	0,0	0,0	0,0	13,4	15,7	0,0	6,8	2,9	0,0	0,0	3,0
2004	0,0	0,0	0,0	13,5	7,6	0,0	0,0	3,0	3,4	0,0	2,5
2005	0,0	0,0	0,0	13,9	7,2	0,0	0,0	3,0	6,7	2,9	3,5
2006	0,0	0,0	7,7	14,3	14,1	0,0	0,0	9,0	6,5	0,0	5,0
2007	0,0	0,0	0,0	22,4	27,9	16,0	8,0	0,0	0,0	0,0	5,0
2008	0,0	0,0	15,0	22,9	21,0	7,8	0,0	9,5	3,1	0,0	6,5

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1993	0,0	0,0	0,0	26,0	7,5	12,7	6,9	12,5	0,0	0,0	6,2
1994	0,0	0,0	18,0	17,8	23,8	25,4	13,4	12,3	0,0	0,0	9,8
1995	0,0	0,0	0,0	36,4	16,7	19,5	13,1	4,0	0,0	0,0	7,3
1996	0,0	0,0	17,6	9,3	43,6	13,5	0,0	12,0	0,0	0,0	7,9
1997	0,0	0,0	0,0	18,6	9,0	20,8	12,7	0,0	0,0	0,0	4,8
1998	0,0	0,0	0,0	18,3	9,3	21,7	25,2	7,6	5,1	0,0	7,8
1999	0,0	0,0	0,0	9,0	37,4	22,9	12,7	11,1	14,9	0,0	9,5
2000	0,0	0,0	0,0	26,2	9,2	15,9	25,4	10,7	0,0	0,0	7,7
2001	0,0	0,0	9,1	17,1	9,2	0,0	25,8	6,9	4,7	0,0	6,4
2002	0,0	0,0	27,2	93,4	17,9	32,9	46,7	13,5	9,2	0,0	19,0
2003	0,0	0,0	18,2	50,6	8,7	8,3	20,8	19,6	4,5	3,4	12,0
2004	0,0	0,0	27,0	42,6	33,7	16,7	7,2	6,4	4,4	0,0	10,2
2005	0,0	0,0	43,4	96,0	58,0	33,1	7,5	6,3	12,8	0,0	18,5
2006	0,0	0,0	33,7	89,1	65,3	16,6	7,6	12,6	8,3	0,0	17,2
2007	0,0	0,0	32,7	125,0	74,1	81,7	31,0	28,6	0,0	6,1	28,7
2008	0,0	0,0	31,9	134,6	99,3	40,0	23,7	6,4	0,0	0,0	22,5
14 - Lanaudière											
1993	0,0	0,0	7,8	0,0	15,5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	5,5	5,4	3,3	5,3	0,0	5,4
1995	6,9	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	2,1
1996	0,0	0,0	0,0	9,5	9,1	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	1,6
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1998	0,0	0,0	0,0	17,7	19,4	6,5	0,0	6,0	0,0	0,0	3,6
1999	0,0	0,0	0,0	25,6	29,5	7,0	10,4	5,9	0,0	0,0	5,6
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	22,4	10,6	0,0	3,9	0,0	4,5
2001	0,0	0,0	0,0	16,7	38,6	15,8	5,5	27,9	0,0	0,0	9,6
2002	0,0	0,0	14,3	47,7	18,5	8,1	11,5	5,4	3,6	0,0	7,9
2003	0,0	0,0	14,2	31,0	0,0	32,3	12,2	0,0	3,5	3,3	6,9
2004	0,0	0,0	7,0	7,6	8,5	8,2	12,9	7,9	3,4	0,0	4,8
2005	0,0	0,0	13,6	15,2	32,5	16,3	6,8	10,4	3,3	3,0	8,2
2006	0,0	3,6	6,5	45,8	54,9	16,2	14,2	18,3	0,0	0,0	12,4
2007	0,0	0,0	19,0	76,8	46,1	0,0	7,3	18,7	3,1	0,0	13,2
2008	0,0	7,8	55,6	76,9	23,0	15,6	7,4	8,2	0,0	0,0	14,1

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1993	0,0	0,0	0,0	8,4	18,9	0,0	5,1	0,0	9,8	0,0	3,4
1994	0,0	0,0	13,7	0,0	6,6	0,0	4,9	6,0	4,6	3,8	3,8
1995	0,0	0,0	0,0	8,2	20,7	4,8	9,5	0,0	0,0	0,0	3,2
1996	0,0	0,0	0,0	24,2	14,3	0,0	4,6	0,0	4,2	0,0	3,2
1997	0,0	0,0	0,0	7,9	14,9	5,0	4,6	0,0	0,0	0,0	2,2
1998	0,0	0,0	6,4	15,1	7,7	5,3	4,5	5,3	0,0	0,0	3,5
1999	0,0	0,0	0,0	21,9	31,0	22,2	4,5	2,6	3,5	0,0	6,1
2000	0,0	0,0	0,0	14,1	15,3	0,0	13,6	0,0	6,7	3,1	4,3
2001	0,0	0,0	6,5	49,2	7,6	12,3	9,1	4,8	0,0	3,0	6,8
2002	0,0	0,0	12,8	27,2	36,5	12,5	9,3	9,3	0,0	0,0	7,9
2003	0,0	0,0	6,3	19,8	7,0	12,6	14,6	4,5	9,0	5,4	6,9
2004	0,0	0,0	6,1	58,2	6,7	0,0	20,3	0,0	2,9	2,6	6,8
2005	0,0	0,0	17,9	12,8	19,4	18,9	0,0	4,3	2,8	0,0	5,5
2006	0,0	0,0	22,8	51,4	43,6	38,0	16,5	15,1	5,4	2,4	15,2
2007	0,0	0,0	32,8	44,8	36,9	0,0	5,6	8,7	7,9	2,2	10,8
2008	0,0	0,0	42,5	44,4	36,6	0,0	0,0	8,8	5,1	0,0	10,3
16 - Montérégie											
1993	0,0	0,0	8,7	19,4	20,9	13,6	5,2	3,0	3,2	1,3	6,5
1994	0,0	0,0	6,4	7,4	24,5	17,2	6,9	2,0	3,0	0,0	5,5
1995	0,0	0,0	6,3	22,3	16,4	8,7	3,4	6,8	2,9	0,0	5,7
1996	0,0	0,0	10,4	12,4	7,3	16,4	11,8	10,6	2,7	0,0	6,6
1997	0,0	0,0	6,2	14,5	27,9	13,2	13,5	7,6	5,2	0,0	7,4
1998	0,0	0,0	6,3	18,9	15,6	8,0	10,1	6,6	0,0	0,0	5,3
1999	0,0	0,0	8,4	29,9	21,1	10,5	11,9	9,3	3,6	0,0	7,8
2000	0,0	0,0	10,8	18,0	10,5	19,9	10,3	2,7	1,2	0,0	5,6
2001	0,0	0,0	0,0	20,1	12,9	23,0	17,7	8,0	2,3	0,0	7,1
2002	0,0	0,0	13,5	37,2	27,5	18,8	9,2	14,9	3,3	2,1	10,5
2003	0,0	0,0	6,8	30,5	21,7	16,7	28,8	9,5	6,4	3,0	10,3
2004	0,0	0,0	15,9	17,4	23,2	9,6	8,1	14,5	3,1	0,0	7,9
2005	0,0	0,0	8,9	37,7	18,0	21,6	25,2	15,3	4,1	1,8	11,0
2006	0,0	0,0	12,9	36,3	30,7	26,2	21,7	18,8	10,1	2,6	13,6
2007	0,0	0,0	18,7	41,6	34,9	37,2	22,3	11,3	6,9	1,7	13,4
2008	0,0	1,2	16,3	65,5	43,9	29,4	27,2	13,3	7,7	3,2	16,0

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)


Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1993	0,0	100,2	740,7	258,4	2 200,5	1 983,0	362,3	286,5	502,5	0,0	559,0
1994	0,0	0,0	990,1	2 099,7	1 173,7	288,2	0,0	260,4	469,5	0,0	456,2
1995	0,0	0,0	750,0	258,4	0,0	0,0	347,2	242,7	0,0	0,0	132,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	234,2	0,0	333,3	0,0	0,0	0,0	44,0
1997	0,0	0,0	0,0	680,3	226,8	254,5	0,0	235,3	0,0	0,0	127,4
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	226,2	0,0	313,5	0,0	0,0	0,0	41,3
1999	0,0	0,0	0,0	714,3	0,0	487,8	0,0	0,0	0,0	0,0	101,8
2000	0,0	0,0	826,4	1 199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,6
2001	0,0	0,0	394,5	963,9	450,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,6
2002	0,0	0,0	583,7	2 293,6	686,5	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	328,6
2003	0,0	0,0	365,0	1 373,0	237,5	473,9	0,0	380,2	0,0	0,0	248,5
2004	0,0	0,0	0,0	1 106,2	238,1	0,0	492,6	0,0	0,0	0,0	151,1
2005	0,0	0,0	684,9	635,6	726,4	226,8	755,7	0,0	0,0	0,0	261,2
2006	0,0	0,0	329,5	1 048,2	1 682,7	932,4	1 772,2	991,7	274,0	0,0	590,7
2007	0,0	0,0	811,7	1 863,4	1 843,3	237,0	1 550,4	1 100,6	1 081,1	0,0	730,9
2008	0,0	0,0	2 487,6	6 054,7	4 827,6	3 178,5	2 584,0	1 694,9	787,4	0,0	1 880,7
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	167,8	0,0	0,0	216,9	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,3	0,0	0,0	0,0	16,8
1997	0,0	0,0	0,0	154,1	158,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8
1998	122,9	0,0	0,0	157,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	146,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	337,8	175,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6
2004	0,0	0,0	488,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8
2005	0,0	0,0	155,0	0,0	152,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1
2006	0,0	0,0	594,4	352,7	154,8	0,0	0,0	0,0	181,2	0,0	110,9
2007	0,0	0,0	144,3	170,9	0,0	150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2
2008	0,0	0,0	554,0	510,2	170,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,8

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.


Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Figure 59 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, province de Québec, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).


Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 60 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Bas-Saint-Laurent, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 61 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MAD0, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 62 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Québec, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 63 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Mauricie et Centre-du-Québec, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 64 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Estrie, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 65 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Montréal, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MAD0, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 66 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Outaouais, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 67 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Abitibi-Témiscamingue, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 68 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Côte-Nord, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 69 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Nord-du-Québec, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 70 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 71 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Chaudière-Appalaches, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 72 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Laval, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 73 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Lanaudière, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 74 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Laurentides, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 75 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Montérégie, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 76 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Nunavik, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Figure 77 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes



Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Tableau 18 Nombre de cas déclarés et proportion (%) d'infection à gonococcique selon le site de la maladie* chez les hommes, province de Québec, 1993 à 2008


Site maladie	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	1993-2008
Urètre	332 86,9%	419 88,6%	377 93,3%	262 88,5%	317 84,1%	310 88,3%	403 88,6%	417 86,3%	537 86,2%	549 87,8%	517 83,3%	514 82,6%	543 81,9%	655 83,1%	763 86,7%	841 86,9%	7756 86,1%
Rectum	33 8,6%	37 7,8%	10 2,5%	18 6,1%	31 8,2%	25 7,1%	32 7,0%	34 7,0%	47 7,5%	39 6,2%	54 8,7%	53 8,5%	65 9,8%	80 10,2%	72 8,2%	76 7,9%	706 7,8%
Pharynx	12 3,1%	8 1,7%	12 3,0%	15 5,1%	26 6,9%	13 3,7%	18 4,0%	30 6,2%	34 5,5%	33 5,3%	41 6,6%	48 7,7%	38 5,7%	47 6,0%	39 4,4%	40 4,1%	454 5,0%
Prostate	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,3%	0 0,0%	2 0,0%									
Articulation	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	1 0,2%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,2%	0 0,0%	1 0,1%	0 0,0%	1 0,1%	7 0,1%
Œil	0 0,0%	1 0,2%	1 0,2%	0 0,0%	3 0,3%	1 0,1%	6 0,1%										
Autre	2 0,5%	6 1,3%	3 0,7%	0 0,0%	2 0,5%	1 0,3%	0 0,0%	1 0,2%	1 0,2%	3 0,5%	4 0,6%	3 0,5%	14 2,1%	4 0,5%	2 0,2%	6 0,6%	52 0,6%
Total des cas	382	473	404	296	377	351	455	483	623	625	621	622	663	788	880	968	9011

* Les dénominateurs n'incluent pas les sites de maladie non répondus (vides).

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 78 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, province de Québec, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	6	4	5	1	4	1	1	2	0	0	5	13	8	6	7	8
Hommes	12	14	5	10	5	2	3	5	16	47	148	227	249	372	239	359
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Total	18	18	10	11	9	3	4	7	16	47	153	241	257	378	246	369


Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Figure 79 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Bas-Saint-Laurent, 1993 à 2008




	Nombre de cas déclarés															
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	1	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	2	0

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 80 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	0	0	0

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 81 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Québec, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	1
Hommes	1	8	1	1	0	0	0	0	0	0	3	46	17	11	10	25
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	8	1	2	1	0	1	0	0	0	3	48	18	12	11	26

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 82 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Hommes	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	5	4	1	6	6	6
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	0	0	0	1	2	0	0	1	0	6	4	1	6	7	7

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 83 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Estrie, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	5	0	3	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	5	0	3	0	0

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 84 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Montréal, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	3	2	4	0	2	0	0	2	0	0	2	7	2	4	4	3
Hommes	5	5	4	6	2	1	2	5	12	36	113	118	178	288	167	257
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total	8	7	8	6	4	1	2	7	12	36	115	126	180	292	171	261

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 85 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Outaouais, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	3	2	11	2	5
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	3	2	11	2	5

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 86 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 87 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Côte-Nord, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 88 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Nord-du-Québec, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 89 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 90 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	5	1	2	4
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	5	2	2	4

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 91 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Laval, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	6	4	5	4
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	6	4	5	4

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 92 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Lanaudière, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Hommes	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	6	4	9	8	12
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	6	5	9	8	12

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 93 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Laurentides, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hommes	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	5	9	3	10
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	6	6	9	3	12

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 94 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Montérégie, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés


	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	2
Hommes	3	0	0	1	0	0	0	0	1	3	12	17	26	29	34	36
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	4	1	0	1	0	0	0	0	1	3	14	19	28	29	34	38

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 95 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Nunavik, 1993 à 2008



Nombre de cas déclarés

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Province de Québec*												
1993	0	0	0	3	2	0	3	7	2	1	0	18
1994	0	0	1	1	2	4	1	3	1	5	0	18
1995	0	0	0	5	1	1	1	1	0	1	0	10
1996	0	0	1	0	2	1	2	3	1	1	0	11
1997	0	0	0	1	1	1	0	4	1	1	0	9
1998	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
1999	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	4
2000	0	0	0	0	1	1	2	2	0	1	0	7
2001	0	0	0	0	2	2	3	6	2	1	0	16
2002	0	0	0	0	2	10	15	17	3	0	0	47
2003	0	0	0	5	12	28	29	62	15	2	0	153
2004	0	0	0	5	22	22	42	82	56	10	0	241
2005	0	0	2	13	20	29	39	112	33	9	0	257
2006	0	0	3	25	29	44	62	146	54	15	0	378
2007	0	0	5	13	21	24	39	93	41	9	0	246
2008	0	0	4	29	39	31	50	142	56	17	0	369
Province de Québec hors Montréal												
1993	0	0	0	2	1	0	2	3	1	1	0	10
1994	0	0	0	0	2	2	1	2	1	3	0	11
1995	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
1996	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	5
1997	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	5
1998	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
2002	0	0	0	0	0	2	4	4	1	0	0	11
2003	0	0	0	1	5	7	6	15	3	1	0	38
2004	0	0	0	1	11	7	19	33	36	8	0	115
2005	0	0	1	6	4	7	6	29	19	5	0	77
2006	0	0	3	5	3	9	14	29	20	3	0	86
2007	0	0	3	8	4	7	10	32	7	3	0	75
2008	0	0	3	10	13	5	12	31	27	6	0	108

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0	7
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
2005	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	5
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1993	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	2	1	0	2	1	2	0	8
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
2004	0	0	0	0	4	3	6	12	17	6	0	48
2005	0	0	0	2	1	1	1	5	4	4	0	18
2006	0	0	0	1	0	0	4	6	0	1	0	12
2007	0	0	0	4	0	0	1	5	1	0	0	11
2008	0	0	0	3	4	0	1	5	10	3	0	26
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	6
2004	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	4
2005	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	6
2007	0	0	2	0	0	2	2	1	0	0	0	7
2008	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0	7

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1993	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	4
2004	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	5
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Montréal												
1993	0	0	0	1	1	0	1	4	1	0	0	8
1994	0	0	1	1	0	2	0	1	0	2	0	7
1995	0	0	0	4	1	1	1	0	0	1	0	8
1996	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	6
1997	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	4
1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2000	0	0	0	0	1	1	2	2	0	1	0	7
2001	0	0	0	0	2	2	2	5	1	0	0	12
2002	0	0	0	0	2	8	11	13	2	0	0	36
2003	0	0	0	4	7	21	23	47	12	1	0	115
2004	0	0	0	4	11	15	23	49	20	2	0	126
2005	0	0	1	7	16	22	33	83	14	4	0	180
2006	0	0	0	20	26	35	48	117	34	12	0	292
2007	0	0	2	5	17	17	29	61	34	6	0	171
2008	0	0	1	19	26	26	38	111	29	11	0	261

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	5
2003	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	5
2004	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
2005	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
2006	0	0	0	1	1	0	1	3	5	0	0	11
2007	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
2008	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	5
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Nord-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Chaudière-Appalaches												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	0	9
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	5
2006	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2008	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1993	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2005	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0	0	6
2006	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4
2007	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	5
2008	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4
14 - Lanaudière												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	6
2005	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	5
2006	0	0	1	1	0	1	2	3	1	0	0	9
2007	0	0	1	0	2	0	0	3	1	1	0	8
2008	0	0	1	2	2	0	1	3	3	0	0	12

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1993	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0	0	6
2005	0	0	1	0	1	0	1	2	1	0	0	6
2006	0	0	0	0	2	1	0	3	2	1	0	9
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
2008	0	0	0	0	0	1	0	7	3	0	0	12
16 - Montérégie												
1993	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	4
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
2003	0	0	0	1	2	3	2	5	1	0	0	14
2004	0	0	0	1	5	1	2	5	4	1	0	19
2005	0	0	0	2	2	4	2	13	5	0	0	28
2006	0	0	2	1	0	7	3	8	7	1	0	29
2007	0	0	0	2	2	4	5	16	4	1	0	34
2008	0	0	2	4	6	2	7	8	8	1	0	38

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Province de Québec*												
1993	0	0	0	3	0	0	2	0	1	0	0	6
1994	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	4
1995	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	5
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4
1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	5
2004	0	0	0	2	4	2	1	0	3	1	0	13
2005	0	0	1	0	2	1	0	3	0	1	0	8
2006	0	0	0	2	0	1	2	1	0	0	0	6
2007	0	0	0	2	1	2	0	0	2	0	0	7
2008	0	0	1	0	0	1	2	2	2	0	0	8
Province de Québec hors Montréal												
1993	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
1994	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
1995	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3
2004	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	6
2005	0	0	1	0	2	0	0	3	0	0	0	6
2006	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
2007	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
2008	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	0	5

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2007	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1993	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Montréal												
1993	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3
1994	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1995	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	4
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
2004	0	0	0	1	3	1	0	0	1	1	0	7
2005	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2006	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	4
2007	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	4
2008	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Nord-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Chaudière-Appalaches												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1993	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Lanaudière												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
16 - Montérégie												
1993	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
2004	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
2005	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Province de Québec*												
1993	0	0	0	0	2	0	1	7	1	1	0	12
1994	0	0	0	0	2	4	0	3	1	4	0	14
1995	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	5
1996	0	0	1	0	2	1	2	2	1	1	0	10
1997	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	5
1998	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
2000	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	5
2001	0	0	0	0	2	2	3	6	2	1	0	16
2002	0	0	0	0	2	10	15	17	3	0	0	47
2003	0	0	0	5	11	27	27	61	15	2	0	148
2004	0	0	0	3	18	20	41	82	53	9	0	227
2005	0	0	1	13	18	28	39	109	33	8	0	249
2006	0	0	3	23	29	43	60	145	54	15	0	372
2007	0	0	5	11	20	22	39	93	39	9	0	239
2008	0	0	3	29	39	29	48	140	54	17	0	359
Province de Québec hors Montréal												
1993	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	0	7
1994	0	0	0	0	2	2	0	2	1	2	0	9
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4
1997	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
2002	0	0	0	0	0	2	4	4	1	0	0	11
2003	0	0	0	1	4	7	5	14	3	1	0	35
2004	0	0	0	0	10	6	18	33	34	8	0	109
2005	0	0	0	6	2	7	6	26	19	5	0	71
2006	0	0	3	4	3	9	13	29	20	3	0	84
2007	0	0	3	6	4	6	10	32	7	3	0	72
2008	0	0	2	10	13	4	12	29	26	6	0	102

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	5
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
2005	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1993	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	2	1	0	2	1	2	0	8
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
2004	0	0	0	0	4	2	6	12	16	6	0	46
2005	0	0	0	2	0	1	1	5	4	4	0	17
2006	0	0	0	0	0	0	4	6	0	1	0	11
2007	0	0	0	3	0	0	1	5	1	0	0	10
2008	0	0	0	3	4	0	1	4	10	3	0	25
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	5
2004	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	4
2005	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	6
2007	0	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	6
2008	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	6

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	4
2004	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	5
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Montréal												
1993	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	5
1994	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	5
1995	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	4
1996	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	6
1997	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2000	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	5
2001	0	0	0	0	2	2	2	5	1	0	0	12
2002	0	0	0	0	2	8	11	13	2	0	0	36
2003	0	0	0	4	7	20	22	47	12	1	0	113
2004	0	0	0	3	8	14	23	49	19	1	0	118
2005	0	0	1	7	16	21	33	83	14	3	0	178
2006	0	0	0	19	26	34	47	116	34	12	0	288
2007	0	0	2	5	16	16	29	61	32	6	0	167
2008	0	0	1	19	26	25	36	111	28	11	0	257

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	5
2003	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	5
2004	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
2005	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
2006	0	0	0	1	1	0	1	3	5	0	0	11
2007	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
2008	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	5
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Nord-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Chaudière-Appalaches												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	0	9
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	5
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2008	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1993	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2005	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0	0	6
2006	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4
2007	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	5
2008	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4
14 - Lanaudière												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	6
2005	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	4
2006	0	0	1	1	0	1	2	3	1	0	0	9
2007	0	0	1	0	2	0	0	3	1	1	0	8
2008	0	0	1	2	2	0	1	3	3	0	0	12

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1993	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0	0	6
2005	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	5
2006	0	0	0	0	2	1	0	3	2	1	0	9
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
2008	0	0	0	0	0	1	0	6	3	0	0	10
16 - Montérégie												
1993	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
2003	0	0	0	1	1	3	1	5	1	0	0	12
2004	0	0	0	0	4	1	2	5	4	1	0	17
2005	0	0	0	2	1	4	2	12	5	0	0	26
2006	0	0	2	1	0	7	3	8	7	1	0	29
2007	0	0	0	2	2	4	5	16	4	1	0	34
2008	0	0	1	4	6	2	7	8	7	1	0	36

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Province de Québec*											
1993	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,0	0,5	0,7	0,3	0,1	0,3
1994	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,1	0,4	0,3
1995	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
1996	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2
1997	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,5	0,5	0,2	0,1	0,2
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,5	1,3	0,3	0,0	0,6
2003	0,0	0,0	0,0	1,0	2,4	5,7	5,0	4,9	1,5	0,1	2,0
2004	0,0	0,0	0,0	1,0	4,3	4,5	7,6	6,4	5,3	0,7	3,2
2005	0,0	0,0	0,4	2,6	3,8	6,0	7,4	8,7	3,1	0,6	3,4
2006	0,0	0,0	0,6	5,2	5,5	9,0	12,1	11,4	4,9	1,0	5,0
2007	0,0	0,0	1,0	2,7	4,0	4,8	7,8	7,4	3,6	0,6	3,2
2008	0,0	0,0	0,8	6,2	7,4	6,1	10,1	11,5	4,9	1,1	4,8
Province de Québec hors Montréal											
1993	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
1995	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1
1997	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	0,4	0,1	0,0	0,2
2003	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,0	1,4	1,5	0,4	0,1	0,7
2004	0,0	0,0	0,0	0,3	3,1	2,0	4,7	3,3	4,4	0,8	2,0
2005	0,0	0,0	0,3	1,6	1,1	2,1	1,6	2,9	2,3	0,5	1,4
2006	0,0	0,0	0,8	1,4	0,8	2,6	3,8	3,0	2,3	0,3	1,5
2007	0,0	0,0	0,8	2,3	1,1	2,0	2,8	3,3	0,8	0,3	1,3
2008	0,0	0,0	0,8	2,9	3,5	1,4	3,4	3,3	3,0	0,5	1,9

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,2	0,0	1,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	5,7	12,5	0,0	3,5
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,4
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,4	0,0	1,1
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	2,3	0,0	1,8
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	1,8	0,0	1,9	1,5	1,9	1,2
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,2
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,2
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,1	0,0	1,0	0,0	0,5
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	7,2	13,1	10,6	16,9	4,5	7,2
2005	0,0	0,0	0,0	4,5	2,0	2,4	2,3	4,4	3,9	2,9	2,7
2006	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	9,3	5,4	0,0	0,7	1,8
2007	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	2,4	4,6	0,9	0,0	1,6
2008	0,0	0,0	0,0	7,5	8,3	0,0	2,4	4,7	9,2	1,9	3,9
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,2
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,4
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,2
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	3,9	3,0	2,4	0,0	0,0	1,2
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	4,1	0,0	0,8
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,2
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	5,0	1,3	0,0	1,2
2007	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	7,4	7,4	1,3	0,0	0,0	1,4
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,6	7,6	4,0	0,0	0,0	1,4

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1993	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,3
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	4,8	4,2	0,0	0,0	1,3
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	6,2	2,3	0,0	1,7
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	1,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 - Montréal											
1993	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,0	0,7	1,6	0,5	0,0	0,4
1994	0,0	0,0	1,0	0,7	0,0	1,2	0,0	0,4	0,0	0,6	0,4
1995	0,0	0,0	0,0	3,0	0,6	0,6	0,7	0,0	0,0	0,3	0,4
1996	0,0	0,0	1,0	0,0	0,7	0,0	1,3	0,8	0,0	0,0	0,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0	0,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	0,7	0,0	0,3	0,4
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	1,3	1,8	0,5	0,0	0,6
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,5	7,3	4,5	0,9	0,0	1,9
2003	0,0	0,0	0,0	2,9	4,5	14,7	15,6	16,1	5,2	0,3	6,2
2004	0,0	0,0	0,0	3,0	7,0	10,5	16,0	16,6	8,5	0,5	6,7
2005	0,0	0,0	1,0	5,5	10,1	15,3	23,3	27,9	5,8	1,1	9,6
2006	0,0	0,0	0,0	16,1	16,5	23,9	34,1	39,2	13,8	3,2	15,4
2007	0,0	0,0	1,9	4,1	11,0	11,3	20,7	20,5	13,6	1,6	9,0
2008	0,0	0,0	0,9	15,4	17,3	16,9	27,2	37,4	11,4	2,8	13,6

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,3
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	10,3	1,7	0,0	0,0	1,5
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	3,5	5,0	0,0	0,0	1,5
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,3	0,0	0,0	0,9
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	1,6	0,0	0,0	0,6
2006	0,0	0,0	0,0	4,4	4,3	0,0	4,0	4,8	10,1	0,0	3,2
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,6
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,1	1,7	3,8	0,0	1,4
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,6
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	1,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - Nord-du-Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	12,8
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	1,1
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	1,1
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Chaudière-Appalaches											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,3
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	1,5	0,0	0,0	0,5
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	7,5	3,0	5,2	1,4	2,3
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,0	1,3	1,3
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	1,6	0,0	0,5
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	1,6	0,0	0,0	0,5
2008	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	2,4	1,0

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	2,1	0,0	0,0	0,6
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,3
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	1,6	0,0	0,0	0,6
2005	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,2	0,0	1,6	6,2	0,0	1,6
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,0	0,0	1,1
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	2,0	0,0	1,3
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	1,9	0,0	1,1
14 - Lanaudière											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,0	0,5
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,2
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	1,5
2005	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	3,4	1,3	3,3	0,0	1,2
2006	0,0	0,0	3,4	4,0	0,0	4,0	7,0	3,9	1,6	0,0	2,1
2007	0,0	0,0	3,3	0,0	7,9	0,0	0,0	4,0	1,6	1,3	1,9
2008	0,0	0,0	3,2	8,0	7,8	0,0	3,7	4,1	4,6	0,0	2,8

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,2
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,2
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,2	0,0	1,1	4,4	0,0	1,2
2005	0,0	0,0	3,1	0,0	3,3	0,0	2,7	2,2	1,4	0,0	1,2
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	3,2	0,0	3,2	2,7	1,1	1,8
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,6
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	7,8	3,8	0,0	2,3
16 - Montérégie											
1993	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	0,6	0,3
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	0,5	0,0	0,2
2003	0,0	0,0	0,0	1,1	2,5	3,6	1,9	2,1	0,5	0,0	1,0
2004	0,0	0,0	0,0	1,1	6,0	1,2	2,0	2,1	2,1	0,4	1,4
2005	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	4,9	2,1	5,5	2,5	0,0	2,1
2006	0,0	0,0	2,2	1,2	0,0	8,5	3,3	3,4	3,5	0,4	2,1
2007	0,0	0,0	0,0	2,4	2,3	4,7	5,6	6,9	1,9	0,4	2,5
2008	0,0	0,0	2,1	4,8	6,8	2,3	8,0	3,5	3,8	0,4	2,8

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,3	0,0	0,0	9,8
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Province de Québec*											
1993	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,6	0,0	0,3	0,0	0,2
1994	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1
1995	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,2	0,0	0,0	0,1
2004	0,0	0,0	0,0	0,8	1,6	0,8	0,4	0,0	0,6	0,1	0,3
2005	0,0	0,0	0,4	0,0	0,8	0,4	0,0	0,5	0,0	0,1	0,2
2006	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,4	0,8	0,2	0,0	0,0	0,2
2007	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	0,8	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2
2008	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,8	0,3	0,3	0,0	0,2
Province de Québec hors Montréal											
1993	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,1
1995	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,1
2004	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,5	0,0	0,5	0,0	0,2
2005	0,0	0,0	0,6	0,0	1,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2
2006	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1
2007	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2008	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	6,3	0,0	2,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,7
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,3
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,6
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2006	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2007	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,3
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,4
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1993	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 - Montréal											
1993	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,3	0,0	1,0	0,0	0,3
1994	0,0	0,0	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
1995	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,4
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,2
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,2
2004	0,0	0,0	0,0	1,5	3,9	1,5	0,0	0,0	0,8	0,5	0,7
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2
2006	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,4	1,5	0,7	0,0	0,0	0,4
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,4
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,8	0,0	0,3

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - Nord-du-Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Chaudière-Appalaches											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,5
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,6
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 - Lanaudière											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,5
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,4
16 - Montérégie											
1993	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,3
2004	0,0	0,0	0,0	2,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,3
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,3

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Province de Québec*											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	1,3	0,3	0,2	0,3
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	0,0	0,6	0,3	0,8	0,4
1995	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1
1996	0,0	0,0	0,4	0,0	0,8	0,3	0,6	0,4	0,3	0,2	0,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,2	0,0	0,2	0,1
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,9	1,0	0,4	0,2	0,4
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,0	4,9	2,7	0,6	0,0	1,3
2003	0,0	0,0	0,0	1,9	4,3	10,8	9,2	9,5	3,0	0,3	4,0
2004	0,0	0,0	0,0	1,2	6,8	8,1	14,6	12,7	10,2	1,5	6,1
2005	0,0	0,0	0,4	5,1	6,7	11,3	14,5	16,8	6,2	1,3	6,7
2006	0,0	0,0	1,2	9,3	10,7	17,1	22,9	22,5	9,9	2,3	9,9
2007	0,0	0,0	2,0	4,5	7,4	8,6	15,2	14,6	7,0	1,3	6,3
2008	0,0	0,0	1,2	12,0	14,5	11,0	18,9	22,5	9,5	2,4	9,5
Province de Québec hors Montréal											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4	0,7	0,4	0,3	0,3
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8	0,0	0,5	0,4	0,6	0,3
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1
1997	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,3	0,2	0,1
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,8	0,8	0,3	0,0	0,4
2003	0,0	0,0	0,0	0,5	2,3	4,0	2,3	2,8	0,8	0,2	1,3
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	3,4	8,8	6,6	8,4	1,7	3,9
2005	0,0	0,0	0,0	3,1	1,1	4,0	3,1	5,2	4,5	1,0	2,5
2006	0,0	0,0	1,6	2,1	1,6	5,1	6,9	5,9	4,7	0,6	3,0
2007	0,0	0,0	1,5	3,3	2,1	3,4	5,4	6,6	1,6	0,6	2,5
2008	0,0	0,0	1,0	5,6	6,8	2,2	6,6	6,2	5,8	1,1	3,6

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	6,4	0,0	2,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	18,7	0,0	5,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,7
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	4,7	0,0	2,2
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	4,6	0,0	2,9
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	3,4	0,0	4,0	3,0	4,7	2,6
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,3
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,1	0,0	2,1	0,0	0,9
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	9,1	25,5	21,2	32,9	10,6	14,2
2005	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	4,5	4,4	8,8	8,0	6,8	5,2
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	10,8	0,0	1,6	3,4
2007	0,0	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	4,6	9,1	1,9	0,0	3,1
2008	0,0	0,0	0,0	14,9	16,4	0,0	4,6	7,5	19,1	4,5	7,6
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,4
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,4
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,4
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,4
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	7,5	5,9	2,4	0,0	0,0	2,1
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	8,2	0,0	1,7
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,4
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	9,9	2,6	0,0	2,5
2007	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	7,2	14,3	2,5	0,0	0,0	2,5
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	14,8	7,9	0,0	0,0	2,5

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,7
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	9,4	8,3	0,0	0,0	2,7
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	12,4	4,6	0,0	3,4
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	2,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 - Montréal											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,6
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,8	0,0	1,4	0,6
1995	0,0	0,0	0,0	1,5	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5
1996	0,0	0,0	2,0	0,0	1,3	0,0	2,6	1,6	0,0	0,0	0,7
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	0,0	0,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,2
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,5	0,7	0,0	0,7	0,6
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	2,5	3,6	1,0	0,0	1,3
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	10,6	13,9	9,1	1,9	0,0	4,0
2003	0,0	0,0	0,0	5,9	8,8	26,8	28,4	32,2	11,0	0,7	12,5
2004	0,0	0,0	0,0	4,6	9,9	18,9	30,5	32,9	17,0	0,7	13,0
2005	0,0	0,0	1,9	11,0	19,9	28,2	44,6	55,0	12,2	2,0	19,4
2006	0,0	0,0	0,0	30,6	32,6	44,8	64,2	76,2	28,9	7,7	31,2
2007	0,0	0,0	3,7	8,1	20,5	20,6	39,8	40,0	26,6	3,7	17,9
2008	0,0	0,0	1,8	30,7	34,1	31,4	49,5	72,9	22,7	6,7	27,4

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,6
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	20,8	3,4	0,0	0,0	3,1
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	7,2	10,1	0,0	0,0	3,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	6,6	0,0	0,0	1,8
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	3,3	0,0	0,0	1,2
2006	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0	7,9	9,8	20,3	0,0	6,5
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	8,1	0,0	0,0	0,0	1,2
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,2	3,4	7,7	0,0	2,9
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	1,3
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	2,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - Nord-du-Québec											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,8	0,0	0,0	24,2
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	2,1
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	2,2
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Chaudière-Appalaches											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	2,9	0,0	0,0	1,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	14,4	5,9	10,2	3,0	4,6
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	10,0	2,9	2,5
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,5
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	3,1	0,0	0,0	1,0
2008	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	5,2	2,0

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,6
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,6
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,6
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	3,2	0,0	0,0	1,1
2005	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	8,3	0,0	3,2	12,8	0,0	3,4
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	8,3	0,0	2,2
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	4,1	0,0	2,8
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	3,9	0,0	2,2
14 - Lanaudière											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,3	1,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,5
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	2,9
2005	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	6,8	0,0	6,6	0,0	1,9
2006	0,0	0,0	6,5	7,6	0,0	8,1	14,2	7,8	3,2	0,0	4,3
2007	0,0	0,0	6,3	0,0	15,4	0,0	0,0	8,0	3,1	2,7	3,8
2008	0,0	0,0	6,2	15,4	15,3	0,0	7,4	8,2	9,2	0,0	5,6

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,5
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,4
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,3	0,0	2,2	8,7	0,0	2,4
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	5,3	4,3	2,8	0,0	2,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	6,3	0,0	6,5	5,4	2,4	3,5
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2	1,2
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	13,3	7,6	0,0	3,8
16 - Montérégie											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,6	1,3	0,5
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,9	1,1	0,0	0,5
2003	0,0	0,0	0,0	2,2	2,4	7,1	1,9	4,3	1,1	0,0	1,8
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	2,4	4,0	4,3	4,2	1,0	2,5
2005	0,0	0,0	0,0	4,4	2,3	9,6	4,2	10,2	5,1	0,0	3,9
2006	0,0	0,0	4,3	2,3	0,0	16,7	6,5	6,8	7,0	0,9	4,3
2007	0,0	0,0	0,0	4,6	4,4	9,3	11,1	13,9	3,9	0,8	5,0
2008	0,0	0,0	2,0	9,4	13,2	4,5	15,8	7,1	6,8	0,8	5,3

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,8	0,0	0,0	18,9
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 96 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, selon le groupe d'âge, province de Québec, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes



Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.


¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 97 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, selon le groupe d'âge, Québec, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).


¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 98 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, selon le groupe d'âge, Montréal, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).


¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Figure 99 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, selon le groupe d'âge, Montérégie, 1993 à 2008

Chez les femmes



Chez les hommes



Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2005) selon les données du SDI (1993-2000) et de l'ISQ (2001-2008).

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Province de Québec*												
1993	0	0	0	5	16	9	9	15	9	28	0	91
1994	0	0	2	2	12	5	5	14	7	28	0	75
1995	0	0	1	6	7	5	3	10	12	16	0	61
1996	0	0	0	2	7	8	5	9	2	16	0	50
1997	0	0	0	1	2	4	5	3	5	19	0	40
1998	0	0	0	1	5	2	3	6	2	19	0	39
1999	0	0	0	2	2	0	2	6	4	10	0	26
2000	0	0	0	5	0	1	5	3	1	9	0	24
2001	0	0	0	0	3	5	4	8	3	13	0	36
2002	0	0	0	0	5	7	7	11	7	15	0	52
2003	1	0	1	5	6	17	12	23	22	30	0	117
2004	0	0	1	3	11	3	6	20	18	30	0	92
2005	0	0	1	2	6	6	7	15	18	34	0	89
2006	0	0	0	3	7	9	13	24	18	36	0	110
2007	0	0	0	4	10	16	10	19	16	24	0	99
2008	0	0	3	7	10	16	17	37	37	40	0	168
Province de Québec hors Montréal												
1993	0	0	0	2	5	4	2	1	6	12	0	32
1994	0	0	0	0	2	1	1	7	4	11	0	26
1995	0	0	1	0	2	1	1	3	2	7	0	17
1996	0	0	0	0	2	0	2	2	0	10	0	16
1997	0	0	0	1	1	2	2	1	1	10	0	18
1998	0	0	0	0	0	0	2	2	1	10	0	15
1999	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	0	9
2000	0	0	0	2	0	0	2	1	0	4	0	9
2001	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	5
2002	0	0	0	0	1	0	2	3	1	6	0	13
2003	1	0	0	4	1	2	1	5	6	8	0	28
2004	0	0	1	1	3	0	2	10	10	16	0	43
2005	0	0	1	2	2	3	5	9	11	27	0	60
2006	0	0	0	0	2	4	5	11	12	25	0	59
2007	0	0	0	0	6	3	7	10	11	19	0	56
2008	0	0	2	2	4	6	3	12	20	21	0	70

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1993	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1993	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3
1994	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
1997	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
1998	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	8
2005	0	0	1	0	1	0	1	3	1	5	0	12
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	5
2007	0	0	0	0	1	0	1	0	3	4	0	9
2008	0	0	0	1	3	2	0	2	2	4	0	14
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1993	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	4
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2004	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	4
2005	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	5
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	5

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1993	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2002	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
06 - Montréal												
1993	0	0	0	3	11	5	7	14	3	16	0	59
1994	0	0	2	2	10	4	4	7	3	17	0	49
1995	0	0	0	6	5	4	2	7	10	9	0	44
1996	0	0	0	2	5	8	3	7	2	6	0	34
1997	0	0	0	0	1	2	3	2	4	9	0	22
1998	0	0	0	1	5	2	1	4	1	9	0	24
1999	0	0	0	2	1	0	1	5	1	7	0	17
2000	0	0	0	3	0	1	3	2	1	5	0	15
2001	0	0	0	0	3	3	4	7	3	11	0	31
2002	0	0	0	0	4	7	5	8	6	9	0	39
2003	0	0	1	1	5	15	11	18	16	22	0	89
2004	0	0	0	2	8	3	4	10	8	14	0	49
2005	0	0	0	0	4	3	2	6	7	7	0	29
2006	0	0	0	3	5	5	8	13	6	11	0	51
2007	0	0	0	4	4	13	3	9	5	5	0	43
2008	0	0	1	5	6	10	14	25	17	19	0	98

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	4
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1999	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	5
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2005	0	0	0	1	0	0	2	1	2	1	0	7
2006	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	6
2007	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	0	8
2008	0	0	0	0	1	2	0	2	1	1	0	7
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Nord-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2008	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
12 - Chaudière-Appalaches												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	4
2006	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1993	0	0	0	1	2	1	2	0	3	4	0	13
1994	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	0	6
1995	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	6
1999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	5
2003	1	0	0	1	1	1	0	1	2	1	0	8
2004	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	0	6
2005	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	0	10
2006	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	0	8
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
2008	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	0	9
14 - Lanaudière												
1993	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4
2008	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	4

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1993	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	0	6
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2007	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	5
2008	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
16 - Montérégie												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5
1994	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4
1995	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4	0	7
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	5
1997	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
2000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2001	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
2002	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
2003	0	0	0	1	0	1	0	3	0	3	0	8
2004	0	0	0	0	1	0	0	3	2	6	0	12
2005	0	0	0	1	0	1	1	3	4	9	0	19
2006	0	0	0	0	1	1	3	5	4	9	0	23
2007	0	0	0	0	4	2	5	3	3	7	0	24
2008	0	0	0	0	0	0	1	4	7	11	0	23

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

¹ Syphilis latente plus d'un an, cardio-vasculaire, nerveuse (symptomatique et asymptomatique) et symptomatique tardive.

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Province de Québec*												
1993	0	0	0	2	2	2	1	3	7	15	0	32
1994	0	0	1	0	4	3	2	1	1	20	0	32
1995	0	0	1	6	4	2	1	3	6	10	0	34
1996	0	0	0	2	4	3	2	2	0	11	0	24
1997	0	0	0	1	1	2	2	0	4	9	0	19
1998	0	0	0	0	3	1	2	1	0	12	0	20
1999	0	0	0	1	1	0	1	0	0	4	0	7
2000	0	0	0	4	0	1	1	0	0	3	0	9
2001	0	0	0	0	1	2	3	2	1	8	0	17
2002	0	0	0	0	3	5	0	2	0	10	0	20
2003	1	0	0	4	4	2	2	4	4	13	0	34
2004	0	0	0	1	1	1	2	9	3	16	0	33
2005	0	0	1	1	0	3	3	1	7	14	0	30
2006	0	0	0	2	5	4	5	6	4	16	0	42
2007	0	0	0	2	7	6	3	6	5	13	0	42
2008	0	0	2	5	5	5	7	8	8	15	0	55
Province de Québec hors Montréal												
1993	0	0	0	0	1	0	1	0	5	7	0	14
1994	0	0	0	0	1	1	0	1	0	9	0	12
1995	0	0	1	0	2	0	0	2	1	3	0	9
1996	0	0	0	0	1	0	1	1	0	6	0	9
1997	0	0	0	1	1	1	0	0	1	4	0	8
1998	0	0	0	0	0	0	2	0	0	8	0	10
1999	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
2000	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	4
2001	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2002	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	4
2003	1	0	0	3	1	1	0	0	0	3	0	9
2004	0	0	0	0	1	0	1	3	1	10	0	16
2005	0	0	1	1	0	2	3	1	6	14	0	28
2006	0	0	0	0	2	2	3	3	4	12	0	26
2007	0	0	0	0	3	1	2	3	3	10	0	22
2008	0	0	1	2	3	2	1	2	4	9	0	24

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2005	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	5
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
2008	0	0	0	1	2	0	0	1	0	2	0	6
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1993	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Montréal												
1993	0	0	0	2	1	2	0	3	2	8	0	18
1994	0	0	1	0	3	2	2	0	1	11	0	20
1995	0	0	0	6	2	2	1	1	5	7	0	25
1996	0	0	0	2	3	3	1	1	0	5	0	15
1997	0	0	0	0	0	1	2	0	3	5	0	11
1998	0	0	0	0	3	1	0	1	0	4	0	10
1999	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	5
2000	0	0	0	2	0	1	1	0	0	1	0	5
2001	0	0	0	0	1	1	3	2	1	7	0	15
2002	0	0	0	0	2	5	0	2	0	7	0	16
2003	0	0	0	1	3	1	2	4	4	10	0	25
2004	0	0	0	1	0	1	1	6	2	6	0	17
2005	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
2006	0	0	0	2	3	2	2	3	0	4	0	16
2007	0	0	0	2	4	5	1	3	2	3	0	20
2008	0	0	1	3	2	3	6	6	4	6	0	31

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1999	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	4
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2008	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Nord-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Chaudière-Appalaches												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2006	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1993	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	6
1994	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
2005	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	0	7
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
2008	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
14 - Lanaudière												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2008	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Montérégie												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
1994	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
1995	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
1997	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2003	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3
2004	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	0	6
2005	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	0	9
2006	0	0	0	0	1	0	3	2	2	4	0	12
2007	0	0	0	0	3	1	2	1	0	4	0	11
2008	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	9

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

¹ Syphilis latente plus d'un an, cardio-vasculaire, nerveuse (symptomatique et asymptomatique) et symptomatique tardive.

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Province de Québec*												
1993	0	0	0	3	14	7	8	12	2	13	0	59
1994	0	0	1	2	8	2	3	13	6	8	0	43
1995	0	0	0	0	3	3	2	7	6	6	0	27
1996	0	0	0	0	3	5	3	7	2	5	0	26
1997	0	0	0	0	1	2	3	3	1	10	0	21
1998	0	0	0	1	2	1	1	5	2	7	0	19
1999	0	0	0	1	1	0	1	6	4	6	0	19
2000	0	0	0	1	0	0	4	3	1	6	0	15
2001	0	0	0	0	2	3	1	6	2	5	0	19
2002	0	0	0	0	2	2	7	9	7	5	0	32
2003	0	0	1	1	2	15	10	19	18	17	0	83
2004	0	0	1	2	10	2	4	11	15	14	0	59
2005	0	0	0	1	6	3	4	14	11	20	0	59
2006	0	0	0	1	2	5	8	18	14	20	0	68
2007	0	0	0	2	3	10	7	13	11	11	0	57
2008	0	0	1	2	5	11	10	29	29	25	0	112
Province de Québec hors Montréal												
1993	0	0	0	2	4	4	1	1	1	5	0	18
1994	0	0	0	0	1	0	1	6	4	2	0	14
1995	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	0	8
1996	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	0	7
1997	0	0	0	0	0	1	2	1	0	6	0	10
1998	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	5
1999	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	7
2000	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	5
2001	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
2002	0	0	0	0	0	0	2	3	1	3	0	9
2003	0	0	0	1	0	1	1	5	6	5	0	19
2004	0	0	1	1	2	0	1	7	9	6	0	27
2005	0	0	0	1	2	1	2	8	5	13	0	32
2006	0	0	0	0	0	2	2	8	8	13	0	33
2007	0	0	0	0	3	2	5	7	8	9	0	34
2008	0	0	1	0	1	4	2	10	16	12	0	46

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1993	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1993	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
1994	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	6
2005	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	0	7
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	5
2007	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	6
2008	0	0	0	0	1	2	0	1	2	2	0	8
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2004	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
2005	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	4
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1993	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
06 - Montréal												
1993	0	0	0	1	10	3	7	11	1	8	0	41
1994	0	0	1	2	7	2	2	7	2	6	0	29
1995	0	0	0	0	3	2	1	6	5	2	0	19
1996	0	0	0	0	2	5	2	6	2	1	0	19
1997	0	0	0	0	1	1	1	2	1	4	0	11
1998	0	0	0	1	2	1	1	3	1	5	0	14
1999	0	0	0	1	1	0	0	5	1	4	0	12
2000	0	0	0	1	0	0	2	2	1	4	0	10
2001	0	0	0	0	2	2	1	5	2	4	0	16
2002	0	0	0	0	2	2	5	6	6	2	0	23
2003	0	0	1	0	2	14	9	14	12	12	0	64
2004	0	0	0	1	8	2	3	4	6	8	0	32
2005	0	0	0	0	4	2	2	6	6	7	0	27
2006	0	0	0	1	2	3	6	10	6	7	0	35
2007	0	0	0	2	0	8	2	6	3	2	0	23
2008	0	0	0	2	4	7	8	19	13	13	0	66

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
2006	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	6
2007	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	0	7
2008	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	4
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Nord-du-Québec												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
12 - Chaudière-Appalaches												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1993	0	0	0	1	2	1	1	0	0	2	0	7
1994	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
1995	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
2003	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	0	6
2004	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	4
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
2006	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	5
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0	8
14 - Lanaudière												
1993	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1993	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4
2008	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
16 - Montérégie												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
1994	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
1995	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	5
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
2000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5
2004	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	6
2005	0	0	0	1	0	0	1	3	2	3	0	10
2006	0	0	0	0	0	1	0	3	2	5	0	11
2007	0	0	0	0	1	1	3	2	3	3	0	13
2008	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	14

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

¹ Syphilis latente plus d'un an, cardio-vasculaire, nerveuse (symptomatique et asymptomatique) et symptomatique tardive.

www.inspq.qc.ca

Québec 

- Institut national de santé publique
- Ministère de la Santé et des Services sociaux