



Surveillance
des infections
transmissibles
sexuellement
et par le sang

ANALYSE DES CAS DÉCLARÉS D'INFECTION GÉNITALE À
CHLAMYDIA TRACHOMATIS, D'INFECTION GONOCOCCIQUE
ET DE SYPHILIS AU QUÉBEC PAR ANNÉE CIVILE

1994-2009 (ET DONNÉES PRÉLIMINAIRES 2010)

ANALYSE DES CAS DÉCLARÉS D'INFECTION GÉNITALE À
CHLAMYDIA TRACHOMATIS, D'INFECTION GONOCOCCIQUE
ET DE SYPHILIS AU QUÉBEC PAR ANNÉE CIVILE

1994-2009 (ET DONNÉES PRÉLIMINAIRES 2010)

Direction des risques biologiques et de la santé au travail

Mars 2011

AUTEURS

Karine Blouin
Direction des risques biologiques et de la santé au travail
Institut national de santé publique du Québec

Raymond Parent
Direction des risques biologiques et de la santé au travail
Institut national de santé publique du Québec
Unité de recherche en santé des populations
Centre de recherche, Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
Hôpital du Saint-Sacrement

AVEC LA COLLABORATION DE

Sylfreed Minzunza
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

RÉVISION

Isabelle Petillot, technicienne administrative
Direction des risques biologiques et de la santé au travail
Institut national de santé publique du Québec

Ce document est disponible intégralement en format électronique (PDF) sur le site Web de l'Institut national de santé publique du Québec au : <http://www.inspq.qc.ca>.

Les reproductions à des fins d'étude privée ou de recherche sont autorisées en vertu de l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur. Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation du gouvernement du Québec qui détient les droits exclusifs de propriété intellectuelle sur ce document. Cette autorisation peut être obtenue en formulant une demande au guichet central du Service de la gestion des droits d'auteur des Publications du Québec à l'aide d'un formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante : <http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/autorisation.php>, ou en écrivant un courriel à : droit.auteur@cspq.gouv.qc.ca.

Les données contenues dans le document peuvent être citées, à condition d'en mentionner la source.

DÉPÔT LÉGAL – 2^e TRIMESTRE 2011
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
ISSN : 1917-9979 (VERSION IMPRIMÉE)
ISSN : 1920-924X (PDF)
ISBN : 978-2-550-61951-2 (VERSION IMPRIMÉE)
ISBN : 978-2-550-61952-9 (PDF)

©Gouvernement du Québec (2011)

REMERCIEMENTS

Nous aimerions remercier :

- les personnes qui se chargent d'alimenter et de gérer le système des maladies à déclaration obligatoire dans chacune des directions régionales de la santé publique;
- la direction du Laboratoire de santé publique du Québec, Institut national de santé publique du Québec (LSPQ/INSPQ) ainsi que les personnes associées à la gestion du fichier des maladies à déclaration obligatoire du LSPQ/INSPQ;
- monsieur Sylfreed Minzunza qui a produit les tableaux et les graphiques et qui nous a fourni les données complémentaires dont nous avons besoin;
- madame Myrto Mondor (Unité de recherche en santé des populations, Centre hospitalier affilié universitaire de Québec) qui a aidé à la conception, au développement et à la programmation du cadre d'analyse initial.

AVANT-PROPOS

Nous évaluons dans le présent rapport l'ampleur du problème des infections génitales à *Chlamydia trachomatis*, des infections gonococciques et des syphilis au Québec. L'analyse de la distribution des cas aide à orienter les interventions et à planifier les ressources pour lutter contre le problème.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) est responsable du programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (MADO). Plusieurs partenaires tels les médecins traitants, les laboratoires déclarants et les directions régionales de la santé publique y collaborent. Ces directions régionales assurent la collecte, la saisie et le transfert des informations. Le MSSS se charge de la tabulation et de la production des graphiques. L'analyse des données a été faite à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Nous nous adressons ici aux responsables régionaux de la lutte contre les ITSS, particulièrement à ceux qui œuvrent en santé publique. Nous espérons aussi être utiles à leurs partenaires communautaires et institutionnels.

FAITS SAILLANTS

Au Québec, 18 119 cas d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, d'infection gonococcique et de syphilis infectieuse ont été déclarés en 2009, soit près de 1 100 cas de plus qu'en 2008.

Aucun cas de granulome inguinal ni de chancre mou n'a été déclaré en 2009. Le nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne (LGV) est passé de 25 cas en 2005 à 44 cas en 2006. Une diminution a ensuite été observée avec 10 cas déclarés en 2007, 9 en 2008 et 3 en 2009. Les données préliminaires indiquent que 5 cas auraient été déclarés en 2010.

Infection génitale à *Chlamydia trachomatis*

Avec 15 864 cas déclarés, cette infection compte pour 49,7 % des 31 919 cas de MADO déclarés en 2009.

Des cas ont été déclarés dans chacune des 18 régions sociosanitaires du Québec. La région de Montréal a déclaré le plus grand nombre de cas (4 261 des 15 864 cas déclarés en 2009; 27 %).

Le taux d'incidence de l'infection génitale à *C. trachomatis* est demeuré stable entre 2004 et 2006 pour ensuite commencer à augmenter à partir de 2007. Il était de 203,0 par 100 000 en 2009, et de 218,0 par 100 000 selon les données préliminaires pour 2010.

Les jeunes de 15 à 24 ans demeurent les plus touchés avec un taux d'incidence de 962,0 par 100 000 chez les 15 à 19 ans et un taux de 1 187,9 par 100 000 chez les 20 à 24 ans.

Infection gonococcique

Dix-sept des 18 régions sociosanitaires du Québec ont rapporté au moins un cas en 2009.

C'est dans la région de Montréal qu'on observe le plus de cas, soit 984 des 1 884 cas déclarés en 2009 (52 %). Contrairement à ce qui a été observé pour l'infection génitale à *C. trachomatis*, cette proportion est nettement plus élevée que le poids démographique de la région (24 %; 1 906 811/7 828 879).

Une brusque augmentation du taux d'incidence a été observée au Nunavik entre 2007 et 2008. Le taux est passé de 537,8 par 100 000 (60 cas) à 1 683,7 par 100 000 (191 cas) lors de cette période, soit une augmentation de 213 %. En 2009, 176 cas ont été déclarés, pour un taux d'incidence de 1 525,9 par 100 000. Selon les données préliminaires, 197 cas ont été observés en 2010.

Le taux d'incidence de l'infection gonococcique a augmenté au Québec depuis la fin des années 90 jusqu'en 2001, avant de se stabiliser pendant quelques années à un taux d'environ 11 par 100 000, pour ensuite doubler entre 2005 (11,9 par 100 000) et 2009 (24,1 par 100 000).

Les données préliminaires pour l'année 2010 suggèrent une nouvelle augmentation à 26,1 par 100 000. L'augmentation des taux d'incidence observée entre 2005 et 2009 touche bien davantage les femmes que les hommes.

Cependant, sauf chez les 15 à 19 ans où le taux d'incidence est plus élevé chez les jeunes filles, les hommes démontrent de façon constante des taux supérieurs à ceux des femmes (31,6 vs. 16,7 par 100 000 en 2009).

La proportion de souches de *N. gonorrhoeae* résistantes à la ciprofloxacine est passée de 4 % en 2004 à 17 % en 2005, pour atteindre son maximum à 25 % en 2006. Elle a ensuite diminué en 2007 (23 %), en 2008 (10 %) et en 2009 (6 %).

Syphilis

L'incidence de la syphilis infectieuse diminuait depuis plusieurs années au Québec lorsque l'épidémie actuelle s'est déclarée chez les HARSAH de la région de Montréal.

En 2009, Montréal demeurait la région où étaient déclarés près des deux tiers des cas (227/371, 61 %). Le taux d'incidence y était alors de 11,9 par 100 000 (23,3 par 100 000 chez les hommes et 0,9 par 100 000 chez les femmes). Le taux provincial de 4,7 par 100 000 pour 2009 est près de 100 fois plus élevé que les taux observés dans les années précédant l'épidémie (0,05 par 100 000 en 1998, par exemple). Les données préliminaires pour 2010 indiquent un taux provincial de 6,6 par 100 000, soit une augmentation importante par rapport à 2009.

Les taux les plus élevés et les plus grands nombres de cas ont été observés chez les hommes de 20 à 49 ans. Plus de la moitié des cas masculins ont été déclarés chez les 40 ans et plus (188/353, 53 %).

Le nombre de cas de syphilis infectieuse chez les femmes est demeuré relativement stable entre 2005 et 2008 avec six à huit cas déclarés par année. En 2009, une augmentation du nombre de cas a été observée avec 17 cas déclarés. Les données préliminaires indiquent que 24 cas ont été déclarés pour l'année 2010. Complètement absente depuis 2003, la syphilis congénitale a fait un retour en début d'année 2011 (un cas déclaré). Ceci nous rappelle donc que la syphilis congénitale demeure une menace sur notre territoire.

Conclusion

Les ITS bactériennes représentent plus que jamais un problème de santé publique pour le Québec. Les efforts de surveillance et de prévention de la transmission des ITS doivent donc être maintenus, sinon intensifiés.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX	IX
LISTE DES FIGURES	XI
1 INTRODUCTION.....	1
2 RÉ SULTATS	3
2.1 ITS rares	3
2.2 Infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i>	3
2.2.1 Canada	3
2.2.2 Québec	4
2.3 Infection gonococcique	6
2.3.1 Canada	6
2.3.2 Québec	7
2.4 Syphilis	10
2.4.1 Classification des cas	10
2.4.2 Syphilis infectieuses	11
2.4.3 Syphilis non infectieuse	13
3 DISCUSSION.....	15
3.1 Limites et portée de l'analyse	15
4 CONCLUSION.....	17
5 BIBLIOGRAPHIE.....	21
TABLEAUX ET FIGURES	25

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Caractéristiques des cas déclarés d'ITS selon l'âge et le sexe, province de Québec, 2005-2009	28
Tableau 2	Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	29
Tableau 3	Nombre de cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	58
Tableau 4	Nombre de cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	68
Tableau 5	Nombre de cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	78
Tableau 6	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	88
Tableau 7	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	98
Tableau 8	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	108
Tableau 9	Nombre de cas déclarés d'infection à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le type chez les moins d'un an, province de Québec, 1994 à 2009.....	137
Tableau 10	Nombre de cas déclarés d'infection à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le type chez les moins d'un an, province de Québec hors Montréal, 1994 à 2009	137
Tableau 11	Nombre de cas déclarés d'infection à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le type chez les moins d'un an, Montréal, 1994 à 2009	137
Tableau 12	Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	157
Tableau 13	Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	167
Tableau 14	Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	177
Tableau 15	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009.....	187
Tableau 16	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	197
Tableau 17	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	207

Tableau 18	Nombre de cas déclarés et proportion (%) d'infection à gonococcique selon le site de la maladie chez les hommes, province de Québec, 1994 à 2009	236
Tableau 19	Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009.....	256
Tableau 20	Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	266
Tableau 21	Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	276
Tableau 22	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	286
Tableau 23	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009	296
Tableau 24	Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008	306
Tableau 25	Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008.....	320
Tableau 26	Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009.....	330
Tableau 27	Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009.....	340

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Proportion du nombre de cas selon la catégorie de maladie, province de Québec, 2009	27
Figure 2	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, province de Québec, 1994 à 2009	39
Figure 3	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Bas-Saint-Laurent, 1994 à 2009	40
Figure 4	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1994 à 2009	41
Figure 5	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Québec, 1994 à 2009	42
Figure 6	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 1994 à 2009	43
Figure 7	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Estrie, 1994 à 2009	44
Figure 8	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Montréal, 1994 à 2009	45
Figure 9	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Outaouais, 1994 à 2009	46
Figure 10	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 1994 à 2009	47
Figure 11	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Côte-Nord, 1994 à 2009	48
Figure 12	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Nord-du-Québec, 1994 à 2009	49
Figure 13	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 1994 à 2009	50
Figure 14	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1994 à 2009	51
Figure 15	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Laval, 1994 à 2009	52
Figure 16	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Lanaudière, 1994 à 2009	53
Figure 17	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Laurentides, 1994 à 2009	54
Figure 18	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Montérégie, 1994 à 2009	55
Figure 19	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Nunavik, 1994 à 2009	56

Figure 20	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> selon le sexe, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1994 à 2009.....	57
Figure 21	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, province de Québec, 1994 à 2009.....	118
Figure 22	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Bas-Saint-Laurent, 1994 à 2009.....	119
Figure 23	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1994 à 2009	120
Figure 24	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Québec, 1994 à 2009.....	121
Figure 25	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Mauricie et Centre-du-Québec, 1994 à 2009	122
Figure 26	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Estrie, 1994 à 2009	123
Figure 27	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Montréal, 1994 à 2009.....	124
Figure 28	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Outaouais, 1994 à 2009	125
Figure 29	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Abitibi-Témiscamingue, 1994 à 2009...	126
Figure 30	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Côte-Nord, 1994 à 2009	127
Figure 31	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Nord-du-Québec, 1994 à 2009	128
Figure 32	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 1994 à 2009	129
Figure 33	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Chaudière-Appalaches, 1994 à 2009...	130
Figure 34	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Laval, 1994 à 2009	131
Figure 35	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Lanaudière, 1994 à 2009.....	132
Figure 36	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Laurentides, 1994 à 2009	133
Figure 37	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Montérégie, 1994 à 2009.....	134
Figure 38	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Nunavik, 1994 à 2009.....	135

Figure 39	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> , selon le groupe d'âge, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1994 à 2009	136
Figure 40	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, province de Québec, 1994 à 2009.....	138
Figure 41	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Bas-Saint-Laurent, 1994 à 2009.....	139
Figure 42	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1994 à 2009.....	140
Figure 43	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Québec, 1994 à 2009.....	141
Figure 44	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 1994 à 2009.....	142
Figure 45	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Estrie, 1994 à 2009	143
Figure 46	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Montréal, 1994 à 2009	144
Figure 47	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Outaouais, 1994 à 2009	145
Figure 48	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 1994 à 2009	146
Figure 49	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Côte-Nord, 1994 à 2009.....	147
Figure 50	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Nord-du-Québec, 1994 à 2009.....	148
Figure 51	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 1994 à 2009	149
Figure 52	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1994 à 2009	150
Figure 53	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Laval, 1994 à 2009.....	151
Figure 54	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Lanaudière, 1994 à 2009	152
Figure 55	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Laurentides, 1994 à 2009.....	153
Figure 56	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Montérégie, 1994 à 2009	154
Figure 57	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Nunavik, 1994 à 2009	155
Figure 58	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1994 à 2009.....	156

Figure 59	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, province de Québec, 1994 à 2009	217
Figure 60	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Bas-Saint-Laurent, 1994 à 2009.....	218
Figure 61	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1994 à 2009	219
Figure 62	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Québec, 1994 à 2009.....	220
Figure 63	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Mauricie et Centre-du-Québec, 1994 à 2009.....	221
Figure 64	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Estrie, 1994 à 2009	222
Figure 65	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Montréal, 1994 à 2009	223
Figure 66	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Outaouais, 1994 à 2009	224
Figure 67	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Abitibi-Témiscamingue, 1994 à 2009	225
Figure 68	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Côte-Nord, 1994 à 2009.....	226
Figure 69	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Nord-du-Québec, 1994 à 2009.....	227
Figure 70	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 1994 à 2009	228
Figure 71	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Chaudière-Appalaches, 1994 à 2009	229
Figure 72	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Laval, 1994 à 2009.....	230
Figure 73	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Lanaudière, 1994 à 2009	231
Figure 74	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Laurentides, 1994 à 2009.....	232
Figure 75	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Montérégie, 1994 à 2009	233
Figure 76	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Nunavik, 1994 à 2009	234
Figure 77	Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1994 à 2009.....	235
Figure 78	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, province de Québec, 1994 à 2009	237

Figure 79	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Bas-Saint-Laurent, 1994 à 2009.....	238
Figure 80	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1994 à 2009.....	239
Figure 81	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Québec, 1994 à 2009.....	240
Figure 82	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 1994 à 2009.....	241
Figure 83	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Estrie, 1994 à 2009.....	242
Figure 84	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Montréal, 1994 à 2009.....	243
Figure 85	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Outaouais, 1994 à 2009.....	244
Figure 86	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 1994 à 2009.....	245
Figure 87	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Côte-Nord, 1994 à 2009.....	246
Figure 88	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Nord-du-Québec, 1994 à 2009.....	247
Figure 89	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 1994 à 2009.....	248
Figure 90	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1994 à 2009.....	249
Figure 91	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Laval, 1994 à 2009.....	250
Figure 92	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Lanaudière, 1994 à 2009.....	251
Figure 93	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Laurentides, 1994 à 2009.....	252
Figure 94	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Montérégie, 1994 à 2009.....	253
Figure 95	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Nunavik, 1994 à 2009.....	254
Figure 96	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse selon le sexe, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1994 à 2009.....	255
Figure 97	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse, selon le groupe d'âge, province de Québec, 1994 à 2009.....	316
Figure 98	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse, selon le groupe d'âge, Québec, 1994 à 2009.....	317

Figure 99	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse, selon le groupe d'âge, Montréal, 1994 à 2009	318
Figure 100	Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse, selon le groupe d'âge, Montérégie, 1994 à 2009	319

1 INTRODUCTION

Certaines infections transmissibles sexuellement (ITS) sont répertoriées dans le système québécois des maladies à déclaration obligatoire (MADO). Un système informatisé, implanté en 1989-1990, relie chacune des dix-huit régions sociosanitaires à une plate-forme commune d'enregistrement des cas déclarés située au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ/INSPQ). L'agrégation des données dépersonnalisées décrit l'épidémiologie des infections déclarées au Québec.

Nous traitons ici des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, d'infection gonococcique et de syphilis. Nous abordons aussi certaines ITS plus rarement observées, soit la lymphogranulomatose vénérienne, le granulome inguinal et le chancre mou.

Les données présentées ont été extraites le 20 mai 2010 et couvrent la période du 1^{er} janvier 1994 au 31 décembre 2009. À cela s'ajoutent les données préliminaires 2010 disponibles le 22 février 2011.

Les dénominateurs des années 1994 à 2006 sont des estimations de la population du Québec selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge produites par le Service du développement de l'information (SDI), du ministère de la Santé et des Services sociaux (janvier 2010). Ces données sont ajustées à partir des données de Statistique Canada de février 2004. Les dénominateurs de 2006 à 2031 sont des projections de la population du Québec selon la région sociosanitaire (RSS), le sexe et l'âge produites par l'Institut de la statistique du Québec (janvier 2010), sur la base des données du recensement de 2006.

Nous présentons le sommaire de l'épidémiologie canadienne pour chacune des maladies. Ces données sont issues d'un exercice d'analyse récent fait à l'Agence de la santé publique du Canada et traitant des données recueillies jusqu'en 2008^[1, 2]. Certaines données préliminaires pour 2009 ainsi que des projections pour 2010 étaient également disponibles via le site Web de l'Agence de la santé publique du Canada^[3].

2 RÉSULTATS

L'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, l'infection gonococcique et la syphilis infectieuse sont les ITS à déclaration obligatoire les plus fréquentes (18 119). En 2009, les ITS représentaient 66,6 % (21 267/31 919) des cas déclarés de MADO (figure 1, page 27). Dans l'ensemble, 42,2 % des cas déclarés entre 2005 et 2009 étaient des ITS (Sylfreed Minzunza, communication personnelle).

Le tableau 1 (page 28) donne les caractéristiques d'âge et de sexe des patients atteints entre 2005 et 2009, données qui sont rarement manquantes. Un peu moins que les deux tiers des cas (59 %) touchaient des femmes. L'âge médian de celles-ci était de 21 ans, tandis qu'il était de 25 ans chez les hommes.

2.1 ITS RARES

Certaines ITS à déclaration obligatoire sont très peu fréquentes. Au Québec, aucun cas de granulome inguinal et deux cas de chancre mou ont été déclarés de 2005 à 2009.

Les sérotypes L1, L2 et L3 de *Chlamydia trachomatis* envahissent les systèmes lymphatiques et circulatoires lors du développement de la lymphogranulomatose vénérienne, une ITS qui était également très peu fréquente au Québec et au Canada jusqu'en 2005. Cinq cas seulement avaient été déclarés au Québec de 1994 à 2004 (tableau 2, page 29). Le nombre de cas a augmenté de façon importante en 2005 (25 cas) et en 2006 (44 cas) avant de diminuer en 2007 (10 cas), en 2008 (9 cas) et en 2009 (3 cas). Le nombre de cas a toutefois augmenté en 2010 (13 cas). Fait à remarquer, 97,8 % des cas déclarés depuis 2005 touchaient des hommes dont la grande majorité sont probablement des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH) puisqu'on sait par Lambert et collab. que tous les cas déclarés entre 2003 et 2008 touchaient cette population^[4].

2.2 INFECTION GÉNITALE À *CHLAMYDIA TRACHOMATIS*

2.2.1 Canada

Le taux d'incidence de l'infection génitale à *C. trachomatis*, qui était de 200,2 par 100 000 en 2004, a augmenté en 2005, 2006, 2007 et 2008 (205,6, 212,4, 224,0, et 248,9 par 100 000, respectivement)^[1, 2]. Les données préliminaires pour 2009 et les projections pour 2010 suggèrent une évolution du taux national à 258,5 par 100 000 pour 2009 et à 269,7 par 100 000 pour 2010^[3].

Entre 2007 et 2008, le taux d'incidence a augmenté dans toutes les provinces et territoires. Les augmentations les plus importantes du taux d'incidence ont d'ailleurs été observées au Manitoba et au Saskatchewan (des augmentations de 74 % et de 30 %, respectivement). Toutefois, l'augmentation observée au Manitoba serait attribuable en bonne partie à l'utilisation d'un nouveau test diagnostique plus sensible et spécifique depuis juin 2007. Les provinces qui ont contribué le plus, en nombre absolu de cas, à l'augmentation observée

entre 2005 et 2008 sont l'Ontario (4 318 cas de plus en 2008 qu'en 2005), l'Alberta (3 215 cas de plus), le Manitoba (3 079 cas de plus) et le Québec (2 385 cas de plus).

Abstraction faite des régions nordiques du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (où les taux d'incidence en 2008 étaient respectivement de 700,0, 2 010,0 et 4 251,5 par 100 000), les taux d'incidence les plus élevés pour l'année 2008 ont été observés au Manitoba (576,6 par 100 000) et en Saskatchewan (512,1 par 100 000).

L'augmentation des taux d'incidence qui avait été observée entre 1997 et 2004 s'est donc poursuivie, tant chez les hommes que chez les femmes^[1, 2]. Entre 2005 et 2008, les plus fortes augmentations des taux d'incidence ont été observées chez les 25 à 59 ans des deux sexes. Chez les femmes, les augmentations les plus importantes ont été observées chez les 40 à 59 ans (48 %), les 30 à 39 ans (45 %) et les 25 à 29 ans (30 %), respectivement. Chez les hommes, les augmentations les plus importantes ont aussi été observées chez les 40 à 59 ans (26 %), les 30 à 39 ans (24 %) et les 25 à 29 ans (21 %), respectivement.

Chez les femmes, les taux les plus élevés pour l'année 2008 ont été observés parmi les 20 à 24 ans (1 824,3 par 100 000, une augmentation de 19 % par rapport à 2005) ainsi que parmi les 15 à 19 ans (1 651,9 par 100 000, une augmentation de 14,0 % par rapport à 2005).

Chez les hommes, les taux les plus élevés en 2008 ont été observés parmi les 20 à 24 ans (884,2 par 100 000, une augmentation de 20 % par rapport à 2005) ainsi que parmi les 25 à 29 ans (538,7 par 100 000, une augmentation de 21 % par rapport à 2005).

2.2.2 Québec

L'infection génitale à *C. trachomatis* est la maladie à déclaration obligatoire la plus fréquemment observée au Québec. Avec 15 864 cas déclarés en 2009, cette infection représente 49,7 % des 31 919 cas de MADO déclarés pour cette année (figure 1, page 27). Les données préliminaires pour l'année 2010 indiquent que 17 177 infections génitales à *C. trachomatis* ont été observées.

Des cas ont été déclarés dans chacune des 18 régions sociosanitaires du Québec (figures 2 à 20, pages 39 à 57). Le plus grand nombre de cas a été déclaré par la région de Montréal (4 261 des 15 864 cas déclarés en 2009; 27 %). Cette proportion correspond approximativement, selon les estimations de 2009, au poids démographique de la région (24 %; 1 906 811/7 828 879)^[5].

Les régions du Nunavik (2 150,2 par 100 000) et des Terres-Cries-de-la-Baie-James (1 574,3 par 100 000) sont celles qui observaient les taux d'incidence les plus élevés en 2009. Parmi les autres régions, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés pour la Côte-Nord (262,4 par 100 000), l'Outaouais (241,6 par 100 000), le Nord-du-Québec (240,4 par 100 000), l'Estrie (228,5 par 100 000) et la région de Montréal (224,2 par 100 000).

Depuis 2005, le taux d'incidence de l'infection génitale à *C. trachomatis* a diminué dans cinq régions, soit l'Abitibi-Témiscamingue (20 %), la Côte-Nord (20 %), le Bas-Saint-Laurent (13 %), le Nunavik (13 %) et le Nord-du-Québec (6 %). En revanche, une augmentation de l'incidence a été observée dans 12 des 13 autres régions, tout particulièrement dans la Montérégie (54 %), Lanaudière (45 %) et l'Outaouais (40 %).

Le taux d'incidence provincial de l'infection génitale à *C. trachomatis* avait diminué jusqu'en 1997 lorsqu'il avait atteint la valeur minimale de 88,5 par 100 000. La tendance s'est ensuite inversée et, en 2004, le taux avait doublé jusqu'à atteindre 170,5 par 100 000.

Les taux sont restés stables entre 2004 et 2006 (168,2 par 100 000 (12 836 cas) en 2006). Ils ont ensuite augmenté jusqu'à atteindre des valeurs de 175,2 par 100 000 (13 466 cas) en 2007, de 193,7 par 100 000 (15 019 cas) en 2008 et de 203,0 par 100 000 (15 864 cas) en 2009 soit des augmentations respectives de 5 %, 16 % et 21 % par rapport à 2005. Les données préliminaires pour l'année 2010 indiquent un taux d'incidence de 218,0 par 100 000.

Chez les femmes, le taux d'incidence est passé de 239,9 par 100 000 (9 310 cas) en 2007, à 265,3 par 100 000 (10 379 cas) en 2008 et à 277,7 par 100 000 (10 944 cas) en 2009.

Chez les hommes, le taux d'incidence est passé de 107,7 par 100 000 (4 100 cas) en 2007, à 120,2 par 100 000 (4 617 cas) en 2008 et à 126,4 par 100 000 (4 894 cas) en 2009.

Le tableau 3 (page 58) présente la distribution des cas déclarés par âge et région sociosanitaire. Les tableaux 4 et 5 (pages 68 à 87) présentent la même distribution pour chacun des deux sexes, tandis que les tableaux 6 à 8 (pages 88 à 117) reprennent les mêmes données en termes de taux d'incidence.

On constate sur ces tableaux qu'en 2009, les femmes âgées de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans étaient celles qui présentaient les taux d'incidence les plus élevés, soit respectivement 1 668,6 et 1 679,4 par 100 000. Chez les hommes, les 20 à 24 ans présentaient le taux d'incidence le plus élevé en 2009 à 715,2 par 100 000.

Parmi les 15 à 34 ans, groupes d'âge les plus touchés, les augmentations les plus marquées entre 2005 et 2009 ont été observées chez les jeunes de 15 à 19 ans (27 %) et de 20 à 24 ans (28 %). Entre 2005 et 2009, chez les jeunes femmes, le taux d'incidence a augmenté chez les 15 à 19 ans (22 %, de 1 363,8 à 1 668,6 par 100 000) et chez les 20 à 24 ans (24 %, de 1 356,7 à 1 679,4 par 100 000). Chez les jeunes hommes, le taux d'incidence a augmenté chez les 15 à 19 ans (66 %, de 173,7 à 287,6 par 100 000) et chez les 20 à 24 ans (38 %, de 517,5 à 715,2 par 100 000). L'augmentation observée entre 2005 et 2009 est légèrement plus prononcée chez les jeunes hommes.

Les figures 2 à 20 (pages 39 à 57) présentent l'évolution de l'incidence sous forme d'histogrammes, selon le sexe, pour l'ensemble de la province ainsi que pour chacune des régions sociosanitaires. Les figures 21 à 39 (pages 118 à 136) présentent l'évolution des taux d'incidence pour les groupes d'âge les plus atteints, chez les femmes et chez les hommes, pour l'ensemble de la province ainsi que pour chacune des régions sociosanitaires.

Chez les enfants de moins d'un an, entre 2005 et 2009, 29 cas d'infections à *Chlamydia trachomatis* ont été déclarés dans la province de Québec (dix cas génitaux, neuf cas oculaires et dix cas pulmonaires) (tableau 9, page 137). Depuis les 29 cas observés en 1994 (huit cas génitaux, onze cas oculaires et dix cas pulmonaires), le plus faible nombre de cas a été observé en 2008 avec seulement 3 cas (une infection génitale, une infection oculaire et une infection pulmonaire). Cependant, neuf cas ont été observés en 2009 (trois cas pour chacun des sites d'infection). Les tableaux 10 et 11 (page 137) présentent ces mêmes données pour l'ensemble du Québec hors Montréal ainsi que pour la région de Montréal.

2.3 INFECTION GONOCOCCIQUE

2.3.1 Canada

Au Canada, le taux d'incidence de l'infection gonococcique était de 38,2 par 100 000 en 2008, soit une augmentation de 34 % par rapport à 2005 (28,5 par 100 000). En 2008, il était de 42,9 par 100 000 chez les hommes et de 33,5 par 100 000 chez les femmes. Entre 2005 et 2008, l'augmentation du taux d'incidence a été plus importante chez les femmes que chez les hommes (59 % vs 20 %)^[1, 2]. Les données préliminaires montrent que le taux national aurait diminué à 33,1 par 100 000 en 2009 et à 29,6 en 2010 (projections)^[3].

Avant ces récentes diminutions, les taux d'incidence de l'infection gonococcique étaient en augmentation depuis 1997 au Canada^[1]. À l'exception du Québec qui sera traité plus loin, entre 2005 et 2008, les augmentations les plus importantes du taux d'incidence ont été observées pour Terre-Neuve-et-Labrador (de 0,2 par 100 000 à 2,8 par 100 000, 1 317 %), le Nunavut (de 189,9 par 100 000 à 1 154,3 par 100 000, 508 %), l'Île-du-Prince-Édouard (de 1,4 par 100 000 à 5,7 par 100 000, 295 %), les Territoires du Nord-Ouest (de 332,4 par 100 000 à 690,8 par 100 000, 108 %), la Saskatchewan (de 72,8 par 100 000 à 131,3 par 100 000, 80 %) et le Nouveau-Brunswick (de 3,1 par 100 000 à 4,7 par 100 000, 53 %). Les provinces qui ont contribué le plus, en nombre absolu de cas, à l'augmentation observée entre 2005 et 2008 sont le Québec (751 cas de plus en 2008 qu'en 2005), la Saskatchewan (613 cas de plus), l'Ontario (596 cas de plus) et l'Alberta (543 cas de plus)^[2]. Tout récemment, le Nunavut a subi une très forte augmentation de l'incidence de gonorrhée, soit de 476,8 par 100 000 à 1 154,3 par 100 000 entre 2007 et 2008. Les données préliminaires pour 2009 indiquent que cette augmentation se poursuit avec un taux de 1 587,8 par 100 000. Cependant, les données disponibles pour 2009 et 2010 montrent une diminution du taux d'incidence de l'infection gonococcique pour la majorité (8/13) des provinces et territoires (à l'exception de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec, de l'Ontario, du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest)^[3].

En 2008, si on fait abstraction du Nunavut (1 154,3 par 100 000) et des Territoires du Nord-Ouest (690,8 par 100 000), les taux les plus élevés d'infection gonococcique ont été observés au Manitoba (114,1 par 100 000) et en Saskatchewan (131,3 par 100 000)^[1, 2]. Cependant, les données préliminaires pour 2009 et les projections pour 2010 suggèrent une diminution des taux d'incidence pour le Manitoba (à 83,6 par 100 000 en 2009 et à 78,6 par 100 000 en 2010) et le Saskatchewan (à 84,9 par 100 000 en 2009 et à 72,2 par 100 000 en 2010)^[3].

Entre 1997 et 2004, les taux avaient augmenté à la fois chez les femmes et les hommes, mais de façon plus marquée chez ces derniers, en particulier chez les plus de 40 ans. Cependant, entre 2005 et 2008, l'augmentation a touché davantage les femmes de tous les groupes d'âge (des augmentations allant de 18 % chez les 60 ans et plus à 103 % chez les 40 à 59 ans)^[2].

Chez les femmes, les taux les plus élevés pour l'année 2008 ont été observés parmi les 15 à 19 ans (186,6 par 100 000, une augmentation de 59 % par rapport à 2005) ainsi que parmi les 20 à 24 ans (166,3 par 100 000, une augmentation de 56 % par rapport à 2005).

Chez les hommes, les taux les plus élevés en 2008 ont été observés parmi les 20 à 24 ans (165,4 par 100 000, une augmentation de 36 % par rapport à 2005) ainsi que parmi les 25 à 29 ans (122,5 par 100 000, une augmentation de 26 % par rapport à 2005)^[2].

2.3.2 Québec

Évolution de l'incidence

Dix-sept des 18 régions du Québec ont rapporté au moins un cas d'infection gonococcique en 2009 (figures 40 à 58, pages 138 à 156). C'est dans la région de Montréal qu'on en observe le plus, soit 984 des 1 884 cas déclarés en 2009 (52 %). Cette proportion est nettement plus élevée que le poids démographique de la région (24 %; 1 906 811/7 828 879).

Comme pour l'infection génitale à *C. trachomatis* au Québec, les taux d'incidence d'infection gonococcique les plus élevés en 2009 ont été observés dans les régions nordiques (Nunavik à 1 525,9 par 100 000 et Terres-Cries-de-la-Baie-James à 182,9 par 100 000). Viennent ensuite les régions de Montréal, de l'Outaouais et de Laval avec des taux respectifs de 51,8, de 29,7 et de 21,5 par 100 000.

Il est important de rappeler la très forte augmentation du taux d'incidence d'infections gonococciques observée au Nunavik entre 2007 et 2008. Le taux est passé de 537,8 par 100 000 (60 cas) à 1 683,7 par 100 000 (191 cas, 87 femmes/104 hommes) lors de cette période, soit une augmentation de 213 %. Le taux a légèrement diminué à 1 525,9 par 100 000 en 2009.

Le taux d'incidence de l'infection gonococcique a augmenté dans toutes les régions du Québec entre 2005 et 2009. De nombreuses régions ont subi des augmentations de l'incidence de plus de 100 % (les taux ont plus que doublé) entre 2005 et 2009, soit les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean (643 %, de 0,7 à 5,2 par 100 000), du Nunavik (511 %, de 249,9 à 1 525,9 par 100 000), de l'Abitibi-Témiscamingue (468 %, de 2,8 à 15,9 par 100 000), de la Côte-Nord (420 %, de 1,0 à 5,2 par 100 000), des Laurentides (300 %, de 3,5 à 14,0 par 100 000), de Lanaudière (251 %, de 4,7 à 16,5 par 100 000), de l'Outaouais (188 %, de 10,3 à 29,7 par 100 000), du Bas-Saint-Laurent (167 %, de 1,5 à 4,0 par 100 000), des Terres-Cries-de-la-Baie-James (115 %, de 85,0 à 182,9 par 100 000), de la Mauricie et Centre-du-Québec (107 %, de 4,1 à 8,5 par 100 000) et de Chaudière-Appalaches (104 %, de 2,3 à 4,7 par 100 000).

Au Québec (figure 40, page 138), le taux d'incidence de l'infection gonococcique a évolué de façon alarmante au cours des dernières années :

1. Le taux a subi une augmentation importante entre 1998 et 2001 pour ensuite se stabiliser quelques années, jusqu'en 2005.
2. Une forte augmentation a été observée en 2005 et en 2006, le taux étant passé à 16,7 par 100 000, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2005.

Durant cette période, le taux d'incidence a augmenté de façon plus marquée chez les femmes que chez les hommes, soit de 119 % chez les femmes (de 4,3 par 100 000 en 2005 à 9,4 par 100 000 en 2006) comparativement à 23 % chez les hommes (de 19,5 par 100 000 en 2005 à 24,0 par 100 000 en 2006).

3. Le taux a continué d'augmenter de façon constante à 18,3 par 100 000 en 2007, puis à 21,3 par 100 000 en 2008, et finalement à 24,1 par 100 000 en 2009. Les données préliminaires pour l'année 2010 suggèrent que le taux d'incidence de l'infection gonococcique continuera d'augmenter à 26,1 par 100 000.

Chez les femmes en 2009, le nombre de cas déclarés et le taux correspondant étaient de 658 et de 16,7 par 100 000 tandis qu'ils étaient de 1 222 et de 31,6 par 100 000 chez les hommes. Par rapport aux taux de 2005, l'augmentation observée a été beaucoup plus marquée chez les femmes (285 %) que chez les hommes (62 %).

Avec des hausses globales d'au moins 37 % observées chez les 15 à 59 ans entre 2005 et 2009, cette augmentation a touché tous les groupes d'âge chez les deux sexes. Chez les femmes, des augmentations très importantes (plus que le double) ont été observées chez les 15 à 19 ans (269 %, de 24,6 à 90,9 par 100 000), les 20 à 24 ans (295 %, de 23,6 à 93,1 par 100 000), les 25 à 29 ans (331 %, de 9,1 à 39,1 par 100 000), les 30 à 34 ans (265 %, de 5,1 à 18,5 par 100 000), les 35 à 39 ans (148 %, de 3,5 à 8,6 par 100 000), les 40 à 49 ans (490 %, de 0,6 à 3,7 par 100 000) et les 50 à 59 ans (454 %, de 0,2 à 1,0 par 100 000). Chez les hommes, l'augmentation concernait principalement les 15 à 19 ans (126 %, de 18,5 à 41,8 par 100 000) et les 20 à 24 ans (103 %, de 60,9 à 123,9 par 100 000).

Les taux d'incidence observés chez les hommes en 2009 demeurent toujours de deux à dix fois plus élevés que ceux observés chez les femmes, sauf chez les 15 à 24 ans où le ratio hommes/femmes oscille entre 0,5 et 1,3. Le ratio hommes/femmes augmente avec l'âge. En 2009, il était de 2,3 chez les 25 à 29 ans et de 9,9 chez les 50 à 59 ans. En 2005, il était de 5,9 chez les 25 à 29 ans et de 43,2 chez les 50 à 59 ans. Si, en 2005, 81 % des cas déclarés touchaient des hommes, cette proportion n'était que de 65 % en 2009, à cause de l'augmentation plus forte observée chez les femmes.

Le tableau 12 (page 157) présente la distribution des cas déclarés par âge et région sociosanitaire. Les tableaux 13 et 14 (pages 167 à 186) présentent la même distribution pour chacun des deux sexes, tandis que les tableaux 15 à 17 (pages 187 à 216) reprennent les mêmes données en termes de taux d'incidence.

Chez les femmes en 2009, les 15 à 19 ans ainsi que les 20 à 24 ans présentaient les taux les plus élevés, soit de 90,9 et de 93,1 par 100 000, respectivement. Pour les mêmes groupes d'âge, ces taux étaient respectivement de 80,7 et 90,6 par 100 000 en 2008.

Chez les hommes en 2009, les groupes d'âge les plus touchés étaient les 20 à 24 ans et les 25 à 29 ans avec des taux d'incidence de 123,9 et de 88,3 par 100 000, respectivement. Les taux correspondants pour 2008 étaient de 110,4 et de 84,8 par 100 000.

Les figures 40 à 58 (pages 138 à 156) présentent l'évolution de l'incidence sous forme d'histogrammes, selon le sexe, pour l'ensemble de la province ainsi que pour chacune des régions sociosanitaires. Les figures 59 à 77 (pages 217 à 235) présentent l'évolution des taux d'incidence sous forme graphique pour les groupes d'âge les plus atteints, chez les femmes et chez les hommes, pour l'ensemble de la province ainsi que pour chacune des régions sociosanitaires.

Émergence de la résistance à la ciprofloxacine

La résistance de *N. gonorrhoeae* à certains antibiotiques existe depuis une vingtaine d'années en Amérique du Nord. Les résistances à la pénicilline et à la tétracycline sont apparues dans les années 80 et sont devenues tellement courantes qu'on les tient maintenant pour acquises^[6, 7]. L'utilisation de ces deux antibiotiques n'est d'ailleurs plus recommandée de nos jours.

Le programme de surveillance de la résistance aux antibiotiques du LSPQ/INSPQ a permis d'observer les premiers cas québécois de gonocoques résistants à la ciprofloxacine (concentration minimale inhibitrice [CMI] = ≥ 1 mg/L) en 1995^[8, 9].

Dans le cadre du présent programme de surveillance, les taux de résistance rapportés ont pour numérateur le nombre de souches de *N. gonorrhoeae* trouvées et confirmées résistantes à la ciprofloxacine par l'ensemble des laboratoires participant au programme; ils ont pour dénominateur le nombre total de cas rapportés par les laboratoires participants (cas détectés par culture et cas détectés par TAAN). Cette approche sous-estime le taux réel de résistance.

La proportion de souches résistantes à la ciprofloxacine est demeurée sous les 2 % jusqu'en 2003 pour ensuite augmenter à 4 % en 2004, à 17 % en 2005, et atteindre son maximum à 25 % en 2006. La proportion de souches résistantes à la ciprofloxacine a ensuite diminué en 2007, en 2008 et en 2009 (23 %, 10 % et 6 %, respectivement). Les données préliminaires indiquent un nombre plus élevé de souches résistantes en 2010 (190 souches résistantes) comparativement à 2009 (117 souches résistantes).

En 2009, des souches non sensibles à la ciprofloxacine ont été détectées dans neuf des 18 régions du Québec.

Infection gonococcique rectale et pharyngée

Le tableau 18 (page 236) donne le détail de la distribution des cas d'infections gonococciques déclarés chez les hommes par site d'infection. Entre 30 et 60 cas d'infection pharyngée sont déclarés chaque année depuis 2001, soit environ 5 % des cas totaux.

Le nombre d'infections rectales a quant à lui augmenté de façon notable lorsqu'il est passé de 47 cas déclarés en 2001 à 106 cas en 2009. La proportion de ces cas parmi l'ensemble de cas caractérisés est passée de 7,5 % en 2001 à 9,6 % en 2009.

La plupart des infections rectales (92 %; 97/106) et pharyngées (90 %; 54/60) déclarées en 2009 l'ont été dans la région de Montréal.

2.4 SYPHILIS

2.4.1 Classification des cas

Au Québec, les infections syphilitiques chez l'adulte peuvent être déclarées selon huit catégories différentes. La classification des cas selon la présentation clinique étant très complexe, le risque d'erreur est important. L'interprétation des données doit tenir compte de cette limite.

Les syphilis dites « infectieuses » sont les cas d'infection :

- primaires;
- secondaires;
- latentes précoces (de moins d'un an).

Les syphilis dites « non infectieuses » sont les cas d'infection :

- latentes d'un an ou plus;
- neurologiques (asymptomatiques);
- cardiovasculaires;
- neurologiques (symptomatiques);
- symptomatiques tardives.

À cela s'ajoutent :

- les quatre cas de syphilis congénitales déclarés depuis 1994. Un cas récent a été déclaré en début d'année 2011, les derniers remontant à 2003;
- les quatre cas de « syphilis sous autre forme » (type ajouté au système MADDO en 2003);
- les cas de syphilis de type non précisé. Entre un et 10 cas ont été déclarés de 1994 à 2003, 41 en 2004 et 30 en 2005. Le nombre de cas de type non précisé a beaucoup augmenté entre 2004 et 2008. Leur proportion parmi l'ensemble des cas de syphilis augmente aussi progressivement. Ces proportions étaient de 3 % en 2000 (un des 33 cas déclarés), de 11 % en 2007 (42/393), de 13 % en 2008 (84/636) et de 21 % en 2009 (131/637).

Au cours des années 2005 à 2009 inclusivement, 2 656 cas de syphilis ont été déclarés. C'est un nombre de cas beaucoup plus élevé comparativement à la période des cinq années précédentes (2000 à 2004 inclusivement), alors que 847 cas avaient été déclarés. Parmi les cas répertoriés entre 2005 et 2009, 608 étaient des syphilis non infectieuses, 1 633 étaient des syphilis infectieuses, 412 étaient des syphilis de type non précisé et trois étaient des syphilis sous autre forme. Nous traiterons de la syphilis infectieuse en premier lieu.

2.4.2 Syphilis infectieuse

Canada

Depuis 1997, une flambée épidémique a été observée au Québec, mais aussi à Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa et au territoire du Yukon. Au Canada, le taux d'incidence de la syphilis était de 4,2 par 100 000 en 2008, soit une augmentation de 27 % par rapport à 2005 (3,3 par 100 000). En 2008, il était de 7,3 par 100 000 chez les hommes et de 1,1 par 100 000 chez les femmes^[2]. Les données préliminaires disponibles montrent que le taux national aurait augmenté à 5,0 par 100 000 pour les deux années 2009 et 2010 (projections)^[3].

À l'exception du Québec qui sera traité plus loin, entre 2005 et 2008, les augmentations les plus importantes du taux d'incidence ont été observées pour les Territoires du Nord-Ouest (de 0,0 à 122,4 par 100 000, 53 cas), le Nouveau-Brunswick (de 0,1 à 1,5 par 100 000, 1 006 %), la Saskatchewan (de 0,2 à 1,2 par 100 000, 485 %), Terre-Neuve-et-Labrador (de 0,4 à 1,6 par 100 000, 305 %), la Nouvelle-Écosse (de 0,2 à 0,4 par 100 000, 100 %) et l'Alberta (de 4,1 à 6,8 par 100 000, 64 %). Les provinces qui ont contribué le plus, en nombre absolu de cas, à l'augmentation observée entre 2005 et 2008 sont le Québec (124 cas de plus en 2008 qu'en 2005), l'Alberta (108 cas de plus), l'Ontario (84 cas de plus) et les Territoires du Nord-Ouest (53 cas de plus)^[2].

Sans compter les Territoires du Nord-Ouest, les taux les plus élevés au Canada en 2008 ont été observés en Alberta (6,8 par 100 000), en Colombie-Britannique (5,4 par 100 000) au Québec (4,7 par 100 000) et en Ontario (3,4 par 100 000)^[2]. L'éclosion très importante de syphilis observée aux Territoires du Nord-Ouest entre 2007 et 2008 semble maintenant sous contrôle car les taux d'incidence préliminaires montrent une diminution à 94,4 par 100 000 en 2009 et à 32,2 par 100 000 en 2010. Cependant, plusieurs autres provinces présentent plutôt des données préliminaires inquiétantes pour 2009 et 2010, soit des augmentations à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, à Québec, en Ontario et au Manitoba^[3].

Les taux d'incidence avaient augmenté de façon importante chez les deux sexes entre 1997 et 2004, mais de façon beaucoup plus marquée chez les hommes que chez les femmes. Entre 2005 et 2008, une légère augmentation des taux d'incidence a de nouveau été observée chez les deux sexes. Chez les hommes, les taux sont passés de 5,6 par 100 000 en 2005 à 7,3 par 100 000 en 2008, soit une augmentation de 29 %. Chez les femmes, les taux sont passés de 1,0 par 100 000 en 2005 à 1,1 par 100 000 en 2008, soit une modeste augmentation de 13 %^[2].

En 2008, 86 % (1 200 cas) de tous les cas (1 394) de syphilis infectieuse ont été déclarés chez des hommes et 63 % (876/1 394) l'ont été chez des hommes de 30 à 59 ans^[2].

Québec

Le taux d'incidence provincial de syphilis infectieuse diminuait depuis plusieurs années quand a éclaté la flambée épidémique actuelle chez les HARSAH (figure 78, page 237).

On constate aux figures 79 à 96 (pages 238 à 255) que l'épidémie a débuté à la fin de 2000 dans la région de Montréal et s'est par la suite étendue aux autres régions du Québec. En 2009, 16 des 18 régions sociosanitaires ont déclaré des cas. C'est davantage qu'en 2008, lorsque 9 des 18 régions sociosanitaires avaient déclaré des cas

Le tableau 19 (page 256) présente la distribution des cas déclarés par âge et région sociosanitaire. Les tableaux 20 et 21 (pages 266 à 285) présentent la même distribution pour chacun des deux sexes tandis que les tableaux 22 à 24 (pages 286 à 315) reprennent les mêmes données en termes de taux d'incidence.

En 2009, Montréal restait la région où étaient déclarés la majorité des cas (227/371, 61 %). C'est beaucoup plus que ne le laissait présager le poids démographique de la région (24 %; 1 906 811/7 828 879). Le taux d'incidence pour la région de Montréal en 2009 était de 11,9 par 100 000 (23,3 par 100 000 chez les hommes et 0,9 par 100 000 chez les femmes). Il était de 5,7 par 100 000 dans la région de Québec (39 hommes et aucune femme) et de 4,7 par 100 000 pour l'ensemble de la province (353 hommes, 17 femmes et un individu de sexe inconnu). Les hommes représentaient donc 95 % (353/371) des cas déclarés en 2009 dans la province. Les données préliminaires pour l'année 2010 indiquent une hausse importante du taux provincial à 6,6 par 100 000.

De 0,1 par 100 000 (seulement deux cas) en 1998, le taux chez les hommes est passé à 9,8 par 100 000 en 2006 avec 372 cas. Durant le même intervalle, le taux est passé de 0,0 à 0,2 par 100 000 (six cas) chez les femmes. Le nombre de cas de syphilis infectieuse continue de fluctuer chez les hommes avec 241 cas observés en 2007 (6,3 par 100 000), 370 cas en 2008 (9,6 par 100 000) et 353 cas en 2009 (9,1 par 100 000). Les données préliminaires pour 2010 montrent une forte hausse chez les hommes avec 492 cas déclarés (12,6 par 100 000).

Le nombre de cas chez les femmes est demeuré relativement stable entre 2005 et 2008 (entre six et huit cas par année), mais a augmenté en 2009 (17 cas) et en 2010 (24 cas, données préliminaires).

Les figures 79 à 96 (pages 238 à 255) présentent l'évolution de l'incidence sous forme d'histogrammes, selon le sexe, pour l'ensemble de la province ainsi que pour chacune des régions sociosanitaires. Les figures 97 à 100 (pages 316 à 319) présentent l'évolution des taux d'incidence sous forme graphique pour les groupes d'âge les plus atteints, chez les femmes et chez les hommes, pour l'ensemble de la province ainsi que pour les régions ayant observé un nombre relativement élevé de cas (Québec, Montréal et Montérégie).

Dans le rapport 2001-2006^[10], les taux les plus élevés avaient été observés chez les hommes de 30 à 49 ans. Depuis 2005, les taux sont demeurés plutôt stables chez les hommes de 35 à 49 ans. L'augmentation récente des taux chez les 15 à 34 ans suggère que les hommes plus jeunes seraient davantage touchés qu'auparavant. En effet, chez les hommes, entre 2005 et 2009, les taux d'incidence de la syphilis infectieuse ont augmenté chez les 15 à 19 ans (727 %, de 0,4 à 3,5 par 100 000), chez les 20 à 24 ans (150 %, de 5,0 à 12,5 par 100 000), chez les 25 à 29 ans (100 %, de 6,8 à 13,6 par 100 000) et chez les

30 à 34 ans (68 %, de 11,2 à 18,8 par 100 000). L'augmentation observée chez les 50 à 59 ans mérite également d'être mentionnée (70 %, de 6,2 à 10,5 par 100 000).

Les taux les plus élevés ont été observés chez les hommes de 30 à 34 ans (18,8 par 100 000), les 40 à 49 ans (18,5 par 100 000), les 35 à 39 ans (14,3 par 100 000) et les 20 à 24 ans (12,5 par 100 000). En 2009, plus de la moitié des cas masculins ont été déclarés chez les 40 ans et plus (188/353, 53 %).

2.4.3 Syphilis non infectieuse

Les données présentées pour la syphilis non infectieuse sont exprimées en nombre de cas plutôt qu'en taux d'incidence. Le taux d'incidence est une mesure du rythme de propagation alors que des taux calculés pour la syphilis non infectieuse représenteraient plutôt une mesure du rythme de leur détection. Ces taux n'ont donc pas été calculés.

La catégorie syphilis non infectieuses comprend les syphilis latentes tardives de plus d'un an et les cas de syphilis avec atteinte d'organes cibles comme le système nerveux (neurosyphilis), le cœur (syphilis cardiovasculaire) ou les os (syphilis symptomatique tardive). Bien que les syphilis non infectieuses n'aient que peu d'impact sur la propagation de l'infection, elles sont par contre une cause importante de complications.

L'augmentation récente du nombre de cas de syphilis infectieuse pourrait éventuellement avoir comme conséquence une recrudescence des cas de syphilis non infectieuse détectés tardivement. Certains cas de syphilis infectieuse ne sont pas détectés, soit parce que les personnes atteintes n'ont pas consulté ou parce que le bon diagnostic n'a pas été établi (ex. : confusion entre une syphilis primaire et une ulcération génitale herpétique, confusion entre une syphilis secondaire et une autre infection virale pouvant donner un *rash*). Ces cas sont alors susceptibles de développer des complications et d'être détectés tardivement.

L'augmentation à prévoir du nombre de cas de syphilis non infectieuse provoquera un accroissement du nombre de complications médicales associées à cette infection. D'ailleurs, une légère augmentation du nombre de cas de syphilis non infectieuse a effectivement été observée ces dernières années. De 89 cas détectés en 2005 dans la province, nous sommes passés à 111 cas en 2006, 101 cas en 2007, 173 cas en 2008 et 134 cas en 2009. Les données préliminaires pour l'année 2010 indiquent que 99 cas ont été déclarés.

Les tableaux 25 à 27 (pages 320 à 349) présentent la distribution des cas observés de syphilis non infectieuse.

3 DISCUSSION

3.1 LIMITES ET PORTÉE DE L'ANALYSE

Malgré la puissance d'analyse que donne le grand nombre de cas déclarés, le système de surveillance passif des MADO a ses limites. Comme par le passé, nous soulignons au lecteur que l'interprétation des tendances qu'on dégage du système MADO doit tenir compte de plusieurs facteurs, dont :

- la disponibilité régionale des nouveaux tests de détection;
- les activités régionales de prévention et de promotion de la santé;
- la sous-déclaration d'ITS asymptomatiques, particulièrement dans le cas de l'infection génitale à *C. trachomatis*;
- l'évolution des pratiques médicales et des procédures de dépistages;
- l'application des définitions nosologiques;
- les changements dans les procédures régionales de saisie, de validation et de nettoyage des données.

La vérification systématique de la validité des cas déclarés et l'évaluation de la sous-déclaration permettraient de mesurer l'ampleur de certains de ces biais potentiels.

Même s'il sous-estime l'ampleur des problèmes, le système de déclaration permet malgré tout de mieux les cerner et d'en suivre l'évolution.

4 CONCLUSION

Le tableau ci-dessous permet de comparer les taux d'incidence des principales ITS bactériennes observés au Québec à ceux observés au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Si les taux d'incidence de l'infection génitale à *C. trachomatis* et de l'infection gonococcique observés sur notre territoire sont légèrement plus bas que ceux observés au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, celui de la syphilis infectieuse est somme toute similaire.

Taux d'incidence des infections à *C. trachomatis*, des infections gonococcique et de la syphilis infectieuse primaire et secondaire au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis en 2008 (taux d'incidence de 2009 pour le Québec)

	Taux par 100 000 habitants				
	Canada	Australie	Royaume-Uni	États-Unis	Québec
Infection à <i>C. trachomatis</i>	248,9	273,8	201,8	401,3	203,0
Infection gonococcique	38,2	35,9	27,3	111,6	24,1
Syphilis infectieuse	4,2	6,1	4,1	4,5	4,7

Tableau adapté de Jayaraman et collab. (2010)^[1]. Consulter la référence pour des précisions méthodologiques sur les définitions de cas.

L'augmentation de l'incidence de l'infection génitale à *C. trachomatis* observée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie au cours des dernières années ne semble toujours pas vouloir se stabiliser^[11-13]. Une situation similaire est observée dans plusieurs pays de l'Union européenne, particulièrement dans les pays nordiques tels que la Norvège, le Danemark, l'Islande et la Suède où les taux d'incidence de l'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* ne cessent d'augmenter et se situent à des niveaux très élevés, soit entre 450 et 580 par 100 000^[14]. Au Canada et au Québec, l'incidence de l'infection génitale à *C. trachomatis* a plus que doublé depuis 1997 et continue d'augmenter. D'autre part, l'épidémie de lymphogranulomatose vénérienne, qui semblait s'être stabilisée en 2007 et 2008, est revenue de plus belle en 2009 et 2010.

Aux États-Unis, le taux d'incidence de l'infection gonococcique est stable depuis la fin des années 90 dans la population générale^[15]. Au Québec, approximativement 60 % des infections gonococciques étaient retrouvées chez des HARSAH lors de l'exercice de vigie intensifiée mené entre juin 2005 et mai 2006^[16]. En Australie, cette infection est en légère augmentation avec des taux élevés d'environ 37 par 100 000^[12]. Au Royaume-Uni, les taux sont stables et tendent même à diminuer^[13]. Au Québec, l'incidence de l'infection gonococcique demeure en progression rapide, ce qui est très préoccupant. La recrudescence observée depuis 2005 est surtout observée chez les femmes et le ratio hommes/femmes tend à diminuer, en particulier chez les plus jeunes. Ces données suggèrent que cette infection, qui était auparavant observée surtout chez les HARSAH, se transmet maintenant davantage via les contacts hétérosexuels, en particulier chez les 15 à 24 ans.

Des épidémies de syphilis infectieuse ont été observées dans plusieurs pays dont la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, la Norvège^[17], les États-Unis^[15] et dans cinq provinces et territoires canadiens, dont le Québec^[18]. L'incidence de la syphilis infectieuse au Québec demeure à un niveau très inquiétant et justifie une surveillance très attentive, d'autant plus qu'un cas de syphilis congénitale a été déclaré au début de 2011 après plusieurs années sans aucun cas. Connaissant les conséquences dramatiques de cette infection chez le nouveau-né, il est impératif de l'éliminer complètement.

La proportion de souches de *N. gonorrhoeae* résistantes à la ciprofloxacine est en diminution dans la province. Cette baisse pourrait être en partie expliquée par l'augmentation de l'utilisation du TAAN pour le diagnostic, diminuant ainsi le nombre de souches testées. La récente réduction de l'utilisation de la ciprofloxacine pour le traitement des infections gonococciques pourrait également expliquer une partie de ce phénomène^[19, 20].

Au Canada, les augmentations récentes observées dans les taux d'ITS bactériennes touchent de façon particulièrement importante les adultes d'âge moyen, bien que les jeunes demeurent les plus fortement touchés. Une analyse récente publiée par l'Agence de la santé publique du Canada explique cette hausse chez les Canadiens d'âge moyen par des changements sociaux tels que les séparations plus nombreuses ainsi que la disponibilité des drogues récréatives et de substances pour traiter la dysfonction érectile^[21].

Plusieurs facteurs pourraient contribuer à l'augmentation récente de l'incidence des ITS, par exemple l'augmentation de la fréquence des dépistages (méthodes moins invasives), l'abandon ou la non-adoption des comportements sexuels sécuritaires, l'essoufflement des comportements préventifs chez les HARSAH^[22, 23], l'utilisation de drogues telles que les amphétamines et de médicaments tels que le Viagra^[24, 26], les nouvelles réalités de réseautage telles la recherche de partenaires sexuels à l'aide du réseau Internet^[27] et la banalisation du sida depuis l'avènement des traitements antirétroviraux hautement efficaces^[28, 29].

L'un des facteurs impliqués dans la diminution des taux d'incidence de la syphilis infectieuse dans les années 90 pourrait être la mortalité causée par le sida à cette époque^[30, 31]. Jusqu'à l'apparition des thérapies hautement efficaces contre le VIH en 1996, les personnes infectées par le VIH mouraient relativement rapidement du sida et de ses maladies associées. Le bassin d'individus à risque susceptibles de contracter des ITS s'en est trouvé alors fortement réduit. Une partie de la recrudescence de syphilis infectieuse observée ces dernières années pourrait donc être expliquée par une diminution de la mortalité chez les personnes infectées par le VIH.

Avec l'augmentation de l'incidence des ITS bactériennes, les coïnfections (la présence simultanée d'au moins deux agents infectieux chez un même individu) risquent d'être plus fréquentes. Le phénomène de coïnfection peut avoir de graves conséquences, soit augmenter la transmissibilité des agents infectieux, accélérer le développement des pathologies ou en augmenter la gravité. Par exemple, la personne atteinte par le VIH est biologiquement plus susceptible de contracter une autre ITS et, inversement, la personne atteinte d'une ITS est biologiquement plus susceptible de contracter le VIH.

Une augmentation de la prévalence des ITS bactériennes pourrait ainsi favoriser une augmentation de l'incidence du VIH^[32].

Il est clair que les ITS bactériennes représentent un fardeau non négligeable d'un point de vue de santé publique, non seulement au Québec, mais également ailleurs au Canada et dans le monde. Les efforts de surveillance et de prévention de la transmission des ITS doivent être maintenus.

5 BIBLIOGRAPHIE


1. Jayaraman, G., *et al.*, *Rapport sur les infections transmissibles sexuellement au Canada : 2008*. 2010, Agence de la santé publique du Canada: Ottawa. p. 36.
2. Agence de la santé publique du Canada. *Tableaux de données sur les ITSS*. 2010 2010-01-11 [consulté le 2010-10-04; repéré à : http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its_tab/index-fra.php].
3. Agence de santé la publique du Canada. *Cas déclarés de ITS à déclaration obligatoire du 1^{er} janvier au 30 juin 2009 et du 1^{er} janvier au 30 juin 2010 et leurs taux annuels correspondants du 1^{er} janvier au 31 décembre 2009 et 2010*. 2010 2010-10-13 [consulté le 2010-04-11; repéré à : <http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/stdcases-casmts/index-fra.php>].
4. Lambert, G., L. Ringuette, and S. Minzunza, *Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec – Année 2008 (et projections 2009)*. 2009, ministère de la Santé et des Services sociaux: Québec. p. 97.
5. Institut de la statistique du Québec. *Population selon le groupe d'âge et le sexe, Montréal et ensemble du Québec, 1996, 2001 et 2006-2010*. 2010 2011-02-03 [consulté le 2010-11-04; repéré à : http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil06/societe/demographie/demo_gen/pop_age06.htm].
6. CDC, Epidemiologic notes and report Penicillinase-producing *Neisseria gonorrhoeae* - Los Angeles. *MMWR*, 1983. 32: p. 181-183.
7. Greco, V., *et al.*, Molecular epidemiology of *Neisseria gonorrhoeae* isolates with plasmid-mediated tetracycline resistance in Canada: temporal and geographical trends (1986-1997). *Microb Drug Resist*, 2003. 9(4): p. 353-60.
8. Ringuette, L., *et al.*, Emergence of *Neisseria gonorrhoeae* strains with decreased susceptibility to ciprofloxacin--Quebec, 1994-1995. *Can Commun Dis Rep*, 1996. 22(15): p. 121-4; discussion 124-5.
9. Clinical and Laboratory Standards Institute, *CLSI Performance standards for antimicrobial susceptibility testing: Sixteenth Informational Supplement*. 2007, Clinical and Laboratory Standards Institute: Wayne.
10. Parent, R., *Analyse des cas déclarés d'infection génitale à chlamydia trachomatis, d'infection gonococcique et de syphilis au Québec par année civile 2001-2006*. 2007, Institut national de santé publique du Québec: Québec. p. 255.
11. CDC. 2008 Sexually Transmitted Diseases Surveillance - Table 1. Cases of sexually transmitted diseases reported by state health departments and rates per 100,000 population: United States, 1941-2008. 2009 2009-11-16 [consulté le 2010-11-11; repéré à : <http://www.cdc.gov/std/stats08/tables/1.htm>].

12. Australian Government and Department of Health and Ageing. *National Notifiable Diseases Surveillance System: Notifications of a selected disease by age group, sex, and year*. 2009 [consulté le 2009-10-19]; repéré à : http://www9.health.gov.au/cda/Source/Rpt_5_sel.cfm.
13. Health Protection Agency. STI Annual Data Tables - Table 5: Number and rates of selected STI diagnoses made at genitourinary medicine clinics by gender and age group in the UK, England and English SHA's: 2005-2009. 2010 [consulté le 2010-11-11]; repéré à : http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1247816547927.
14. WHO. Centralized information system for infectious diseases (CISID) - Sexually transmitted infections. 2010 [consulté le 2010-11-11]; repéré à : <http://data.euro.who.int/cisid/?TabID=260966>.
15. CDC. Sexually Transmitted Diseases Surveillance, 2007 - Table 1. Cases of sexually transmitted diseases reported by state health departments and rates per 100,000 population: United States, 1941–2007. 2007 2009-01-13 2009-11-02]; repéré à : <http://www.cdc.gov/std/stats07/tables/1.htm>.
16. Lambert, G., L. Ringuette, and S. Minzunza, Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec – Année 2007 (et projections 2008). 2008, ministère de la Santé et des Services sociaux : Montréal. p. 82.
17. Fenton, K.A. and C.M. Lowndes, Recent trends in the epidemiology of sexually transmitted infections in the European Union. *Sex Transm Infect*, 2004. 80(4): p. 255-63.
18. Agence de la santé publique du Canada. Les Tableaux de données sur les ITS. 2007 2009-06-23 2009-11-02]; repéré à : http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its_tab/index-fra.php.
19. Jetté, L., B. Lefebvre, and A.-M. Bourgault, Surveillance des souches de *Neisseria gonorrhoeae* résistantes aux antibiotiques dans la province de Québec – Rapport 2008. 2009, Laboratoire de santé publique du Québec : Ste-Anne-de-Bellevue. p. 17.
20. Fournier, B., *et al.*, Augmentation du nombre de souches de *Neisseria gonorrhoeae* résistantes aux fluoroquinolones au Québec. 2007, Table de concertation nationale en maladies infectieuses - Groupe de travail pour le contrôle de l'infection gonococcique: Montréal. p. 52.
21. Fang, L., *et al.*, Trends in age disparities between younger and middle-age adults among reported rates of chlamydia, gonorrhea, and infectious syphilis infections in Canada: findings from 1997 to 2007. *Sex Transm Dis*, 2010. 37(1): p. 18-25.
22. Wolitski, R.J., *et al.*, Are we headed for a resurgence of the HIV epidemic among men who have sex with men? *Am J Public Health*, 2001. 91(6): p. 883-8.
23. Stockman, J.K., *et al.*, HIV prevention fatigue among high-risk populations in San Francisco. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2004. 35(4): p. 432-4.

24. Wong, W., *et al.* Risk factors for early syphilis among men who have sex with men seen in an STD clinic, San Francisco 2002–2003. In Program and abstracts of the 2004 national STD prevention conference. 2004. Philadelphia.
25. Paz-Bailey, G., *et al.*, A case-control study of syphilis among men who have sex with men in New York City: association With HIV infection. *Sex Transm Dis*, 2004. 31(10): p. 581-7.
26. Golden, M.R., *et al.*, Importance of sex partner HIV status in HIV risk assessment among men who have sex with men. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2004. 36(2): p. 734-42.
27. Rietmeijer, C.A. and M. McFarlane, Web 2.0 and beyond: risks for sexually transmitted infections and opportunities for prevention. *Curr Opin Infect Dis*, 2009. 22(1): p. 67-71.
28. Katz, M.H., *et al.*, Impact of highly active antiretroviral treatment on HIV seroincidence among men who have sex with men: San Francisco. *Am J Public Health*, 2002. 92(3): p. 388-94.
29. Crepaz, N., T.A. Hart, and G. Marks, Highly active antiretroviral therapy and sexual risk behavior: a meta-analytic review. *Jama*, 2004. 292(2): p. 224-36.
30. Chesson, H.W., T.S. Dee, and S.O. Aral, AIDS mortality may have contributed to the decline in syphilis rates in the United States in the 1990s. *Sex Transm Dis*, 2003. 30(5): p. 419-24.
31. Boily, M.C., *et al.*, Changes in the transmission dynamics of the HIV epidemic after the wide-scale use of antiretroviral therapy could explain increases in sexually transmitted infections: results from mathematical models. *Sex Transm Dis*, 2004. 31(2): p. 100-13.
32. HIV prevention through early detection and treatment of other sexually transmitted diseases - United States. Recommendations of the Advisory Committee for HIV and STD prevention. *MMWR Recomm Rep*, 1998. 47(RR-12): p. 1-24.

TABLEAUX ET FIGURES

Figure 1 Proportion du nombre de cas selon la catégorie de maladie, province de Québec, 2009



Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (2010), SDI (1993-2006), ISQ (2006-2009). Population type sur 2006.

¹ : Le VIH, le sida et l'herpès néonatal ne sont plus à déclaration obligatoire depuis le 19 novembre 2003.

* : L'hépatite Delta a été ajouté en juin 2005

* : Le VIH si seulement donné/reçu du sang/organes/... ainsi que la syphilis tertiaire et autres formes ont été ajoutés le 19 novembre 2005.

* : Ces données incluent toutes les déclarations, mêmes celles où la région est hors Québec

Tableau 1 Caractéristiques des cas déclarés d'ITS* selon l'âge et le sexe, province de Québec, 2005-2009

Nombre de cas déclarés pour lesquels l'âge du patient est connu	95 262	(99,6 %)
Nombre de cas déclarés pour lesquels le sexe du patient est connu	95 679	(100,0 %)
Nombre de cas déclarés chez les hommes	38 746	(40,5 %)
Hommes d'âge connu	38 611	(40,4 %)
Nombre de cas déclarés chez les femmes	56 476	(59,0 %)
Femmes d'âge connu	56 328	(58,9 %)
Âge médian (moyen) des cas déclarés chez les femmes	21 ans	(22,6 ans)
Âge médian (moyen) des cas déclarés chez les hommes	25 ans	(28,4 ans)

* Les infections à *Chlamydia trachomatis*, les infections gonococciques, la syphilis, la lymphogranulomatose vénérienne, le granulome inguinal et le chancre mou ont été considérés.

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Ensemble du Québec*												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2005	0	0	0	1	3	4	5	8	4	0	0	25
2006	0	0	0	5	2	6	6	21	4	0	0	44
2007	0	0	0	0	2	0	1	6	1	0	0	10
2008	0	0	0	2	1	0	1	3	1	0	0	9
2009	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Ensemble du Québec hors Montréal												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	6
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	6
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Montréal-Centre												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2005	0	0	0	1	3	4	5	7	4	0	0	24
2006	0	0	0	5	2	5	5	17	4	0	0	38
2007	0	0	0	0	2	0	1	6	1	0	0	10
2008	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
2009	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Nord-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Chaudière-Appalaches												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Lanaudière												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)


Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Montérégie												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 2 Nombre de cas déclarés de lymphogranulomatose vénérienne selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Figure 2 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, province de Québec*, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	5 827	5 276	5 001	4 802	5 240	5 817	6 468	7 285	7 990	8 826	9 217	8 925	8 989	9 310	10 379	10 944
Hommes	2 058	1 750	1 635	1 620	1 969	2 134	2 199	2 860	3 048	3 437	3 616	3 745	3 807	4 100	4 617	4 894
Inconnu	11	11	8	14	14	18	18	23	27	22	15	30	40	56	23	26
Total	7 896	7 037	6 644	6 436	7 223	7 969	8 685	10 168	11 065	12 285	12 848	12 700	12 836	13 466	15 019	15 864

* : Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 3 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Bas-Saint-Laurent, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	137	132	97	118	144	96	93	116	140	166	155	179	146	129	142	168
Hommes	79	74	66	64	104	50	47	74	85	127	101	124	105	81	94	95
Inconnu	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Total	216	206	163	182	248	146	141	190	232	293	256	303	251	210	236	263

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 4 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	303	280	273	194	203	244	252	224	286	307	324	279	271	283	269	294
Hommes	109	90	81	72	70	83	87	75	101	105	122	109	120	129	103	126
Inconnu	3	3	5	5	3	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0
Total	415	373	359	271	276	327	339	302	387	412	447	388	391	412	372	420

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 5 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Québec, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	548	414	413	471	533	592	578	714	700	862	900	844	878	823	891	963
Hommes	199	148	158	177	211	222	222	325	303	389	372	385	388	384	427	400
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	0	2	1	3
Total	747	562	571	648	744	814	800	1 040	1 004	1 252	1 275	1 230	1 266	1 209	1 319	1 366

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 6 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	352	271	317	253	315	288	370	433	532	654	732	687	689	648	707	698
Hommes	145	126	95	88	139	105	141	191	217	237	318	339	325	326	341	353
Inconnu	0	0	0	0	2	6	6	1	0	0	2	2	1	1	0	1
Total	497	397	412	341	456	399	517	625	749	891	1 052	1 028	1 015	975	1 048	1 052

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 7 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Estrie, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	216	239	234	202	198	229	269	307	347	402	419	393	339	357	452	510
Hommes	83	73	69	75	97	97	107	131	148	172	175	178	143	150	187	190
Inconnu	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Total	299	312	303	277	296	326	376	438	495	574	594	571	482	508	639	700

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 8 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Montréal, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	1 338	1 328	1 262	1 338	1 487	1 765	1 929	2 151	2 246	2 416	2 298	2 264	2 373	2 400	2 706	2 715
Hommes	458	435	444	481	568	703	633	902	969	1 019	927	1 058	1 106	1 313	1 486	1 528
Inconnu	5	7	3	8	7	11	9	17	19	21	9	27	35	48	17	18
Total	1 801	1 770	1 709	1 827	2 062	2 479	2 571	3 070	3 234	3 456	3 234	3 349	3 514	3 761	4 209	4 261

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 9 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Outaouais, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	311	271	228	187	220	278	279	349	384	373	424	422	420	506	554	632
Hommes	68	60	50	50	59	72	92	120	134	122	136	167	165	199	235	231
Inconnu	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	379	331	278	237	279	350	372	469	518	495	560	589	585	705	789	863

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 10 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	266	204	208	171	147	127	205	188	222	229	223	236	246	252	226	182
Hommes	95	81	71	47	49	46	47	49	69	75	82	96	68	88	73	85
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	361	285	279	218	196	173	252	237	291	304	305	332	314	340	299	267

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 11 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Côte-Nord, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	227	223	198	146	173	205	172	168	187	206	233	229	193	236	212	201
Hommes	74	65	63	66	55	62	67	38	61	70	96	87	66	69	57	49
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	301	288	261	212	228	267	239	206	248	276	329	316	259	305	269	250

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 12 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Nord-du-Québec, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	25	28	15	10	12	15	12	9	21	27	31	29	25	23	11	27
Hommes	17	6	8	3	1	7	4	7	5	8	9	10	5	6	2	8
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	42	34	23	13	13	22	16	16	26	35	40	39	30	29	13	35

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 13 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	79	62	60	42	22	20	44	62	70	85	109	84	80	74	73	98
Hommes	29	18	10	14	9	3	16	25	25	30	23	24	27	24	32	34
Inconnu	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	3	1
Total	109	80	70	56	31	23	60	88	95	115	132	108	110	99	108	133

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 14 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	165	115	160	145	171	161	188	211	215	240	286	288	264	250	236	288
Hommes	65	46	59	66	60	66	77	94	104	128	141	130	131	102	120	166
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	230	161	219	211	231	227	265	305	319	368	427	418	395	352	356	454

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 15 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Laval, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	199	164	132	186	200	212	274	284	351	360	409	417	408	458	507	511
Hommes	81	70	50	47	84	88	101	118	132	150	174	179	195	195	253	247
Inconnu	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	282	235	182	233	284	300	375	402	483	510	583	596	603	653	760	758

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 16 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Lanaudière, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	234	169	177	220	187	292	297	278	304	388	412	451	496	493	670	656
Hommes	88	60	61	51	66	107	90	122	98	121	136	129	187	178	211	255
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	322	229	238	271	253	399	387	400	402	509	548	580	683	671	881	911

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 17 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Laurentides, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	353	331	296	273	297	300	387	498	603	642	676	634	612	674	763	865
Hommes	138	108	86	62	95	101	118	150	184	224	259	242	246	247	271	328
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
Total	491	439	382	335	392	401	505	648	787	866	935	876	859	922	1 036	1 195

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 18 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Montérégie, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	758	736	587	586	650	726	873	969	1 009	1 127	1 232	1 140	1 184	1 345	1 566	1 785
Hommes	278	233	193	182	217	241	281	339	314	359	433	382	419	481	570	661
Inconnu	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1 036	969	780	769	868	968	1 155	1 308	1 323	1 486	1 665	1 522	1 603	1 826	2 136	2 447

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 19 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Nunavik, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	217	206	261	194	160	191	185	246	289	216	209	194	201	194	220	175
Hommes	49	49	64	65	71	75	66	88	81	78	74	73	69	87	95	73
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Total	266	255	325	259	231	266	251	334	370	294	283	267	270	283	315	248

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 20 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le sexe, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	99	103	83	66	121	76	61	78	84	126	145	155	164	165	174	176
Hommes	3	8	7	10	14	6	3	12	18	23	38	33	42	41	60	65
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	102	111	90	76	135	82	64	90	102	149	183	188	206	206	234	241

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Ensemble du Québec*												
1994	13	116	2 663	2 600	1 153	596	327	243	45	17	0	7 896
1995	8	82	2 317	2 520	1 046	519	226	175	37	13	0	7 037
1996	4	71	2 152	2 401	939	503	229	182	52	11	0	6 644
1997	4	71	2 139	2 284	944	434	239	154	36	11	0	6 436
1998	8	83	2 315	2 667	1 086	509	269	137	42	12	0	7 223
1999	4	76	2 587	2 990	1 165	542	276	203	43	8	0	7 969
2000	2	93	2 840	3 280	1 266	530	313	212	58	11	0	8 685
2001	3	98	3 143	3 850	1 614	701	342	287	51	21	0	10 168
2002	1	106	3 355	4 254	1 769	752	391	303	61	12	0	11 065
2003	7	127	3 705	4 706	1 963	882	428	329	78	15	0	12 285
2004	4	97	3 819	4 883	2 204	906	452	348	80	18	0	12 848
2005	2	98	3 516	4 682	2 337	1 006	462	394	115	30	0	12 700
2006	3	98	3 534	4 736	2 356	963	527	419	111	31	0	12 836
2007	2	99	3 932	4 786	2 365	1 050	539	457	138	37	0	13 466
2008	0	108	4 588	5 273	2 595	1 155	611	490	129	23	0	15 019
2009	3	95	4 859	5 762	2 617	1 182	593	531	154	30	0	15 864
Ensemble du Québec hors Montréal												
1994	11	96	2 099	2 007	882	433	257	177	39	12	0	6 095
1995	7	58	1 784	1 897	776	362	167	131	27	11	0	5 267
1996	4	59	1 683	1 792	655	349	165	135	40	9	0	4 935
1997	4	51	1 603	1 662	650	295	168	97	25	7	0	4 609
1998	7	65	1 697	1 916	758	355	188	102	27	10	0	5 161
1999	3	58	1 871	2 077	783	337	166	131	30	6	0	5 490
2000	1	74	2 076	2 351	863	349	188	131	46	10	0	6 114
2001	2	75	2 382	2 692	1 060	431	213	173	35	15	0	7 098
2002	1	89	2 600	2 993	1 179	461	243	191	39	5	0	7 831
2003	7	90	2 909	3 398	1 298	569	252	218	50	10	0	8 829
2004	3	71	3 069	3 702	1 546	611	311	225	44	11	0	9 614
2005	1	81	2 774	3 541	1 654	667	305	232	69	15	0	9 351
2006	2	80	2 771	3 503	1 648	630	345	248	59	18	0	9 322
2007	1	76	3 088	3 543	1 639	672	319	261	73	24	0	9 705
2008	0	86	3 632	3 819	1 798	747	349	280	63	16	0	10 810
2009	2	68	3 926	4 254	1 797	760	359	316	89	20	0	11 603

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1994	0	1	62	91	23	18	12	5	1	0	0	216
1995	0	0	76	86	28	6	5	4	0	0	0	206
1996	0	1	54	63	18	12	5	3	3	0	0	163
1997	0	2	58	83	23	12	2	2	0	0	0	182
1998	2	0	84	105	29	15	5	8	0	0	0	248
1999	1	0	51	58	17	10	3	3	0	0	0	146
2000	0	1	30	59	26	8	8	4	3	1	0	141
2001	0	0	53	75	28	15	7	6	0	4	0	190
2002	1	0	54	93	46	14	7	7	3	0	0	232
2003	1	1	76	125	60	20	5	4	0	0	0	293
2004	0	1	79	105	30	19	9	10	3	0	0	256
2005	0	2	83	111	61	28	12	6	0	0	0	303
2006	0	2	55	127	41	12	10	4	0	0	0	251
2007	0	1	62	84	40	11	4	6	2	0	0	210
2008	0	2	64	91	54	14	6	4	1	0	0	236
2009	0	0	81	97	52	22	4	7	0	0	0	263
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1994	1	6	137	152	57	21	13	8	0	0	0	415
1995	1	3	133	142	39	25	5	7	2	1	0	373
1996	0	6	157	120	33	16	8	6	2	0	0	359
1997	1	0	87	106	39	11	11	5	0	0	0	271
1998	0	2	87	101	34	25	8	4	2	2	0	276
1999	0	1	80	142	61	21	11	6	2	0	0	327
2000	0	3	132	138	37	15	8	5	1	0	0	339
2001	0	4	79	125	44	28	7	8	0	0	0	302
2002	0	0	103	169	58	29	10	10	1	0	0	387
2003	2	1	136	160	60	20	9	9	4	0	0	412
2004	0	1	145	176	80	16	16	10	1	0	0	447
2005	1	0	107	155	68	37	7	9	2	1	0	388
2006	0	3	99	169	70	29	12	5	3	0	0	391
2007	0	0	119	170	67	29	10	12	3	0	0	412
2008	0	0	115	133	72	30	13	8	0	0	0	372
2009	0	3	125	170	60	32	9	10	6	1	0	420

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1994	1	7	204	275	133	48	34	26	4	2	0	747
1995	0	4	155	230	93	40	15	13	2	1	0	562
1996	2	5	154	258	73	38	11	20	5	2	0	571
1997	1	5	189	269	83	54	18	20	3	4	0	648
1998	0	5	224	278	119	58	36	15	4	2	0	744
1999	2	6	235	336	124	53	22	25	6	3	0	814
2000	1	7	210	321	143	41	33	28	7	3	0	800
2001	1	3	272	431	187	75	23	32	11	3	0	1 040
2002	0	6	236	437	179	70	32	34	7	1	0	1 004
2003	0	6	302	526	224	86	52	40	10	3	0	1 252
2004	0	2	346	529	245	81	29	27	7	3	0	1 275
2005	0	16	271	510	248	78	55	35	13	2	0	1 230
2006	0	4	276	521	261	89	42	46	18	5	0	1 266
2007	0	6	266	496	267	77	36	39	15	6	0	1 209
2008	0	4	347	490	263	97	57	36	13	6	0	1 319
2009	1	5	374	559	254	84	35	37	12	2	0	1 366
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1994	0	3	162	158	83	42	22	16	1	3	0	497
1995	0	4	130	149	44	35	16	17	1	1	0	397
1996	0	6	136	139	61	28	18	18	2	2	0	412
1997	0	3	124	130	48	15	11	3	0	1	0	341
1998	0	5	123	202	71	29	10	8	1	0	0	456
1999	0	1	117	174	57	15	12	12	3	0	0	399
2000	0	6	170	217	69	28	5	10	6	2	0	517
2001	0	8	220	240	92	30	16	14	3	0	0	625
2002	0	6	258	315	112	25	12	13	1	2	0	749
2003	0	9	304	353	131	48	25	16	1	0	0	891
2004	1	8	314	432	184	58	29	19	4	1	0	1 052
2005	0	8	275	407	202	72	36	19	5	1	0	1 028
2006	0	9	264	382	203	72	45	31	4	4	0	1 015
2007	0	9	282	339	183	92	41	25	4	0	0	975
2008	0	10	348	376	180	59	35	35	3	0	0	1 048
2009	0	5	366	397	148	55	34	36	7	3	0	1 052

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1994	0	8	100	120	28	21	12	5	3	1	0	299
1995	0	1	110	119	41	15	8	8	4	2	0	312
1996	0	1	90	120	45	20	11	14	2	0	0	303
1997	0	1	96	106	42	11	17	3	1	0	0	277
1998	0	1	91	126	41	18	14	5	0	0	0	296
1999	0	0	96	144	41	19	13	10	3	0	0	326
2000	0	1	119	170	46	21	9	6	4	0	0	376
2001	0	3	144	174	64	28	7	13	3	2	0	438
2002	0	9	151	214	67	27	11	13	3	0	0	495
2003	0	4	170	252	90	31	12	13	2	0	0	574
2004	0	3	193	225	94	45	17	10	5	1	0	594
2005	0	3	145	245	111	36	12	13	5	1	0	571
2006	0	2	115	178	104	46	20	11	4	2	0	482
2007	0	3	149	202	84	28	19	18	3	2	0	508
2008	0	5	176	253	121	48	20	12	4	0	0	639
2009	0	3	234	271	114	44	15	11	8	0	0	700
06 - Montréal-Centre												
1994	2	20	564	593	271	163	70	66	6	5	0	1 801
1995	1	24	533	623	270	157	59	44	10	2	0	1 770
1996	0	12	469	609	284	154	64	47	12	2	0	1 709
1997	0	20	536	622	294	139	71	57	11	4	0	1 827
1998	1	18	618	751	328	154	81	35	15	2	0	2 062
1999	1	18	716	913	382	205	110	72	13	2	0	2 479
2000	1	19	764	929	403	181	125	81	12	1	0	2 571
2001	1	23	761	1 158	554	270	129	114	16	6	0	3 070
2002	0	17	755	1 261	590	291	148	112	22	7	0	3 234
2003	0	37	796	1 308	665	313	176	111	28	5	0	3 456
2004	1	26	750	1 181	658	295	141	123	36	7	0	3 234
2005	1	17	742	1 141	683	339	157	162	46	15	0	3 349
2006	1	18	763	1 233	708	333	182	171	52	13	0	3 514
2007	1	23	844	1 243	726	378	220	196	65	13	0	3 761
2008	0	22	956	1 454	797	408	262	210	66	7	0	4 209
2009	1	27	933	1 508	820	422	234	215	65	10	0	4 261

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1994	0	3	119	124	60	31	20	17	2	0	0	379
1995	0	1	97	126	46	25	20	12	2	0	0	331
1996	2	3	95	96	43	16	7	6	0	0	0	278
1997	0	3	71	90	39	14	11	4	1	0	0	237
1998	1	4	80	98	52	17	10	7	7	0	0	279
1999	0	2	137	114	60	21	8	5	0	0	0	350
2000	0	8	113	141	57	26	15	7	1	0	0	372
2001	0	3	141	185	74	34	16	13	2	0	0	469
2002	0	3	179	201	73	25	13	19	1	1	0	518
2003	0	1	171	188	71	34	10	15	4	0	0	495
2004	0	2	173	209	91	47	19	13	4	0	0	560
2005	0	0	153	254	105	30	27	14	3	1	0	589
2006	0	3	200	209	94	41	18	18	2	0	0	585
2007	0	6	231	244	137	46	18	20	2	1	0	705
2008	0	4	258	283	134	63	19	26	2	0	0	789
2009	1	8	301	318	131	46	22	26	5	5	0	863
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1994	1	7	159	91	48	31	14	6	3	1	0	361
1995	0	4	114	76	47	23	8	11	2	0	0	285
1996	0	1	109	101	24	28	8	5	2	1	0	279
1997	0	6	100	62	30	10	6	3	1	0	0	218
1998	0	2	94	60	23	15	1	1	0	0	0	196
1999	0	4	72	53	22	12	3	3	3	0	0	173
2000	0	7	91	92	34	17	3	5	3	0	0	252
2001	0	3	89	89	31	12	6	6	1	0	0	237
2002	0	6	122	96	32	18	10	6	1	0	0	291
2003	0	6	110	111	41	18	7	9	0	0	0	304
2004	0	8	96	111	51	24	9	4	1	0	0	305
2005	0	6	95	130	57	29	7	2	4	0	0	332
2006	0	4	107	113	54	17	13	6	0	0	0	314
2007	0	3	117	134	48	13	11	8	4	2	0	340
2008	0	4	105	92	52	25	14	5	2	0	0	299
2009	0	3	90	86	42	25	12	8	0	1	0	267

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1994	2	11	115	81	50	24	9	8	1	0	0	301
1995	3	5	112	83	55	20	6	3	0	1	0	288
1996	0	5	94	92	33	25	9	2	0	0	0	261
1997	1	6	78	72	27	14	9	2	1	0	0	212
1998	1	8	75	76	39	18	6	3	0	1	0	228
1999	0	7	110	82	32	23	7	6	0	0	0	267
2000	0	5	94	71	35	20	5	5	1	1	0	239
2001	0	6	70	69	41	9	4	5	0	1	0	206
2002	0	7	92	83	37	12	6	6	0	0	0	248
2003	0	7	100	101	38	16	5	6	1	0	0	276
2004	0	6	113	113	51	24	16	5	1	0	0	329
2005	0	8	122	92	47	27	9	10	1	0	0	316
2006	0	12	88	88	43	12	8	8	0	0	0	259
2007	0	13	123	93	39	24	6	5	1	1	0	305
2008	0	9	110	89	36	13	4	6	2	0	0	269
2009	0	7	106	79	32	13	5	7	0	1	0	250
10 - Nord-du-Québec												
1994	1	1	16	12	7	4	0	0	0	0	0	42
1995	0	0	21	7	0	2	2	1	0	0	0	34
1996	0	0	6	10	3	3	0	0	1	0	0	23
1997	0	0	8	1	2	1	1	0	0	0	0	13
1998	0	0	7	3	0	1	1	1	0	0	0	13
1999	0	0	7	9	3	0	2	1	0	0	0	22
2000	0	1	8	4	1	0	1	1	0	0	0	16
2001	0	0	7	6	1	0	1	1	0	0	0	16
2002	0	0	13	8	2	2	1	0	0	0	0	26
2003	0	0	14	15	5	0	0	0	1	0	0	35
2004	1	0	13	12	9	4	1	0	0	0	0	40
2005	0	1	10	16	7	3	2	0	0	0	0	39
2006	0	0	8	15	3	2	1	1	0	0	0	30
2007	0	1	6	14	3	3	2	0	0	0	0	29
2008	0	0	7	4	0	2	0	0	0	0	0	13
2009	0	0	13	10	5	6	0	1	0	0	0	35

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1994	0	2	29	31	16	13	7	6	1	0	0	109
1995	0	1	21	28	8	12	6	0	1	1	0	80
1996	0	1	22	30	5	8	2	1	0	0	0	70
1997	1	1	19	12	10	3	3	5	0	0	0	56
1998	0	0	8	9	7	3	1	2	1	0	0	31
1999	0	1	6	9	4	2	0	1	0	0	0	23
2000	0	0	24	19	12	0	3	0	0	0	0	60
2001	0	2	32	31	6	7	5	1	1	1	0	88
2002	0	0	22	54	6	7	4	1	0	0	0	95
2003	0	3	47	35	12	9	5	3	0	0	0	115
2004	0	1	44	45	22	10	4	5	0	0	0	132
2005	0	1	32	40	27	3	4	0	0	0	0	108
2006	0	1	29	40	25	4	1	2	0	0	0	110
2007	0	0	39	28	12	7	4	3	3	0	0	99
2008	0	0	29	33	27	4	4	3	2	0	0	108
2009	0	0	48	47	19	14	2	3	0	0	0	133
12 - Chaudière-Appalaches												
1994	0	1	74	68	40	22	12	9	0	0	0	230
1995	0	0	43	62	34	11	5	3	2	0	0	161
1996	0	1	67	80	33	21	12	3	0	1	0	219
1997	0	0	71	72	32	16	12	2	1	0	0	211
1998	1	2	62	94	35	22	5	5	1	0	0	231
1999	0	0	69	102	29	9	7	8	1	0	0	227
2000	0	0	75	107	44	15	8	9	2	2	0	265
2001	1	2	83	142	50	14	6	6	0	0	0	305
2002	0	1	86	137	60	17	12	5	1	0	0	319
2003	0	3	84	170	64	32	6	6	1	1	0	368
2004	0	1	111	182	76	33	10	12	1	0	0	427
2005	0	4	96	163	90	33	15	9	5	3	0	418
2006	0	0	98	149	91	28	16	11	1	1	0	395
2007	1	1	81	143	68	30	11	11	3	3	0	352
2008	0	2	88	128	74	30	16	13	3	2	0	356
2009	0	3	131	158	82	48	14	13	4	1	0	454

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1994	1	4	122	86	33	18	7	5	3	2	0	282
1995	1	2	85	85	36	16	4	4	1	0	0	235
1996	0	2	71	64	20	10	8	5	1	1	0	182
1997	0	4	99	79	28	9	5	6	2	0	0	233
1998	0	5	94	105	41	18	11	4	2	3	0	284
1999	0	6	112	104	35	21	8	11	3	0	0	300
2000	0	3	130	130	59	28	14	6	4	0	0	375
2001	0	3	117	161	65	26	14	13	2	0	0	402
2002	0	3	160	174	73	29	27	14	3	0	0	483
2003	0	1	170	197	68	31	20	18	5	0	0	510
2004	0	0	182	235	90	36	21	16	3	0	0	583
2005	0	1	177	223	109	42	17	21	4	1	0	596
2006	0	2	200	231	106	27	22	10	3	2	0	603
2007	0	0	227	226	102	48	24	16	7	2	0	653
2008	0	3	269	247	124	61	17	33	6	0	0	760
2009	0	4	238	289	117	47	26	29	8	0	0	758
14 - Lanaudière												
1994	1	4	123	86	48	22	16	16	2	1	0	322
1995	1	8	81	70	31	12	9	13	2	0	0	229
1996	0	2	100	82	27	10	10	6	0	0	0	238
1997	0	1	108	91	23	21	8	9	0	0	0	271
1998	0	10	101	84	31	11	10	4	1	0	0	253
1999	0	5	151	142	59	23	9	6	2	0	0	399
2000	0	7	137	158	50	22	7	5	1	0	0	387
2001	0	8	142	140	62	18	19	10	1	0	0	400
2002	0	4	147	143	60	20	13	9	6	0	0	402
2003	0	14	190	162	69	38	17	13	4	1	0	509
2004	0	11	172	210	76	37	19	17	1	2	0	548
2005	0	5	213	198	95	32	18	17	1	1	0	580
2006	0	5	245	238	106	49	21	15	4	0	0	683
2007	0	4	234	233	98	55	22	19	4	2	0	671
2008	0	3	369	296	117	49	21	20	4	1	0	881
2009	0	8	358	299	124	59	30	25	7	1	0	911

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1994	0	9	172	177	64	21	27	13	6	0	0	491
1995	0	6	143	156	77	23	25	7	2	0	0	439
1996	0	6	132	136	47	21	22	5	12	1	0	382
1997	0	4	120	108	64	12	18	6	3	0	0	335
1998	0	3	133	143	56	18	23	12	3	1	0	392
1999	0	7	172	136	52	19	7	7	0	1	0	401
2000	0	7	199	182	61	28	13	10	5	0	0	505
2001	0	7	275	227	74	31	17	13	3	1	0	648
2002	0	10	309	271	108	55	19	12	3	0	0	787
2003	0	11	342	322	97	54	24	10	3	3	0	866
2004	0	6	362	347	114	50	29	21	5	1	0	935
2005	0	5	319	313	114	63	22	26	13	1	0	876
2006	0	6	305	315	121	52	30	25	3	0	0	859
2007	0	4	355	318	124	58	34	21	7	0	0	922
2008	0	8	383	384	137	57	37	19	8	1	0	1 036
2009	0	8	457	409	159	62	52	34	11	0	0	1 195
16 - Montérégie												
1994	1	16	379	334	129	74	44	32	10	1	0	1 036
1995	0	14	359	355	125	59	22	22	5	2	0	969
1996	0	10	276	277	109	46	18	30	5	0	0	780
1997	0	8	288	278	97	45	19	19	10	1	0	769
1998	0	9	339	330	110	42	20	13	3	1	0	868
1999	0	11	363	365	128	52	26	18	2	1	0	968
2000	0	15	446	445	136	47	37	20	6	1	0	1 155
2001	0	20	505	483	165	73	37	19	4	2	0	1 308
2002	0	20	518	479	179	65	28	26	7	1	0	1 323
2003	2	14	548	553	203	85	37	36	6	2	0	1 486
2004	1	17	583	628	249	91	55	34	4	2	0	1 665
2005	0	13	524	549	240	108	34	42	9	3	0	1 522
2006	0	16	528	577	247	109	65	43	13	4	0	1 603
2007	0	11	636	659	288	113	53	50	12	3	0	1 826
2008	0	16	752	769	324	149	63	49	9	5	0	2 136
2009	0	9	848	887	385	161	73	61	18	5	0	2 447

Tableau 3 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1994	2	10	84	89	47	16	8	5	2	1	0	266
1995	1	2	64	80	53	35	11	5	1	2	0	255
1996	0	5	90	89	68	42	16	10	4	1	0	325
1997	0	7	58	78	46	44	15	8	2	1	0	259
1998	2	8	50	57	43	36	26	7	0	0	0	231
1999	0	6	66	79	41	33	25	8	5	1	0	266
2000	0	2	78	74	40	30	16	10	1	0	0	251
2001	0	3	117	89	57	26	25	11	4	1	0	334
2002	0	10	119	88	68	37	33	14	1	0	0	370
2003	2	9	90	77	42	32	14	19	8	0	0	294
2004	0	2	77	89	56	21	19	16	2	1	0	283
2005	0	4	78	83	40	25	24	9	4	0	0	267
2006	2	2	87	76	48	24	16	12	3	0	0	270
2007	0	5	79	98	48	30	14	6	3	0	0	283
2008	0	9	121	83	54	21	14	8	4	1	0	315
2009	0	0	74	83	38	25	20	5	2	0	0	248
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1994	0	3	42	32	16	7	0	0	0	0	0	102
1995	0	3	40	43	19	3	0	1	0	0	0	111
1996	0	4	30	35	13	5	0	1	1	0	0	90
1997	0	0	29	25	17	3	2	0	0	0	0	76
1998	0	1	45	45	27	9	1	3	2	0	0	135
1999	0	1	27	28	18	4	3	1	0	0	0	82
2000	0	1	20	23	13	3	3	0	1	0	0	64
2001	0	0	36	25	19	5	3	2	0	0	0	90
2002	0	4	31	31	19	9	5	2	1	0	0	102
2003	0	0	55	51	23	15	4	1	0	0	0	149
2004	0	2	66	54	28	15	9	6	2	0	0	183
2005	0	4	74	52	33	21	4	0	0	0	0	188
2006	0	9	67	75	31	17	5	0	1	0	0	206
2007	0	9	82	62	31	8	10	2	0	2	0	206
2008	0	7	91	68	29	25	9	3	0	0	0	234
2009	0	2	82	95	35	17	6	3	1	0	0	241

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Ensemble du Québec*												
1994	10	112	2 268	1 890	711	366	217	143	25	7	0	5 827
1995	6	77	1 992	1 863	711	319	130	85	21	8	0	5 276
1996	3	70	1 882	1 790	610	293	142	106	29	6	0	5 001
1997	3	68	1 883	1 689	598	237	131	89	16	7	0	4 802
1998	7	77	2 022	1 904	680	292	120	52	21	7	0	5 240
1999	1	73	2 281	2 141	740	280	139	84	23	4	0	5 817
2000	2	91	2 514	2 416	823	295	157	80	31	6	0	6 468
2001	2	93	2 775	2 716	978	376	155	119	23	7	0	7 285
2002	0	106	2 972	3 050	1 085	412	197	108	27	2	0	7 990
2003	5	124	3 244	3 351	1 202	483	204	148	35	3	0	8 826
2004	2	94	3 361	3 495	1 342	509	220	145	23	7	0	9 217
2005	0	95	3 102	3 335	1 403	546	215	157	39	11	0	8 925
2006	3	95	3 056	3 342	1 455	548	265	158	40	9	0	8 989
2007	1	95	3 403	3 347	1 412	538	283	165	39	10	0	9 310
2008	0	103	3 909	3 620	1 534	645	299	198	39	8	0	10 379
2009	1	88	4 112	3 985	1 533	648	297	211	43	11	0	10 944
Ensemble du Québec hors Montréal												
1994	8	92	1 779	1 440	545	269	174	104	22	5	0	4 489
1995	5	55	1 519	1 371	534	234	105	68	17	8	0	3 948
1996	3	58	1 470	1 311	432	213	108	83	23	6	0	3 739
1997	3	48	1 404	1 211	420	171	98	60	12	3	0	3 464
1998	6	59	1 464	1 347	480	217	96	39	14	5	0	3 753
1999	1	57	1 639	1 473	499	192	94	57	19	3	0	4 052
2000	1	72	1 828	1 685	548	201	108	52	23	5	0	4 539
2001	2	71	2 094	1 863	639	237	110	80	18	5	0	5 134
2002	0	89	2 291	2 124	724	268	136	77	19	1	0	5 744
2003	5	87	2 545	2 352	798	325	137	114	26	3	0	6 410
2004	1	68	2 685	2 605	912	350	164	104	16	4	0	6 919
2005	0	78	2 432	2 495	983	369	156	114	24	4	0	6 661
2006	2	77	2 375	2 452	1 016	356	186	112	28	7	0	6 616
2007	1	74	2 678	2 483	984	354	186	112	25	8	0	6 910
2008	0	81	3 104	2 633	1 065	433	178	137	26	7	0	7 673
2009	1	63	3 331	2 938	1 069	439	196	147	30	9	0	8 229

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1994	0	1	49	46	17	9	7	5	1	0	0	137
1995	0	0	59	48	15	5	3	2	0	0	0	132
1996	0	1	37	38	7	7	4	0	1	0	0	97
1997	0	2	46	50	13	5	2	0	0	0	0	118
1998	2	0	64	50	14	7	2	5	0	0	0	144
1999	1	0	41	34	8	3	3	3	0	0	0	96
2000	0	1	27	42	13	3	4	2	1	0	0	93
2001	0	0	44	45	11	7	3	2	0	2	0	116
2002	0	0	44	59	22	7	1	5	1	0	0	140
2003	1	1	58	65	28	6	2	4	0	0	0	166
2004	0	1	60	68	6	10	4	6	0	0	0	155
2005	0	2	68	63	23	14	5	4	0	0	0	179
2006	0	2	39	71	23	7	3	1	0	0	0	146
2007	0	1	55	45	17	5	3	3	0	0	0	129
2008	0	2	48	54	28	5	3	1	1	0	0	142
2009	0	0	67	59	27	9	1	5	0	0	0	168
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1994	0	6	123	107	24	12	10	6	0	0	0	303
1995	1	3	115	97	31	15	2	3	1	1	0	280
1996	0	6	143	85	19	7	5	2	1	0	0	273
1997	1	0	77	73	21	4	6	3	0	0	0	194
1998	0	1	75	75	21	13	6	3	1	1	0	203
1999	0	1	72	113	38	9	6	3	1	0	0	244
2000	0	3	115	97	18	9	6	3	1	0	0	252
2001	0	4	72	88	28	20	3	4	0	0	0	224
2002	0	0	97	128	34	13	7	2	1	0	0	286
2003	1	1	122	113	41	10	3	3	4	0	0	307
2004	0	1	124	124	51	8	10	6	0	0	0	324
2005	0	0	100	112	39	18	5	3	1	0	0	279
2006	0	3	87	112	43	15	7	3	1	0	0	271
2007	0	0	99	116	44	15	6	1	1	0	0	283
2008	0	0	102	95	47	17	5	2	0	0	0	269
2009	0	3	107	120	37	12	5	6	1	0	0	294

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1994	1	6	175	204	76	33	27	15	3	1	0	548
1995	0	4	135	168	55	27	10	10	0	1	0	414
1996	2	5	129	188	45	18	6	13	3	1	0	413
1997	1	5	168	189	55	30	8	11	2	1	0	471
1998	0	4	193	205	73	34	16	4	2	0	0	533
1999	0	6	203	237	81	34	11	13	4	2	0	592
2000	1	7	179	234	90	27	21	10	3	2	0	578
2001	1	3	240	290	111	32	13	18	5	0	0	714
2002	0	6	205	309	102	40	14	17	5	0	0	700
2003	0	6	268	360	138	36	22	22	7	2	0	862
2004	0	2	304	377	146	38	14	13	3	1	0	900
2005	0	15	242	338	156	39	28	19	6	1	0	844
2006	0	4	244	372	150	48	26	21	9	1	0	878
2007	0	6	219	358	158	43	16	15	5	2	0	823
2008	0	3	293	344	154	50	27	10	4	2	0	891
2009	0	5	326	385	146	55	22	18	3	2	0	963
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1994	0	3	141	107	45	25	13	10	1	2	0	352
1995	0	4	108	98	26	20	7	7	1	0	0	271
1996	0	6	120	105	41	17	10	12	2	2	0	317
1997	0	3	112	92	27	8	4	2	0	1	0	253
1998	0	5	100	140	45	15	4	2	1	0	0	315
1999	0	1	99	124	39	10	5	3	2	0	0	288
2000	0	6	144	152	47	14	1	2	3	0	0	370
2001	0	6	186	153	57	12	9	7	2	0	0	433
2002	0	6	224	213	61	12	6	7	0	0	0	532
2003	0	9	266	239	87	31	13	7	0	0	0	654
2004	1	8	277	285	105	33	13	7	3	0	0	732
2005	0	8	231	258	120	39	19	6	3	1	0	687
2006	0	9	212	270	116	38	23	16	1	3	0	689
2007	0	8	233	221	102	47	24	12	1	0	0	648
2008	0	10	290	243	98	31	15	18	1	0	0	707
2009	0	5	299	249	75	31	19	16	2	1	0	698

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1994	0	8	85	86	14	13	6	2	1	0	0	216
1995	0	1	92	85	31	10	7	5	3	2	0	239
1996	0	1	87	89	33	9	7	8	0	0	0	234
1997	0	1	81	75	28	6	8	2	1	0	0	202
1998	0	1	78	77	19	12	8	3	0	0	0	198
1999	0	0	83	103	24	6	6	6	1	0	0	229
2000	0	1	107	119	27	10	3	1	1	0	0	269
2001	0	3	124	121	35	17	1	4	1	1	0	307
2002	0	9	130	140	41	17	5	3	2	0	0	347
2003	0	4	152	170	47	15	7	7	0	0	0	402
2004	0	3	166	156	54	28	6	4	1	0	0	419
2005	0	3	131	173	53	22	3	7	1	0	0	393
2006	0	1	104	127	60	31	8	3	4	1	0	339
2007	0	3	138	141	46	7	14	6	1	1	0	357
2008	0	5	150	173	74	28	15	6	1	0	0	452
2009	0	3	197	204	66	27	7	5	1	0	0	510
06 - Montréal-Centre												
1994	2	20	489	450	166	97	43	39	3	2	0	1 338
1995	1	22	473	492	177	85	25	17	4	0	0	1 328
1996	0	12	412	479	178	80	34	23	6	0	0	1 262
1997	0	20	479	478	178	66	33	29	4	4	0	1 338
1998	1	18	558	557	200	75	24	13	7	2	0	1 487
1999	0	16	642	668	241	88	45	27	4	1	0	1 765
2000	1	19	686	731	275	94	49	28	8	1	0	1 929
2001	0	22	681	853	339	139	45	39	5	2	0	2 151
2002	0	17	681	926	361	144	61	31	8	1	0	2 246
2003	0	37	699	999	404	158	67	34	9	0	0	2 416
2004	1	26	676	890	430	159	56	41	7	3	0	2 298
2005	0	17	670	840	420	177	59	43	15	7	0	2 264
2006	1	18	681	890	439	192	79	46	12	2	0	2 373
2007	0	21	725	864	428	184	97	53	14	2	0	2 400
2008	0	22	805	987	469	212	121	61	13	1	0	2 706
2009	0	25	781	1 047	464	209	101	64	13	2	0	2 715

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1994	0	3	108	99	47	20	15	15	2	0	0	311
1995	0	1	81	101	38	22	16	8	2	0	0	271
1996	1	3	85	77	29	14	7	3	0	0	0	228
1997	0	2	66	72	25	10	8	2	0	0	0	187
1998	1	4	73	81	42	8	5	0	3	0	0	220
1999	0	1	125	89	39	14	5	2	0	0	0	278
2000	0	8	101	104	38	12	10	3	1	0	0	279
2001	0	2	130	137	46	21	7	4	1	0	0	349
2002	0	3	163	137	52	14	10	4	0	0	0	384
2003	0	1	150	140	50	22	4	6	0	0	0	373
2004	0	2	160	150	62	31	10	6	1	0	0	424
2005	0	0	141	182	61	14	16	6	0	1	0	422
2006	0	3	167	150	63	20	11	5	1	0	0	420
2007	0	6	205	168	83	21	12	11	0	0	0	506
2008	0	4	224	183	79	39	10	14	1	0	0	554
2009	1	6	253	235	85	29	8	11	3	1	0	632
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1994	1	7	129	59	37	17	10	4	2	0	0	266
1995	0	4	90	53	34	12	6	5	0	0	0	204
1996	0	1	99	67	14	16	6	4	1	0	0	208
1997	0	6	84	46	23	6	4	2	0	0	0	171
1998	0	2	80	43	11	10	1	0	0	0	0	147
1999	0	4	63	35	13	8	0	1	3	0	0	127
2000	0	7	85	75	23	11	0	1	3	0	0	205
2001	0	3	81	69	22	7	3	2	1	0	0	188
2002	0	6	107	70	18	14	5	2	0	0	0	222
2003	0	6	92	81	25	14	5	6	0	0	0	229
2004	0	8	83	81	26	14	8	2	1	0	0	223
2005	0	6	76	92	38	16	6	1	1	0	0	236
2006	0	4	97	83	37	12	12	1	0	0	0	246
2007	0	3	99	91	35	8	7	5	2	2	0	252
2008	0	3	94	63	32	20	11	2	1	0	0	226
2009	0	3	76	53	23	15	10	2	0	0	0	182

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1994	1	11	94	66	34	13	4	3	1	0	0	227
1995	2	4	101	59	39	10	5	2	0	1	0	223
1996	0	5	76	72	23	15	5	1	0	0	0	198
1997	1	5	64	46	16	7	6	0	0	0	0	146
1998	0	7	68	52	23	15	5	2	0	0	0	173
1999	0	7	94	57	20	19	5	3	0	0	0	205
2000	0	4	80	47	21	12	3	2	0	1	0	172
2001	0	5	66	56	27	5	4	3	0	1	0	168
2002	0	7	79	57	26	9	2	3	0	0	0	187
2003	0	7	83	69	26	11	4	5	0	0	0	206
2004	0	4	93	81	31	13	9	2	0	0	0	233
2005	0	7	100	59	31	19	5	7	1	0	0	229
2006	0	11	73	63	30	6	5	5	0	0	0	193
2007	0	13	102	73	29	12	4	2	1	0	0	236
2008	0	8	95	65	25	8	4	5	2	0	0	212
2009	0	6	95	60	23	11	3	2	0	1	0	201
10 - Nord-du-Québec												
1994	1	1	13	5	4	1	0	0	0	0	0	25
1995	0	0	19	4	0	2	1	1	0	0	0	28
1996	0	0	6	6	2	1	0	0	0	0	0	15
1997	0	0	7	0	1	1	1	0	0	0	0	10
1998	0	0	7	3	0	1	1	0	0	0	0	12
1999	0	0	7	5	2	0	1	0	0	0	0	15
2000	0	1	6	3	0	0	1	1	0	0	0	12
2001	0	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0	9
2002	0	0	13	4	1	2	1	0	0	0	0	21
2003	0	0	13	10	3	0	0	0	1	0	0	27
2004	0	0	13	9	5	3	1	0	0	0	0	31
2005	0	0	10	15	3	0	1	0	0	0	0	29
2006	0	0	8	13	2	1	0	1	0	0	0	25
2007	0	1	5	12	2	2	1	0	0	0	0	23
2008	0	0	7	2	0	2	0	0	0	0	0	11
2009	0	0	12	8	4	3	0	0	0	0	0	27

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1994	0	2	24	25	10	9	5	3	0	0	0	79
1995	0	1	19	23	4	9	2	0	1	1	0	62
1996	0	1	20	27	3	7	1	0	0	0	0	60
1997	0	1	17	10	8	1	2	2	0	0	0	42
1998	0	0	8	5	5	1	0	2	1	0	0	22
1999	0	1	5	8	3	2	0	1	0	0	0	20
2000	0	0	20	12	8	0	2	0	0	0	0	44
2001	0	2	27	17	3	5	4	1	1	0	0	62
2002	0	0	19	43	2	4	2	0	0	0	0	70
2003	0	3	41	25	9	3	3	0	0	0	0	85
2004	0	1	42	36	16	8	2	4	0	0	0	109
2005	0	1	30	31	18	1	2	0	0	0	0	84
2006	0	1	29	28	19	2	0	0	0	0	0	80
2007	0	0	35	21	7	3	2	2	2	0	0	74
2008	0	0	24	24	18	3	3	0	0	0	0	73
2009	0	0	43	34	10	10	1	0	0	0	0	98
12 - Chaudière-Appalaches												
1994	0	1	64	47	29	11	7	5	0	0	0	165
1995	0	0	35	43	25	6	3	1	1	0	0	115
1996	0	1	61	52	20	14	7	3	0	1	0	160
1997	0	0	62	51	15	7	6	1	0	0	0	145
1998	1	2	54	65	25	15	2	2	1	0	0	171
1999	0	0	58	68	20	5	5	4	0	0	0	161
2000	0	0	71	69	28	6	4	4	2	1	0	188
2001	1	2	73	98	26	5	1	5	0	0	0	211
2002	0	1	75	87	37	5	8	2	0	0	0	215
2003	0	2	70	111	31	19	2	3	0	1	0	240
2004	0	1	87	126	43	19	4	4	1	0	0	286
2005	0	4	84	121	49	19	8	0	2	1	0	288
2006	0	0	86	107	47	14	4	6	0	0	0	264
2007	1	1	75	101	39	18	7	6	1	1	0	250
2008	0	2	76	90	39	12	8	5	2	2	0	236
2009	0	3	103	101	39	29	7	5	1	0	0	288

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1994	0	4	99	57	19	11	5	1	1	1	0	199
1995	1	2	69	57	22	10	2	0	1	0	0	164
1996	0	2	56	45	14	7	5	2	1	0	0	132
1997	0	3	90	60	18	4	4	5	1	0	0	186
1998	0	4	80	72	22	10	5	2	1	3	0	200
1999	0	6	101	70	20	8	4	2	1	0	0	212
2000	0	3	115	95	32	16	9	2	1	0	0	274
2001	0	3	103	112	35	14	10	4	2	0	0	284
2002	0	3	140	122	46	17	14	8	1	0	0	351
2003	0	1	150	132	34	20	13	9	1	0	0	360
2004	0	0	154	164	50	19	13	8	1	0	0	409
2005	0	1	151	156	63	27	7	10	1	0	0	417
2006	0	2	165	145	69	12	9	4	2	0	0	408
2007	0	0	203	153	61	21	10	6	4	0	0	458
2008	0	3	222	155	65	36	6	18	2	0	0	507
2009	0	4	200	190	67	22	12	13	3	0	0	511
14 - Lanaudière												
1994	1	4	108	62	29	13	8	7	1	0	0	234
1995	0	7	64	44	26	9	7	10	1	0	0	169
1996	0	2	83	55	19	5	9	3	0	0	0	177
1997	0	1	95	67	18	18	5	8	0	0	0	220
1998	0	10	87	56	14	10	6	3	0	0	0	187
1999	0	5	135	97	32	12	8	1	1	0	0	292
2000	0	7	119	117	36	12	4	2	0	0	0	297
2001	0	8	116	95	38	12	7	2	0	0	0	278
2002	0	4	130	109	33	14	6	3	5	0	0	304
2003	0	14	171	109	49	24	9	9	2	0	0	388
2004	0	11	160	156	48	18	9	6	0	1	0	412
2005	0	5	184	160	60	19	13	10	0	0	0	451
2006	0	4	212	164	64	30	13	7	2	0	0	496
2007	0	4	205	168	63	28	14	10	1	0	0	493
2008	0	2	324	214	69	32	12	14	1	1	0	670
2009	0	8	299	195	81	37	17	16	2	1	0	656

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1994	0	9	141	127	35	13	18	6	4	0	0	353
1995	0	6	125	115	53	13	15	2	2	0	0	331
1996	0	6	121	99	30	15	14	3	7	1	0	296
1997	0	4	107	87	50	9	11	3	2	0	0	273
1998	0	2	120	108	41	11	11	3	1	0	0	297
1999	0	7	152	88	33	13	3	4	0	0	0	300
2000	0	6	179	127	38	17	10	6	4	0	0	387
2001	0	7	243	170	47	15	9	6	1	0	0	498
2002	0	10	272	208	66	33	10	3	1	0	0	603
2003	0	11	297	230	62	26	12	3	1	0	0	642
2004	0	6	320	233	66	28	12	7	3	1	0	676
2005	0	5	287	221	62	33	9	13	4	0	0	634
2006	0	6	258	210	81	23	17	16	1	0	0	612
2007	0	4	321	216	67	33	22	10	1	0	0	674
2008	0	7	338	262	83	42	16	10	5	0	0	763
2009	0	7	397	281	86	41	31	18	4	0	0	865
16 - Montérégie												
1994	1	15	313	241	72	50	31	19	4	0	0	758
1995	0	14	311	271	75	35	14	9	3	0	0	736
1996	0	10	237	204	73	23	12	19	3	0	0	587
1997	0	8	252	214	54	24	13	12	5	0	0	586
1998	0	8	301	228	72	24	10	4	1	1	0	650
1999	0	11	322	267	79	24	13	6	1	1	0	726
2000	0	15	395	319	87	26	16	11	2	1	0	873
2001	0	20	456	328	96	40	16	10	2	1	0	969
2002	0	20	467	349	113	34	15	8	2	1	0	1 009
2003	1	14	488	400	127	51	23	19	4	0	0	1 127
2004	0	16	519	455	144	53	27	16	1	1	0	1 232
2005	0	13	468	414	154	58	9	22	2	0	0	1 140
2006	0	16	470	420	155	70	31	14	6	2	0	1 184
2007	0	10	558	480	176	65	31	19	4	1	0	1 345
2008	0	16	656	557	197	82	32	24	1	1	0	1 566
2009	0	8	730	639	248	81	41	26	9	3	0	1 785

Tableau 4 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1994	2	8	73	70	37	12	8	3	1	1	0	217
1995	1	1	57	63	46	27	5	2	1	2	0	206
1996	0	5	83	69	48	33	10	9	3	1	0	261
1997	0	7	49	58	34	28	9	7	1	1	0	194
1998	2	8	34	46	31	23	14	1	0	0	0	160
1999	0	6	54	52	31	21	17	4	5	0	0	191
2000	0	2	65	53	29	23	11	2	0	0	0	185
2001	0	3	96	61	41	20	16	6	2	0	0	246
2002	0	10	97	63	56	28	25	10	0	0	0	289
2003	2	7	76	54	23	24	13	10	6	0	0	216
2004	0	2	68	63	36	14	16	9	1	0	0	209
2005	0	4	64	58	26	17	17	6	2	0	0	194
2006	2	2	73	55	32	14	13	9	1	0	0	201
2007	0	5	61	69	29	22	5	2	1	0	0	194
2008	0	9	91	60	32	13	5	5	4	1	0	220
2009	0	0	60	57	29	14	11	2	1	0	0	175
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1994	0	3	40	32	16	7	0	0	0	0	0	99
1995	0	3	39	42	14	2	0	1	0	0	0	103
1996	0	3	27	33	12	5	0	1	1	0	0	83
1997	0	0	27	21	14	3	1	0	0	0	0	66
1998	0	1	42	41	22	8	0	3	2	0	0	121
1999	0	1	25	26	17	4	2	1	0	0	0	76
2000	0	1	20	20	13	3	3	0	1	0	0	61
2001	0	0	30	22	16	5	3	2	0	0	0	78
2002	0	4	29	26	14	5	5	0	1	0	0	84
2003	0	0	48	44	18	13	2	1	0	0	0	126
2004	0	2	55	41	23	13	6	4	0	0	0	145
2005	0	4	65	42	27	14	3	0	0	0	0	155
2006	0	9	51	62	25	13	4	0	0	0	0	164
2007	0	9	65	50	26	4	8	2	0	1	0	165
2008	0	7	70	49	25	13	6	3	0	0	0	174
2009	0	2	67	68	23	13	1	2	0	0	0	176

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Ensemble du Québec*												
1994	3	4	395	706	440	229	110	100	20	10	0	2 058
1995	2	5	323	656	335	200	96	89	16	5	0	1 750
1996	1	1	270	610	329	209	86	76	23	5	0	1 635
1997	1	3	253	593	345	197	108	65	20	4	0	1 620
1998	1	6	291	760	405	217	149	85	21	5	0	1 969
1999	3	3	298	845	425	262	137	118	20	4	0	2 134
2000	0	2	324	859	440	234	156	131	27	5	0	2 199
2001	1	5	363	1 127	632	324	185	168	28	14	0	2 860
2002	1	0	382	1 200	681	340	193	195	34	10	0	3 048
2003	2	3	456	1 350	756	399	222	178	43	12	0	3 437
2004	2	3	458	1 385	858	397	231	202	57	11	0	3 616
2005	2	3	413	1 342	931	460	247	236	76	19	0	3 745
2006	0	3	475	1 388	898	414	261	261	71	22	0	3 807
2007	1	3	528	1 430	950	510	255	290	99	27	0	4 100
2008	0	5	677	1 650	1 058	510	312	291	89	15	0	4 617
2009	2	7	744	1 772	1 079	533	294	319	110	19	0	4 894
Ensemble du Québec hors Montréal												
1994	3	4	320	566	336	163	83	73	17	7	0	1 600
1995	2	3	264	526	242	128	62	62	10	3	0	1 315
1996	1	1	213	480	223	136	57	52	17	3	0	1 191
1997	1	3	197	450	229	124	70	37	13	4	0	1 139
1998	1	6	231	566	278	138	92	63	13	5	0	1 401
1999	2	1	230	602	284	145	72	74	11	3	0	1 431
2000	0	2	246	662	315	148	80	79	23	5	0	1 566
2001	0	4	286	828	420	194	103	93	17	10	0	1 958
2002	1	0	309	868	454	193	107	114	20	4	0	2 079
2003	2	3	364	1 045	500	244	115	104	24	7	0	2 418
2004	2	3	384	1 095	633	261	147	121	28	7	0	2 689
2005	1	3	342	1 044	670	298	149	118	45	11	0	2 687
2006	0	3	396	1 051	631	274	159	136	31	11	0	2 701
2007	0	1	409	1 058	653	318	133	149	48	16	0	2 787
2008	0	5	528	1 186	733	314	171	143	37	9	0	3 131
2009	1	5	594	1 314	727	321	162	169	59	11	0	3 366

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1994	0	0	13	45	6	9	5	0	0	0	0	79
1995	0	0	17	38	13	1	2	2	0	0	0	74
1996	0	0	17	25	11	5	1	3	2	0	0	66
1997	0	0	12	33	10	7	0	2	0	0	0	64
1998	0	0	20	55	15	8	3	3	0	0	0	104
1999	0	0	10	24	9	7	0	0	0	0	0	50
2000	0	0	3	17	13	5	4	2	2	1	0	47
2001	0	0	9	30	17	8	4	4	0	2	0	74
2002	1	0	10	34	23	7	6	2	2	0	0	85
2003	0	0	18	60	32	14	3	0	0	0	0	127
2004	0	0	19	37	24	9	5	4	3	0	0	101
2005	0	0	15	48	38	14	7	2	0	0	0	124
2006	0	0	16	56	18	5	7	3	0	0	0	105
2007	0	0	7	39	23	6	1	3	2	0	0	81
2008	0	0	16	37	26	9	3	3	0	0	0	94
2009	0	0	14	38	25	13	3	2	0	0	0	95
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1994	1	0	14	44	33	9	3	2	0	0	0	109
1995	0	0	17	45	8	10	3	4	1	0	0	90
1996	0	0	14	34	14	9	3	4	1	0	0	81
1997	0	0	8	33	17	7	5	2	0	0	0	72
1998	0	1	11	26	13	12	2	1	1	1	0	70
1999	0	0	8	29	23	12	5	3	1	0	0	83
2000	0	0	17	41	19	6	2	2	0	0	0	87
2001	0	0	7	36	16	8	4	4	0	0	0	75
2002	0	0	6	41	24	16	3	8	0	0	0	101
2003	1	0	14	47	19	10	6	6	0	0	0	105
2004	0	0	21	52	28	8	6	4	1	0	0	122
2005	1	0	7	43	29	19	2	6	1	1	0	109
2006	0	0	12	57	27	14	5	2	2	0	0	120
2007	0	0	20	54	23	14	4	11	2	0	0	129
2008	0	0	13	38	25	13	8	6	0	0	0	103
2009	0	0	18	50	23	20	4	4	5	1	0	126

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1994	0	1	29	71	57	15	7	11	1	1	0	199
1995	0	0	20	62	38	13	5	3	2	0	0	148
1996	0	0	25	70	28	20	5	7	2	1	0	158
1997	0	0	21	80	28	24	10	9	1	3	0	177
1998	0	1	31	73	46	24	20	11	2	2	0	211
1999	2	0	32	99	43	19	11	12	2	1	0	222
2000	0	0	31	87	53	14	12	18	4	1	0	222
2001	0	0	32	141	75	43	10	14	6	3	0	325
2002	0	0	31	127	77	30	18	17	2	1	0	303
2003	0	0	34	165	86	50	30	18	3	1	0	389
2004	0	0	42	150	99	43	15	14	4	2	0	372
2005	0	1	29	171	92	39	27	16	7	1	0	385
2006	0	0	32	149	111	41	16	25	9	4	0	388
2007	0	0	47	137	108	34	20	24	10	4	0	384
2008	0	1	54	146	109	47	30	26	9	4	0	427
2009	1	0	47	173	108	29	13	19	9	0	0	400
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1994	0	0	21	51	38	17	9	6	0	1	0	145
1995	0	0	22	51	18	15	9	10	0	1	0	126
1996	0	0	16	34	20	11	8	6	0	0	0	95
1997	0	0	12	38	21	7	7	1	0	0	0	88
1998	0	0	23	60	26	14	6	6	0	0	0	139
1999	0	0	17	48	18	5	7	9	1	0	0	105
2000	0	0	26	61	22	14	4	8	3	2	0	141
2001	0	2	33	87	35	18	7	7	1	0	0	191
2002	0	0	34	102	51	13	6	6	1	2	0	217
2003	0	0	38	114	44	17	12	9	1	0	0	237
2004	0	0	37	147	79	25	16	12	1	1	0	318
2005	0	0	44	148	81	33	17	13	2	0	0	339
2006	0	0	52	112	86	34	22	15	3	1	0	325
2007	0	0	49	118	81	45	17	13	3	0	0	326
2008	0	0	58	133	82	28	20	17	2	0	0	341
2009	0	0	67	148	72	24	15	20	5	2	0	353

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1994	0	0	15	34	14	8	6	3	2	1	0	83
1995	0	0	18	34	10	5	1	3	1	0	0	73
1996	0	0	3	31	12	11	4	6	2	0	0	69
1997	0	0	15	31	14	5	9	1	0	0	0	75
1998	0	0	13	48	22	6	6	2	0	0	0	97
1999	0	0	13	41	17	13	7	4	2	0	0	97
2000	0	0	12	51	19	11	6	5	3	0	0	107
2001	0	0	20	53	29	11	6	9	2	1	0	131
2002	0	0	21	74	26	10	6	10	1	0	0	148
2003	0	0	18	82	43	16	5	6	2	0	0	172
2004	0	0	27	69	40	17	11	6	4	1	0	175
2005	0	0	14	72	58	14	9	6	4	1	0	178
2006	0	1	11	51	44	15	12	8	0	1	0	143
2007	0	0	11	60	38	21	5	12	2	1	0	150
2008	0	0	26	80	47	20	5	6	3	0	0	187
2009	0	0	37	67	48	17	8	6	7	0	0	190
06 - Montréal-Centre												
1994	0	0	75	140	104	66	27	27	3	3	0	458
1995	0	2	59	130	93	72	34	27	6	2	0	435
1996	0	0	57	130	106	73	29	24	6	2	0	444
1997	0	0	56	143	116	73	38	28	7	0	0	481
1998	0	0	60	194	127	79	57	22	8	0	0	568
1999	1	2	68	243	141	117	65	44	9	1	0	703
2000	0	0	78	197	125	86	76	52	4	0	0	633
2001	1	1	77	299	212	130	82	75	11	4	0	902
2002	0	0	73	332	227	147	86	81	14	6	0	969
2003	0	0	92	305	256	155	107	74	19	5	0	1 019
2004	0	0	74	290	225	136	84	81	29	4	0	927
2005	1	0	71	298	261	162	98	118	31	8	0	1 058
2006	0	0	79	337	267	140	102	125	40	11	0	1 106
2007	1	2	119	372	297	192	122	141	51	11	0	1 313
2008	0	0	149	464	325	196	141	148	52	6	0	1 486
2009	1	2	150	458	352	212	132	150	51	8	0	1 528

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1994	0	0	11	25	13	11	5	2	0	0	0	68
1995	0	0	16	25	8	3	4	4	0	0	0	60
1996	1	0	10	19	14	2	0	3	0	0	0	50
1997	0	1	5	18	14	4	3	2	1	0	0	50
1998	0	0	7	17	10	9	5	7	4	0	0	59
1999	0	1	12	25	21	7	3	3	0	0	0	72
2000	0	0	11	37	19	14	5	4	0	0	0	92
2001	0	1	11	48	28	13	9	9	1	0	0	120
2002	0	0	16	64	21	11	3	15	1	1	0	134
2003	0	0	21	48	21	12	6	9	4	0	0	122
2004	0	0	13	59	29	16	9	7	3	0	0	136
2005	0	0	12	72	44	16	11	8	3	0	0	167
2006	0	0	33	59	31	21	7	13	1	0	0	165
2007	0	0	26	76	54	25	6	9	2	1	0	199
2008	0	0	34	100	55	24	9	12	1	0	0	235
2009	0	2	48	83	46	17	14	15	2	4	0	231
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1994	0	0	30	32	11	14	4	2	1	1	0	95
1995	0	0	24	23	13	11	2	6	2	0	0	81
1996	0	0	10	34	10	12	2	1	1	1	0	71
1997	0	0	16	16	7	4	2	1	1	0	0	47
1998	0	0	14	17	12	5	0	1	0	0	0	49
1999	0	0	9	18	9	4	3	2	0	0	0	46
2000	0	0	6	17	11	6	3	4	0	0	0	47
2001	0	0	8	20	9	5	3	4	0	0	0	49
2002	0	0	15	26	14	4	5	4	1	0	0	69
2003	0	0	18	30	16	4	2	3	0	0	0	75
2004	0	0	13	30	25	10	1	2	0	0	0	82
2005	0	0	19	38	19	13	1	1	3	0	0	96
2006	0	0	10	30	17	5	1	5	0	0	0	68
2007	0	0	18	43	13	5	4	3	2	0	0	88
2008	0	1	11	29	20	5	3	3	1	0	0	73
2009	0	0	14	33	19	10	2	6	0	1	0	85

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1994	1	0	21	15	16	11	5	5	0	0	0	74
1995	1	1	11	24	16	10	1	1	0	0	0	65
1996	0	0	18	20	10	10	4	1	0	0	0	63
1997	0	1	14	26	11	7	3	2	1	0	0	66
1998	1	1	7	24	16	3	1	1	0	1	0	55
1999	0	0	16	25	12	4	2	3	0	0	0	62
2000	0	1	14	24	14	8	2	3	1	0	0	67
2001	0	1	4	13	14	4	0	2	0	0	0	38
2002	0	0	13	26	11	3	4	3	0	0	0	61
2003	0	0	17	32	12	5	1	1	1	0	0	70
2004	0	2	20	32	20	11	7	3	1	0	0	96
2005	0	1	22	33	16	8	4	3	0	0	0	87
2006	0	1	15	25	13	6	3	3	0	0	0	66
2007	0	0	21	20	10	12	2	3	0	1	0	69
2008	0	1	15	24	11	5	0	1	0	0	0	57
2009	0	1	11	19	9	2	2	5	0	0	0	49
10 - Nord-du-Québec												
1994	0	0	3	7	3	3	0	0	0	0	0	17
1995	0	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	6
1996	0	0	0	4	1	2	0	0	1	0	0	8
1997	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1999	0	0	0	4	1	0	1	1	0	0	0	7
2000	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4
2001	0	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	7
2002	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	5
2003	0	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	8
2004	1	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	9
2005	0	1	0	1	4	3	1	0	0	0	0	10
2006	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	5
2007	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	6
2008	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2009	0	0	1	2	1	3	0	1	0	0	0	8

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1994	0	0	5	6	6	4	2	3	1	0	0	29
1995	0	0	2	5	4	3	4	0	0	0	0	18
1996	0	0	2	3	2	1	1	1	0	0	0	10
1997	1	0	2	2	2	2	1	3	0	0	0	14
1998	0	0	0	4	2	2	1	0	0	0	0	9
1999	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
2000	0	0	4	7	4	0	1	0	0	0	0	16
2001	0	0	4	14	3	2	1	0	0	1	0	25
2002	0	0	3	11	4	3	2	1	0	0	0	25
2003	0	0	6	10	3	6	2	3	0	0	0	30
2004	0	0	2	9	6	2	2	1	0	0	0	23
2005	0	0	2	9	9	2	2	0	0	0	0	24
2006	0	0	0	12	6	2	1	2	0	0	0	27
2007	0	0	4	7	5	4	2	1	1	0	0	24
2008	0	0	5	9	9	1	1	3	2	0	0	32
2009	0	0	5	12	9	4	1	3	0	0	0	34
12 - Chaudière-Appalaches												
1994	0	0	10	21	11	11	5	4	0	0	0	65
1995	0	0	8	19	9	5	2	2	1	0	0	46
1996	0	0	6	28	13	7	5	0	0	0	0	59
1997	0	0	9	21	17	9	6	1	1	0	0	66
1998	0	0	8	29	10	7	3	3	0	0	0	60
1999	0	0	11	34	9	4	2	4	1	0	0	66
2000	0	0	4	38	16	9	4	5	0	1	0	77
2001	0	0	10	44	24	9	5	1	0	0	0	94
2002	0	0	11	50	23	12	4	3	1	0	0	104
2003	0	1	14	59	33	13	4	3	1	0	0	128
2004	0	0	24	56	33	14	6	8	0	0	0	141
2005	0	0	12	42	41	14	7	9	3	2	0	130
2006	0	0	12	42	44	14	12	5	1	1	0	131
2007	0	0	6	42	29	12	4	5	2	2	0	102
2008	0	0	12	38	35	18	8	8	1	0	0	120
2009	0	0	28	57	43	19	7	8	3	1	0	166

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1994	1	0	23	29	13	6	2	4	2	1	0	81
1995	0	0	16	28	14	6	2	3	0	0	0	70
1996	0	0	15	19	6	3	3	3	0	1	0	50
1997	0	1	9	19	10	5	1	1	1	0	0	47
1998	0	1	14	33	19	8	6	2	1	0	0	84
1999	0	0	11	34	15	13	4	9	2	0	0	88
2000	0	0	15	35	27	12	5	4	3	0	0	101
2001	0	0	14	49	30	12	4	9	0	0	0	118
2002	0	0	20	52	27	12	13	6	2	0	0	132
2003	0	0	20	65	34	11	7	9	4	0	0	150
2004	0	0	28	71	40	17	8	8	2	0	0	174
2005	0	0	26	67	46	15	10	11	3	1	0	179
2006	0	0	35	86	37	15	13	6	1	2	0	195
2007	0	0	24	73	41	27	14	10	3	2	0	195
2008	0	0	47	92	59	25	11	15	4	0	0	253
2009	0	0	38	99	50	25	14	16	5	0	0	247
14 - Lanaudière												
1994	0	0	15	24	19	9	8	9	1	1	0	88
1995	1	1	17	26	5	3	2	3	1	0	0	60
1996	0	0	17	27	8	5	1	3	0	0	0	61
1997	0	0	13	24	5	3	3	1	0	0	0	51
1998	0	0	14	28	17	1	4	1	1	0	0	66
1999	0	0	16	45	27	11	1	5	1	0	0	107
2000	0	0	18	41	14	10	3	3	1	0	0	90
2001	0	0	26	45	24	6	12	8	1	0	0	122
2002	0	0	17	34	27	6	7	6	1	0	0	98
2003	0	0	19	53	20	14	8	4	2	1	0	121
2004	0	0	12	54	28	19	10	11	1	1	0	136
2005	0	0	29	38	35	13	5	7	1	1	0	129
2006	0	1	33	74	42	19	8	8	2	0	0	187
2007	0	0	29	65	35	27	8	9	3	2	0	178
2008	0	1	45	82	48	17	9	6	3	0	0	211
2009	0	0	59	104	43	22	13	9	5	0	0	255

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1994	0	0	31	50	29	8	9	7	2	0	0	138
1995	0	0	18	41	24	10	10	5	0	0	0	108
1996	0	0	11	37	17	6	8	2	5	0	0	86
1997	0	0	13	21	14	3	7	3	1	0	0	62
1998	0	1	13	35	15	7	12	9	2	1	0	95
1999	0	0	20	48	19	6	4	3	0	1	0	101
2000	0	1	20	55	23	11	3	4	1	0	0	118
2001	0	0	32	57	27	16	8	7	2	1	0	150
2002	0	0	37	63	42	22	9	9	2	0	0	184
2003	0	0	45	92	35	28	12	7	2	3	0	224
2004	0	0	42	114	48	22	17	14	2	0	0	259
2005	0	0	32	92	52	30	13	13	9	1	0	242
2006	0	0	47	105	40	29	13	9	2	0	0	246
2007	0	0	34	102	57	25	12	11	6	0	0	247
2008	0	1	45	122	54	15	21	9	3	1	0	271
2009	0	1	60	128	73	21	21	16	7	0	0	328
16 - Montérégie												
1994	0	1	66	93	57	24	13	13	6	1	0	278
1995	0	0	48	84	50	24	8	13	2	2	0	233
1996	0	0	39	73	36	23	6	11	2	0	0	193
1997	0	0	36	63	43	21	6	7	5	1	0	182
1998	0	1	37	102	38	18	10	9	2	0	0	217
1999	0	0	40	98	49	28	13	12	1	0	0	241
2000	0	0	50	126	49	21	21	9	4	0	0	281
2001	0	0	49	155	69	33	21	9	2	1	0	339
2002	0	0	51	130	66	31	13	18	5	0	0	314
2003	1	0	60	153	76	34	14	17	2	2	0	359
2004	1	1	64	173	105	38	28	18	3	1	0	433
2005	0	0	56	135	86	50	25	20	7	3	0	382
2006	0	0	58	157	92	39	34	29	7	2	0	419
2007	0	1	78	179	112	48	22	31	8	2	0	481
2008	0	0	96	212	127	67	31	25	8	4	0	570
2009	0	1	118	248	137	80	31	35	9	2	0	661

Tableau 5 Nombre de cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1994	0	2	11	19	10	4	0	2	1	0	0	49
1995	0	1	7	17	7	8	6	3	0	0	0	49
1996	0	0	7	20	20	9	6	1	1	0	0	64
1997	0	0	9	20	12	16	6	1	1	0	0	65
1998	0	0	16	11	12	13	12	6	0	0	0	71
1999	0	0	12	27	10	12	8	4	0	1	0	75
2000	0	0	13	21	11	7	5	8	1	0	0	66
2001	0	0	21	28	16	6	9	5	2	1	0	88
2002	0	0	22	25	12	9	8	4	1	0	0	81
2003	0	2	14	23	19	8	1	9	2	0	0	78
2004	0	0	9	26	20	7	3	7	1	1	0	74
2005	0	0	14	25	14	8	7	3	2	0	0	73
2006	0	0	14	21	16	10	3	3	2	0	0	69
2007	0	0	17	29	18	8	9	4	2	0	0	87
2008	0	0	30	23	22	8	9	3	0	0	0	95
2009	0	0	14	26	9	11	9	3	1	0	0	73
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1994	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1995	0	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	8
1996	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	7
1997	0	0	2	4	3	0	1	0	0	0	0	10
1998	0	0	3	4	5	1	1	0	0	0	0	14
1999	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	6
2000	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
2001	0	0	6	3	3	0	0	0	0	0	0	12
2002	0	0	2	5	5	4	0	2	0	0	0	18
2003	0	0	7	7	5	2	2	0	0	0	0	23
2004	0	0	11	13	5	2	3	2	2	0	0	38
2005	0	0	9	10	6	7	1	0	0	0	0	33
2006	0	0	16	13	6	4	1	0	1	0	0	42
2007	0	0	17	12	5	4	2	0	0	1	0	41
2008	0	0	21	19	4	12	3	0	0	0	0	60
2009	0	0	15	27	12	4	5	1	1	0	0	65

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Ensemble du Québec*											
1994	2,7	12,5	545,5	552,5	212,4	91,2	50,5	22,2	6,1	1,5	109,8
1995	1,7	8,9	468,4	536,8	202,5	80,7	34,6	15,6	4,8	1,1	97,5
1996	0,9	7,7	431,3	510,4	188,3	80,6	34,7	16,0	6,6	0,9	91,7
1997	0,9	7,7	429,4	478,7	194,7	72,2	36,4	13,3	4,3	0,9	88,5
1998	1,9	9,0	468,3	550,1	229,1	89,5	41,1	11,6	4,8	1,0	99,0
1999	1,0	8,2	529,9	603,2	248,5	100,3	42,5	16,9	4,8	0,6	108,8
2000	0,5	10,1	594,9	647,4	270,0	102,7	48,8	17,3	6,2	0,9	118,1
2001	0,8	10,6	672,3	746,7	340,9	139,4	54,9	23,1	5,3	1,6	137,5
2002	0,3	11,5	727,1	824,6	365,4	152,4	64,7	24,0	6,1	0,9	148,7
2003	1,9	13,8	809,8	916,3	395,9	180,8	74,0	25,8	7,6	1,1	164,1
2004	1,1	10,6	834,2	954,9	433,5	186,5	81,6	27,1	7,6	1,3	170,5
2005	0,5	10,9	755,7	926,9	450,8	206,8	86,9	30,6	10,7	2,1	167,5
2006	0,8	11,2	740,2	950,5	446,3	196,7	101,7	32,7	10,1	2,1	168,2
2007	0,5	11,6	799,5	977,5	444,6	209,5	106,1	36,2	12,3	2,4	175,2
2008	0,0	13,0	912,5	1 086,0	486,1	223,9	121,3	39,6	11,2	1,4	193,7
2009	0,7	11,6	962,0	1 187,9	491,4	223,1	118,2	43,8	13,2	1,8	203,0
Ensemble du Québec hors Montréal											
1994	3,0	12,9	541,5	596,9	231,3	88,1	51,7	21,1	7,1	1,5	113,0
1995	1,9	7,9	453,6	563,4	215,2	75,3	33,3	15,2	4,7	1,4	97,2
1996	1,1	8,0	423,3	528,0	188,3	75,5	32,7	15,4	6,7	1,1	90,6
1997	1,2	6,9	404,9	477,2	193,2	66,7	33,4	10,8	3,9	0,8	84,2
1998	2,2	8,8	434,3	538,9	230,4	85,4	37,5	11,2	4,1	1,2	93,9
1999	1,0	7,9	486,3	574,9	240,9	86,2	33,6	14,1	4,3	0,7	99,7
2000	0,3	10,1	552,3	644,3	266,6	94,4	38,6	13,9	6,4	1,1	110,7
2001	0,7	10,3	647,7	730,1	326,5	120,3	45,4	18,0	4,7	1,6	128,0
2002	0,4	12,3	719,6	808,9	357,4	132,6	53,8	19,6	5,1	0,5	140,5
2003	2,6	12,4	814,6	920,2	383,4	166,5	58,7	22,1	6,3	1,0	157,3
2004	1,1	9,9	858,9	1 005,0	443,0	179,6	76,1	22,6	5,4	1,1	169,8
2005	0,4	11,5	760,7	975,6	463,0	195,0	78,3	23,2	8,2	1,4	163,8
2006	0,7	11,7	735,9	981,8	453,2	181,9	91,3	25,0	6,9	1,6	161,9
2007	0,3	11,4	793,8	1 007,6	446,3	189,8	86,5	26,8	8,3	2,1	167,2
2008	0,0	13,3	913,4	1 089,7	487,5	204,7	95,7	29,4	7,0	1,3	184,5
2009	0,6	10,7	985,2	1 205,3	486,2	202,5	98,9	34,0	9,6	1,6	196,2

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1994	0,0	3,4	375,8	760,4	186,4	103,7	63,0	15,3	4,9	0,0	103,1
1995	0,0	0,0	455,1	694,5	242,4	36,2	26,6	11,9	0,0	0,0	98,6
1996	0,0	3,6	321,5	490,7	159,0	77,7	26,8	8,7	13,3	0,0	78,1
1997	0,0	7,5	350,9	625,7	209,1	82,3	11,1	5,7	0,0	0,0	87,4
1998	19,7	0,0	525,9	767,0	268,4	111,7	28,6	22,3	0,0	0,0	119,5
1999	10,3	0,0	328,9	416,5	159,5	79,6	17,6	8,3	0,0	0,0	70,6
2000	0,0	4,1	201,4	433,5	242,3	68,5	48,9	11,1	10,8	2,5	68,7
2001	0,0	0,0	370,7	557,1	259,2	134,3	45,6	16,6	0,0	9,7	93,0
2002	11,5	0,0	396,4	686,9	433,3	130,5	48,6	19,4	10,0	0,0	114,4
2003	11,7	4,4	574,4	935,8	550,5	190,1	37,5	11,1	0,0	0,0	145,1
2004	0,0	4,5	607,4	806,2	267,2	184,5	72,3	28,3	9,4	0,0	127,0
2005	0,0	9,3	638,2	891,6	535,8	269,6	103,5	17,3	0,0	0,0	150,3
2006	0,0	9,7	422,3	1 054,6	357,2	114,0	90,4	11,9	0,0	0,0	124,5
2007	0,0	5,0	484,9	694,3	355,4	104,2	37,4	18,6	5,8	0,0	104,4
2008	0,0	10,3	509,5	766,6	483,3	128,3	57,1	13,1	2,8	0,0	117,3
2009	0,0	0,0	659,9	831,3	465,5	198,1	38,6	24,0	0,0	0,0	130,7
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1994	5,3	13,4	544,5	877,3	313,2	80,4	46,4	18,1	0,0	0,0	141,8
1995	5,6	7,0	514,9	798,0	233,6	100,0	18,0	15,4	6,6	2,4	127,9
1996	0,0	14,5	606,2	645,9	208,3	69,1	29,1	12,9	6,4	0,0	123,7
1997	6,2	0,0	342,7	530,1	256,4	51,4	40,8	10,4	0,0	0,0	93,6
1998	0,0	5,1	353,5	483,0	226,9	127,5	30,5	8,1	5,9	4,5	95,5
1999	0,0	2,6	336,8	661,4	404,8	116,5	43,3	12,0	5,7	0,0	113,7
2000	0,0	8,2	581,9	649,3	241,6	89,8	32,8	9,8	2,7	0,0	118,7
2001	0,0	11,2	366,1	601,8	280,1	178,2	30,6	15,6	0,0	0,0	106,6
2002	0,0	0,0	504,8	824,4	365,4	195,5	47,3	19,4	2,5	0,0	137,8
2003	16,0	2,9	698,7	795,4	373,2	139,7	47,1	17,5	9,9	0,0	147,9
2004	0,0	3,0	775,5	897,3	486,9	113,5	91,9	19,7	2,4	0,0	161,5
2005	8,1	0,0	580,6	831,8	406,9	261,0	43,8	18,1	4,7	1,8	141,1
2006	0,0	9,9	536,6	956,3	412,4	198,0	80,5	10,4	6,8	0,0	142,6
2007	0,0	0,0	646,5	990,2	400,5	189,4	70,9	26,2	6,6	0,0	150,9
2008	0,0	0,0	629,3	792,8	434,2	190,8	93,8	18,5	0,0	0,0	136,6
2009	0,0	11,1	700,2	1 036,8	363,7	200,2	65,1	24,4	12,7	1,6	154,5

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1994	2,7	9,5	484,6	585,3	270,2	84,3	58,2	25,3	5,8	1,9	116,3
1995	0,0	5,5	366,1	499,5	198,1	71,9	25,9	12,4	2,8	0,9	87,6
1996	5,6	6,9	358,0	565,6	160,7	70,8	19,1	18,8	6,7	1,8	88,8
1997	2,9	7,0	437,6	596,3	186,4	105,3	31,6	18,6	3,8	3,6	100,5
1998	0,0	7,0	525,2	618,4	272,3	120,3	64,0	13,7	4,8	1,8	115,3
1999	6,4	8,4	564,2	736,4	285,8	116,4	39,6	22,6	7,0	2,6	125,8
2000	3,3	9,8	525,0	679,6	333,6	94,7	60,4	25,2	7,8	2,5	123,4
2001	3,5	4,2	710,4	874,6	438,4	177,5	43,8	28,6	11,9	2,5	159,6
2002	0,0	8,4	627,9	883,7	404,9	170,1	63,7	30,3	7,4	0,8	153,2
2003	0,0	8,5	808,2	1 083,6	488,9	211,7	109,2	35,4	10,3	2,3	190,2
2004	0,0	2,9	926,4	1 103,2	515,0	198,8	64,3	23,9	7,0	2,2	192,4
2005	0,0	23,4	726,2	1 072,3	507,7	192,0	128,4	31,3	12,8	1,5	185,1
2006	0,0	6,0	727,7	1 109,9	521,4	217,6	101,0	41,9	17,4	3,5	189,3
2007	0,0	9,3	681,8	1 104,6	516,4	181,6	88,3	36,4	14,3	4,0	179,6
2008	0,0	6,4	869,1	1 118,7	508,3	220,2	140,8	34,5	12,1	3,9	194,5
2009	3,1	8,2	929,9	1 296,1	496,5	182,8	86,2	36,5	11,1	1,3	200,0
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1994	0,0	4,7	463,4	571,9	273,0	104,3	51,5	21,8	2,0	3,5	103,5
1995	0,0	6,3	362,6	529,0	153,0	89,9	37,6	22,6	1,9	1,1	82,5
1996	0,0	9,7	374,2	475,8	220,0	75,0	42,6	23,5	3,7	2,3	85,4
1997	0,0	4,9	342,7	426,8	179,0	42,5	26,1	3,8	0,0	1,1	70,5
1998	0,0	8,3	345,9	641,2	271,0	87,7	24,1	10,0	1,7	0,0	94,1
1999	0,0	1,7	336,7	540,5	218,1	48,6	29,6	14,8	4,8	0,0	82,4
2000	0,0	10,2	506,9	664,1	264,6	96,4	12,7	12,2	9,3	2,1	106,9
2001	0,0	13,8	680,6	731,9	348,0	108,3	42,6	17,0	4,5	0,0	129,5
2002	0,0	10,5	827,3	960,5	416,2	94,2	33,8	15,7	1,5	2,0	155,4
2003	0,0	15,9	1 002,8	1 086,5	470,5	186,9	75,0	19,3	1,4	0,0	184,8
2004	4,7	14,3	1 054,4	1 349,4	635,5	228,3	92,8	23,0	5,5	1,0	217,5
2005	0,0	14,7	927,3	1 308,4	678,3	282,0	122,2	23,2	6,7	0,9	212,0
2006	0,0	17,0	873,3	1 268,5	673,7	275,3	160,3	38,5	5,3	3,6	208,7
2007	0,0	17,5	911,7	1 149,3	602,1	344,7	150,9	31,9	5,1	0,0	199,8
2008	0,0	20,0	1 113,1	1 297,2	594,5	211,4	132,2	46,4	3,8	0,0	213,8
2009	0,0	10,3	1 171,8	1 381,3	493,6	189,6	130,1	49,5	8,6	2,5	213,6

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1994	0,0	21,2	492,2	653,7	146,2	90,4	51,0	11,9	10,7	2,1	107,2
1995	0,0	2,7	534,6	634,7	221,2	65,8	33,8	18,6	13,6	4,1	111,2
1996	0,0	2,7	430,0	619,3	248,3	91,2	46,4	31,9	6,5	0,0	107,2
1997	0,0	2,7	458,5	536,1	236,3	51,7	72,1	6,7	3,1	0,0	97,3
1998	0,0	2,7	439,7	630,1	233,6	89,1	59,2	10,9	0,0	0,0	103,4
1999	0,0	0,0	468,5	713,4	236,9	99,4	55,1	21,7	8,3	0,0	113,6
2000	0,0	2,7	596,3	827,5	264,3	115,1	38,6	12,8	10,5	0,0	130,2
2001	0,0	8,1	739,2	826,8	365,3	154,8	31,0	27,5	7,6	3,7	150,3
2002	0,0	24,5	780,8	1 011,7	370,5	154,9	50,3	27,3	7,3	0,0	168,8
2003	0,0	10,9	882,8	1 200,9	475,6	181,7	57,8	27,0	4,8	0,0	194,2
2004	0,0	8,3	1 008,8	1 066,2	482,3	266,6	85,9	20,7	11,6	1,7	199,7
2005	0,0	8,4	762,3	1 160,7	558,1	210,9	63,7	27,0	11,3	1,6	190,6
2006	0,0	5,7	590,9	851,7	519,0	267,0	108,6	23,2	8,9	3,2	160,1
2007	0,0	8,9	752,6	988,7	415,7	156,7	108,1	38,7	6,5	3,1	167,9
2008	0,0	15,1	881,4	1 263,2	593,7	259,1	115,7	26,4	8,6	0,0	209,8
2009	0,0	9,3	1 174,7	1 377,0	552,6	231,7	87,1	24,8	16,9	0,0	228,5
06 - Montréal-Centre											
1994	1,8	10,9	561,2	441,4	167,8	100,7	46,6	25,9	3,2	1,4	100,3
1995	0,9	13,1	525,7	469,4	173,2	96,6	38,8	16,9	5,2	0,6	98,4
1996	0,0	6,5	462,5	464,6	188,4	95,3	41,5	17,9	6,2	0,6	95,1
1997	0,0	10,8	524,2	482,6	198,1	87,5	46,3	21,5	5,5	1,1	101,5
1998	1,0	9,6	596,2	580,7	226,2	100,4	52,9	13,0	7,4	0,6	114,5
1999	1,0	9,4	692,3	679,1	265,6	136,9	71,3	26,3	6,2	0,6	136,6
2000	1,0	9,8	752,3	655,4	277,6	123,7	80,7	29,1	5,6	0,3	140,3
2001	1,0	11,7	762,7	788,3	372,4	186,4	83,6	40,1	7,3	1,7	165,9
2002	0,0	8,5	754,1	864,2	382,5	199,5	96,9	39,0	9,8	1,9	173,2
2003	0,0	18,6	792,8	906,4	422,8	214,1	118,3	38,4	12,2	1,4	184,5
2004	1,0	13,2	746,5	825,8	412,7	202,5	97,0	42,4	15,4	1,9	172,5
2005	1,1	8,8	737,4	802,6	423,8	234,5	110,5	55,8	19,4	4,1	178,7
2006	1,1	9,5	756,3	871,6	431,2	232,6	129,7	59,2	21,7	3,5	187,6
2007	1,0	12,3	821,1	900,7	440,9	257,1	158,2	68,3	26,8	3,5	199,9
2008	0,0	11,9	909,4	1 076,2	483,0	270,2	188,6	73,7	26,9	1,8	222,4
2009	1,0	14,8	875,2	1 141,6	503,2	273,0	168,7	76,0	26,3	2,6	224,2

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1994	0,0	7,1	604,0	604,3	231,7	100,7	66,9	35,9	6,9	0,0	123,5
1995	0,0	2,3	492,6	623,0	189,3	81,7	65,6	24,5	6,6	0,0	107,1
1996	9,0	6,9	477,0	479,7	186,2	53,3	22,7	11,9	0,0	0,0	89,2
1997	0,0	6,8	353,6	452,4	175,5	48,3	35,6	7,7	3,0	0,0	75,5
1998	5,0	8,9	393,9	492,7	240,8	61,9	32,4	13,2	19,7	0,0	88,4
1999	0,0	4,4	666,4	576,2	283,6	81,7	26,0	9,2	0,0	0,0	110,5
2000	0,0	17,8	543,3	705,3	272,0	107,4	49,1	12,5	2,6	0,0	116,6
2001	0,0	6,7	664,1	904,9	352,5	144,2	53,5	22,7	4,9	0,0	145,2
2002	0,0	6,7	836,9	966,4	341,9	107,6	44,4	32,3	2,4	2,1	158,3
2003	0,0	2,2	793,5	885,9	326,7	146,9	35,4	24,8	9,1	0,0	149,0
2004	0,0	4,5	786,7	961,7	415,4	202,3	70,4	21,1	8,7	0,0	166,2
2005	0,0	0,0	672,1	1 161,6	474,6	129,1	104,5	22,4	6,2	1,9	172,5
2006	0,0	7,0	852,0	951,5	420,1	178,3	71,8	28,7	4,0	0,0	169,6
2007	0,0	14,4	942,2	1 109,7	605,3	199,1	73,2	32,2	3,9	1,7	202,3
2008	0,0	9,8	1 032,1	1 280,1	584,2	268,9	77,7	42,5	3,8	0,0	223,7
2009	5,1	20,1	1 200,6	1 406,8	563,4	193,7	89,9	43,3	9,2	7,8	241,6
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1994	8,7	29,4	1 290,2	927,5	409,2	214,5	95,6	26,3	21,7	4,9	232,4
1995	0,0	16,9	915,1	766,4	427,4	162,1	54,2	46,6	13,9	0,0	182,8
1996	0,0	4,3	875,1	1 000,8	229,1	205,5	53,6	20,7	13,3	4,8	179,0
1997	0,0	26,0	810,8	606,8	295,2	76,9	40,6	12,1	6,3	0,0	140,0
1998	0,0	8,8	782,7	574,5	235,7	123,2	6,9	3,9	0,0	0,0	126,5
1999	0,0	18,1	615,9	507,8	238,1	105,7	21,7	11,6	17,2	0,0	112,8
2000	0,0	32,5	804,8	919,3	383,1	163,7	22,4	19,1	16,6	0,0	166,9
2001	0,0	14,3	802,7	946,8	356,1	125,2	47,3	22,8	5,4	0,0	159,5
2002	0,0	29,1	1 153,1	1 032,4	380,3	196,1	84,0	22,7	5,2	0,0	198,1
2003	0,0	29,6	1 080,4	1 205,6	490,7	202,7	63,2	34,1	0,0	0,0	208,6
2004	0,0	40,8	959,8	1 206,0	605,1	279,4	86,7	15,2	4,9	0,0	210,3
2005	0,0	31,6	938,3	1 459,0	664,3	343,1	72,7	7,7	18,9	0,0	229,4
2006	0,0	21,9	1 044,1	1 277,4	618,6	201,3	141,8	23,5	0,0	0,0	216,7
2007	0,0	16,9	1 127,7	1 536,0	553,6	153,5	122,7	32,2	17,9	7,4	234,7
2008	0,0	23,3	1 003,2	1 052,2	608,7	290,4	160,3	20,9	8,7	0,0	206,3
2009	0,0	18,0	877,6	968,8	491,7	286,0	140,9	34,9	0,0	3,4	184,1

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1994	27,0	73,1	1 363,5	1 131,8	581,3	242,6	91,8	48,9	9,2	0,0	287,9
1995	41,3	33,7	1 322,2	1 164,6	686,3	203,4	61,3	17,9	0,0	8,8	275,4
1996	0,0	34,3	1 108,8	1 279,7	439,7	262,5	90,1	11,7	0,0	0,0	249,4
1997	14,9	41,6	949,0	976,8	378,2	150,9	91,5	11,5	8,5	0,0	203,2
1998	15,6	56,0	955,7	1 039,0	573,4	207,4	61,7	17,2	0,0	8,0	220,6
1999	0,0	49,7	1 461,2	1 159,0	493,2	281,9	73,5	34,0	0,0	0,0	261,2
2000	0,0	36,3	1 299,8	1 051,5	563,1	266,4	53,4	28,3	7,7	7,4	237,0
2001	0,0	44,5	994,5	1 087,3	671,6	129,9	44,4	28,0	0,0	7,2	207,1
2002	0,0	53,1	1 371,7	1 358,2	621,7	183,3	70,0	33,7	0,0	0,0	252,8
2003	0,0	54,1	1 548,5	1 657,1	652,5	252,4	62,5	33,6	7,2	0,0	283,4
2004	0,0	47,4	1 788,3	1 830,6	899,2	386,9	212,1	28,1	7,0	0,0	338,6
2005	0,0	64,8	1 933,7	1 526,7	818,1	447,1	126,8	56,4	6,9	0,0	326,4
2006	0,0	100,5	1 367,9	1 535,8	734,4	199,9	119,5	45,6	0,0	0,0	268,2
2007	0,0	113,9	1 872,1	1 704,9	661,6	402,1	93,5	29,3	6,7	5,8	317,7
2008	0,0	82,3	1 651,4	1 652,1	625,7	216,4	65,1	36,3	13,2	0,0	281,2
2009	0,0	65,8	1 628,3	1 459,2	565,5	217,0	83,9	43,8	0,0	5,4	262,4
10 - Nord-du-Québec											
1994	64,1	30,9	966,2	923,8	439,4	193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	218,5
1995	0,0	0,0	1 244,8	529,5	0,0	100,8	105,1	34,3	0,0	0,0	180,0
1996	0,0	0,0	362,1	760,5	204,4	156,2	0,0	0,0	53,2	0,0	123,1
1997	0,0	0,0	507,3	76,6	143,2	55,6	52,1	0,0	0,0	0,0	70,7
1998	0,0	0,0	456,9	230,6	0,0	61,2	52,3	33,6	0,0	0,0	72,3
1999	0,0	0,0	486,4	695,0	237,5	0,0	107,3	32,6	0,0	0,0	124,6
2000	0,0	38,6	588,7	317,0	82,0	0,0	56,6	31,7	0,0	0,0	93,0
2001	0,0	0,0	552,1	495,0	86,3	0,0	62,4	31,7	0,0	0,0	96,2
2002	0,0	0,0	1 035,0	702,4	177,3	175,3	67,6	0,0	0,0	0,0	159,9
2003	0,0	0,0	1 170,6	1 348,9	462,1	0,0	0,0	0,0	46,8	0,0	219,4
2004	109,8	0,0	1 173,3	1 112,1	849,1	375,9	80,1	0,0	0,0	0,0	256,1
2005	0,0	47,8	931,1	1 556,4	675,0	297,0	181,3	0,0	0,0	0,0	254,4
2006	0,0	0,0	754,7	1 575,6	309,9	207,0	96,2	32,7	0,0	0,0	200,2
2007	0,0	52,2	584,8	1 452,3	295,6	302,1	204,7	0,0	0,0	0,0	194,1
2008	0,0	0,0	693,1	434,3	0,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,2
2009	0,0	0,0	1 306,5	1 148,1	519,8	609,1	0,0	39,0	0,0	0,0	240,4

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1994	0,0	13,9	356,0	470,3	229,2	140,5	71,6	35,7	9,0	0,0	100,9
1995	0,0	7,1	264,3	431,0	121,5	133,8	61,9	0,0	8,7	5,4	74,5
1996	0,0	7,3	281,2	467,5	80,5	93,7	20,6	5,7	0,0	0,0	65,8
1997	17,8	7,5	248,7	188,3	168,9	37,0	31,8	28,1	0,0	0,0	53,1
1998	0,0	0,0	110,3	143,5	124,6	40,3	10,9	11,1	7,7	0,0	29,8
1999	0,0	8,0	86,8	152,9	75,1	29,5	0,0	5,6	0,0	0,0	22,5
2000	0,0	0,0	362,3	355,3	239,7	0,0	35,3	0,0	0,0	0,0	60,0
2001	0,0	17,0	499,9	613,1	126,7	121,6	62,8	5,6	6,9	4,9	89,3
2002	0,0	0,0	359,4	1 057,6	134,9	128,8	53,5	5,6	0,0	0,0	97,8
2003	0,0	26,9	801,4	680,1	279,9	173,5	72,3	17,0	0,0	0,0	119,6
2004	0,0	9,3	765,9	868,6	515,0	199,1	62,0	28,7	0,0	0,0	137,7
2005	0,0	9,6	553,5	799,5	623,6	61,6	66,8	0,0	0,0	0,0	113,1
2006	0,0	10,2	491,5	845,0	559,2	83,9	17,9	12,0	0,0	0,0	115,6
2007	0,0	0,0	669,2	606,7	253,8	156,3	75,6	18,4	17,7	0,0	104,5
2008	0,0	0,0	498,7	719,6	589,9	87,1	78,2	19,3	11,6	0,0	114,2
2009	0,0	0,0	843,3	1 025,8	422,4	294,8	40,6	20,1	0,0	0,0	140,6
12 - Chaudière-Appalaches											
1994	0,0	1,8	250,6	288,9	159,1	66,6	35,2	15,1	0,0	0,0	60,1
1995	0,0	0,0	142,3	258,5	142,5	34,1	14,7	4,9	5,1	0,0	41,9
1996	0,0	1,9	218,7	331,7	140,6	67,6	35,1	4,8	0,0	1,6	56,8
1997	0,0	0,0	233,1	285,9	138,9	53,9	35,5	3,1	2,3	0,0	54,5
1998	4,6	3,8	206,7	361,1	153,7	78,4	14,9	7,8	2,2	0,0	59,5
1999	0,0	0,0	234,8	381,2	127,2	33,9	21,0	12,3	2,1	0,0	58,3
2000	0,0	0,0	262,2	391,0	191,6	59,2	24,5	13,7	3,9	3,0	67,9
2001	5,0	4,0	299,2	514,7	215,3	57,2	19,0	9,1	0,0	0,0	78,0
2002	0,0	2,0	319,9	498,9	255,5	71,0	39,6	7,5	1,8	0,0	81,5
2003	0,0	6,2	320,9	623,5	265,6	135,9	20,9	9,0	1,8	1,4	93,8
2004	0,0	2,1	434,5	681,9	305,5	140,6	36,9	18,0	1,7	0,0	108,5
2005	0,0	8,6	376,9	629,1	352,1	140,3	58,3	13,5	8,4	3,9	105,8
2006	0,0	0,0	381,4	592,3	350,1	117,2	64,3	16,7	1,6	1,3	99,5
2007	4,9	2,3	310,2	577,4	266,0	122,0	45,3	17,1	4,8	3,6	88,3
2008	0,0	4,6	335,9	525,2	291,7	118,6	66,6	20,8	4,7	2,3	88,8
2009	0,0	7,1	505,4	657,2	324,3	185,9	58,2	21,4	6,2	1,1	112,6

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1994	4,4	9,4	561,3	403,4	133,7	57,5	23,2	10,1	8,1	4,0	85,0
1995	4,4	4,7	387,5	406,1	153,3	52,5	13,0	7,9	2,6	0,0	70,5
1996	0,0	4,7	321,1	310,2	88,3	34,2	25,6	9,7	2,6	1,9	54,3
1997	0,0	9,2	446,9	377,8	128,1	31,8	15,8	11,4	5,0	0,0	69,0
1998	0,0	11,4	423,3	492,1	192,5	67,3	34,5	7,4	4,9	5,3	83,6
1999	0,0	13,5	510,2	475,8	166,2	82,3	25,3	19,8	7,1	0,0	87,6
2000	0,0	6,6	598,8	584,6	278,5	113,7	44,5	10,5	9,3	0,0	108,3
2001	0,0	6,6	545,1	706,1	305,2	106,0	45,6	22,0	4,5	0,0	114,8
2002	0,0	6,4	739,3	764,9	337,5	120,4	89,4	23,1	6,6	0,0	136,1
2003	0,0	2,1	777,1	859,6	308,3	131,0	68,1	28,8	10,9	0,0	142,0
2004	0,0	0,0	813,6	1 021,9	401,6	153,2	73,5	25,1	6,4	0,0	160,4
2005	0,0	2,1	759,3	968,0	481,4	178,4	61,2	32,4	8,3	1,4	162,0
2006	0,0	4,3	825,7	997,3	463,0	114,5	80,0	15,4	6,1	2,8	161,9
2007	0,0	0,0	890,6	980,6	432,5	200,8	88,2	24,6	13,8	2,7	172,6
2008	0,0	6,7	1 018,7	1 063,5	514,7	247,3	63,5	50,9	11,5	0,0	197,7
2009	0,0	9,0	878,8	1 223,0	481,6	184,5	97,8	45,0	14,8	0,0	194,2
14 - Lanaudière											
1994	3,4	7,3	482,0	440,0	192,6	59,9	43,5	27,3	5,4	2,1	86,9
1995	3,5	14,3	309,9	352,5	132,6	33,4	24,0	21,5	5,1	0,0	60,9
1996	0,0	3,5	374,4	406,4	119,4	29,2	26,0	9,7	0,0	0,0	62,5
1997	0,0	1,7	404,3	428,0	106,2	64,1	20,7	14,0	0,0	0,0	70,3
1998	0,0	17,0	379,1	384,2	145,8	35,8	25,8	6,1	2,2	0,0	65,0
1999	0,0	8,4	566,2	638,5	280,7	80,7	23,5	8,8	4,1	0,0	101,9
2000	0,0	11,8	514,8	706,7	237,1	82,4	18,6	7,2	2,0	0,0	98,2
2001	0,0	13,5	534,6	611,8	295,6	69,8	52,6	14,0	1,9	0,0	100,9
2002	0,0	6,7	552,6	608,8	282,6	80,7	37,4	12,3	11,0	0,0	100,4
2003	0,0	23,7	710,8	674,9	314,6	154,9	51,4	17,3	7,1	1,5	125,2
2004	0,0	18,7	626,1	860,9	324,9	150,2	60,2	22,1	1,7	2,9	132,1
2005	0,0	8,7	733,7	805,5	386,3	125,6	59,7	21,6	1,6	1,4	136,6
2006	0,0	8,9	795,4	969,3	413,8	185,1	71,0	19,0	6,3	0,0	157,5
2007	0,0	7,3	724,0	938,0	374,5	201,2	74,8	24,3	6,1	2,5	151,8
2008	0,0	5,6	1 096,4	1 161,2	439,8	172,0	71,4	26,0	5,8	1,2	195,3
2009	0,0	15,2	1 056,0	1 125,9	459,0	197,9	101,8	33,0	9,9	1,1	198,1

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1994	0,0	15,1	612,3	751,5	208,9	49,9	66,5	19,8	14,2	0,0	116,1
1995	0,0	9,9	495,1	653,1	263,7	54,9	59,6	10,3	4,5	0,0	101,8
1996	0,0	9,6	444,8	569,0	165,7	51,3	50,6	7,1	25,3	1,6	86,9
1997	0,0	6,3	400,7	434,8	234,9	30,4	40,8	8,3	5,9	0,0	75,1
1998	0,0	4,6	445,2	554,2	210,6	48,2	51,4	15,9	5,6	1,5	86,6
1999	0,0	10,6	574,2	514,7	196,6	53,9	15,6	9,0	0,0	1,5	87,4
2000	0,0	10,4	666,9	675,5	229,7	83,3	29,0	12,4	8,4	0,0	108,5
2001	0,0	10,3	924,5	818,5	278,2	94,5	38,7	15,6	4,9	1,4	137,0
2002	0,0	14,5	1 035,1	958,2	398,0	171,1	44,3	13,9	4,7	0,0	163,5
2003	0,0	15,8	1 134,0	1 128,9	347,3	169,7	58,0	11,2	4,5	3,8	176,4
2004	0,0	8,6	1 173,6	1 206,2	395,7	157,6	73,1	22,9	7,2	1,2	186,9
2005	0,0	7,3	983,6	1 094,1	386,6	197,1	57,9	27,8	17,9	1,1	171,9
2006	0,0	8,9	877,6	1 114,2	403,5	161,4	81,3	26,5	4,0	0,0	165,7
2007	0,0	6,1	964,0	1 117,9	412,2	176,1	94,1	22,4	9,0	0,0	175,2
2008	0,0	12,5	998,5	1 311,0	449,5	169,3	103,2	20,5	9,9	1,0	193,7
2009	0,0	12,8	1 171,3	1 343,7	514,8	180,3	145,5	37,3	13,2	0,0	219,8
16 - Montérégie											
1994	1,1	9,1	414,1	424,6	143,4	63,5	37,6	15,8	7,6	0,6	81,5
1995	0,0	7,9	387,4	456,6	147,2	51,6	18,6	10,6	3,6	1,1	75,9
1996	0,0	5,6	296,2	356,0	133,5	41,9	15,1	14,3	3,4	0,0	60,8
1997	0,0	4,5	310,9	346,7	123,6	42,9	15,9	8,9	6,5	0,5	59,6
1998	0,0	5,0	370,2	401,3	143,4	42,4	16,8	6,0	1,9	0,5	67,0
1999	0,0	6,1	401,2	434,0	169,3	55,6	22,0	8,2	1,2	0,5	74,5
2000	0,0	8,3	503,1	521,7	180,9	52,8	31,6	9,0	3,5	0,5	88,4
2001	0,0	11,1	579,8	562,1	218,3	84,1	32,7	8,4	2,2	1,0	99,6
2002	0,0	11,0	602,8	555,8	231,7	77,0	25,5	11,3	3,8	0,5	100,0
2003	2,9	7,7	644,2	641,1	254,9	102,1	35,2	15,4	3,2	0,9	111,2
2004	1,5	9,4	680,7	727,4	302,2	109,3	54,4	14,3	2,1	0,9	123,1
2005	0,0	7,4	591,8	646,0	284,1	128,7	34,9	17,5	4,5	1,2	111,4
2006	0,0	9,3	571,3	690,5	287,3	127,6	68,1	17,9	6,4	1,6	115,9
2007	0,0	6,6	659,4	799,0	332,8	129,3	56,6	21,1	5,8	1,1	130,7
2008	0,0	9,8	756,2	930,5	371,4	165,6	68,0	21,0	4,3	1,8	151,2
2009	0,0	5,6	848,8	1 055,3	439,5	174,2	79,1	26,6	8,4	1,7	171,3

Tableau 6 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1994	145,8	512,0	10 923,3	11 803,7	5 628,7	2 395,2	1 612,9	670,2	475,1	234,2	3 151,3
1995	71,4	97,8	8 194,6	10 443,9	6 385,5	5 021,5	2 127,7	636,9	245,7	455,6	2 941,9
1996	0,0	229,3	11 083,7	10 595,2	8 104,9	5 785,1	2 867,4	1 293,7	1 002,5	233,1	3 684,8
1997	0,0	304,7	7 125,3	8 914,3	5 317,9	5 714,3	2 568,5	1 005,0	454,5	227,3	2 808,2
1998	147,9	343,6	5 637,0	6 976,7	4 919,9	4 516,9	4 173,4	855,7	0,0	0,0	2 457,4
1999	0,0	255,4	7 081,5	9 693,3	4 685,7	4 019,5	3 870,0	954,7	986,2	221,7	2 762,8
2000	0,0	80,9	8 091,3	9 090,9	4 540,3	3 584,2	2 398,8	1 148,1	180,8	0,0	2 532,0
2001	0,0	122,7	12 074,3	11 366,5	6 566,8	3 159,2	3 649,6	1 234,6	709,2	214,1	3 401,2
2002	0,0	401,9	11 279,6	11 181,7	7 852,2	4 441,8	4 570,6	1 516,8	164,7	0,0	3 665,2
2003	145,9	360,4	8 620,7	8 651,7	5 042,0	3 796,0	1 939,1	1 862,7	1 302,9	0,0	2 851,9
2004	0,0	79,2	7 025,5	9 539,1	6 771,5	2 542,4	2 592,1	1 518,0	295,0	202,0	2 677,9
2005	0,0	155,8	6 872,2	8 610,0	4 784,7	2 969,1	3 200,0	818,2	554,8	0,0	2 471,3
2006	150,3	77,3	7 585,0	7 827,0	5 429,9	2 870,8	2 116,4	1 049,0	389,6	0,0	2 465,3
2007	0,0	195,5	6 512,8	9 598,4	5 776,2	3 468,2	1 861,7	492,2	400,5	0,0	2 536,8
2008	0,0	357,4	9 672,3	8 073,9	6 033,5	2 470,6	1 832,5	634,9	516,1	177,0	2 776,8
2009	0,0	0,0	6 035,9	7 822,8	4 112,6	3 012,0	2 584,0	390,9	250,0	0,0	2 150,2
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1994	0,0	131,2	3 568,4	2 649,0	1 493,9	811,1	0,0	0,0	0,0	0,0	923,3
1995	0,0	128,7	3 499,6	3 375,2	1 747,9	337,8	0,0	102,6	0,0	0,0	984,7
1996	0,0	166,8	2 681,0	2 836,3	1 165,9	526,3	0,0	101,6	148,8	0,0	780,0
1997	0,0	0,0	2 591,6	2 021,0	1 500,4	306,4	257,7	0,0	0,0	0,0	648,7
1998	0,0	38,7	4 147,5	3 807,1	2 335,6	883,2	130,0	282,0	284,9	0,0	1 141,4
1999	0,0	38,0	2 459,0	2 383,0	1 531,9	397,2	362,8	90,7	0,0	0,0	686,1
2000	0,0	37,0	1 828,2	1 982,8	1 052,6	297,9	355,9	0,0	132,3	0,0	526,1
2001	0,0	0,0	3 108,8	2 164,5	1 453,7	458,3	328,2	157,0	0,0	0,0	699,1
2002	0,0	138,8	2 638,3	2 681,7	1 472,9	786,0	524,1	150,2	114,5	0,0	775,7
2003	0,0	0,0	4 621,8	4 454,1	1 853,3	1 254,2	391,8	71,9	0,0	0,0	1 106,1
2004	0,0	66,9	5 486,3	4 595,7	2 280,1	1 201,0	876,3	401,6	219,5	0,0	1 324,8
2005	0,0	132,5	5 948,6	4 395,6	2 740,9	1 640,6	388,3	0,0	0,0	0,0	1 331,7
2006	0,0	295,0	5 222,1	6 157,6	2 541,0	1 365,5	477,6	0,0	104,3	0,0	1 436,9
2007	0,0	297,5	6 119,4	5 179,6	2 547,2	639,0	947,9	119,3	0,0	193,8	1 408,0
2008	0,0	228,5	6 509,3	5 666,7	2 447,3	1 996,8	819,7	173,0	0,0	0,0	1 562,8
2009	0,0	64,4	5 742,3	7 870,8	2 911,8	1 362,2	518,6	168,7	88,7	0,0	1 574,3

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Ensemble du Québec*											
1994	4,3	24,8	953,1	818,8	266,4	113,5	67,3	26,1	6,7	1,1	159,6
1995	2,6	17,1	826,7	807,8	280,2	100,7	40,0	15,1	5,4	1,2	144,0
1996	1,3	15,6	774,2	776,1	249,1	95,6	43,3	18,5	7,2	0,9	136,0
1997	1,4	15,1	778,0	723,9	252,2	80,5	40,2	15,3	3,8	1,0	130,2
1998	3,4	17,1	841,0	804,0	293,2	104,5	37,0	8,8	4,8	1,0	141,5
1999	0,5	16,2	961,6	886,8	322,7	105,5	43,4	13,9	5,0	0,6	156,6
2000	1,0	20,2	1 083,8	981,6	359,1	116,8	49,7	13,0	6,5	0,8	173,4
2001	1,1	20,6	1 221,3	1 082,5	424,1	152,9	50,6	19,1	4,7	0,9	194,3
2002	0,0	23,5	1 323,6	1 215,2	460,4	171,0	66,5	17,1	5,4	0,3	212,0
2003	2,8	27,5	1 454,6	1 340,9	497,9	203,3	72,0	23,2	6,8	0,4	233,0
2004	1,1	21,1	1 504,9	1 404,9	541,0	215,2	81,2	22,7	4,3	0,9	241,9
2005	0,0	21,8	1 363,8	1 356,7	553,7	230,7	82,9	24,5	7,1	1,4	233,0
2006	1,6	22,3	1 308,3	1 378,6	561,9	230,6	104,8	24,9	7,2	1,1	233,3
2007	0,5	22,9	1 416,8	1 400,5	542,1	220,5	114,1	26,5	6,9	1,2	239,9
2008	0,0	25,4	1 593,2	1 525,3	587,0	256,2	122,1	32,4	6,7	0,9	265,3
2009	0,5	22,1	1 668,6	1 679,4	588,3	250,0	121,8	35,4	7,3	1,2	277,7
Ensemble du Québec hors Montréal											
1994	4,4	25,4	945,2	886,6	289,0	110,0	70,3	25,0	8,0	1,1	165,3
1995	2,8	15,3	796,5	842,7	300,4	98,0	42,1	15,9	5,9	1,7	144,7
1996	1,7	16,2	762,3	799,9	252,1	92,9	42,9	19,0	7,7	1,3	136,2
1997	1,8	13,4	733,4	719,9	254,4	78,0	39,1	13,5	3,8	0,6	125,6
1998	3,8	16,4	775,1	784,0	298,6	105,2	38,5	8,6	4,2	1,0	135,6
1999	0,7	15,9	882,3	846,9	314,8	99,0	38,2	12,3	5,5	0,6	146,0
2000	0,7	20,2	1 006,6	963,8	347,9	110,1	44,7	11,0	6,4	1,0	163,1
2001	1,4	20,0	1 177,1	1 055,6	405,3	134,4	47,3	16,7	4,8	1,0	183,8
2002	0,0	25,1	1 308,7	1 198,7	452,6	156,6	60,8	15,8	4,9	0,2	204,6
2003	3,8	24,6	1 469,8	1 327,3	486,1	193,7	64,4	23,1	6,5	0,5	226,8
2004	0,7	19,5	1 546,0	1 475,5	538,2	209,9	81,1	20,9	3,9	0,7	242,9
2005	0,0	22,8	1 367,1	1 435,5	566,8	220,8	81,2	22,9	5,7	0,7	232,0
2006	1,5	23,1	1 290,9	1 435,6	573,6	210,8	99,9	22,7	6,5	1,1	228,5
2007	0,7	22,8	1 411,7	1 469,3	552,5	204,6	102,3	23,1	5,6	1,3	236,7
2008	0,0	25,6	1 602,9	1 555,7	596,2	242,2	99,6	29,0	5,7	1,1	260,5
2009	0,7	20,4	1 718,4	1 716,3	598,2	238,3	110,3	31,9	6,5	1,3	276,8

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1994	0,0	7,0	613,4	800,4	280,8	103,7	73,6	31,0	9,7	0,0	129,5
1995	0,0	0,0	727,6	807,1	266,4	60,2	31,8	12,1	0,0	0,0	125,1
1996	0,0	7,4	451,8	618,8	128,2	89,9	42,9	0,0	8,9	0,0	92,0
1997	0,0	15,2	575,3	783,7	246,9	68,5	22,0	0,0	0,0	0,0	112,1
1998	39,8	0,0	819,9	759,1	270,8	105,2	22,6	28,3	0,0	0,0	137,2
1999	20,8	0,0	542,9	509,0	155,1	48,7	35,0	16,9	0,0	0,0	91,8
2000	0,0	8,2	370,8	652,9	250,7	53,1	48,8	11,2	7,3	0,0	89,6
2001	0,0	0,0	628,7	713,4	212,3	129,1	39,0	11,1	0,0	8,7	112,5
2002	0,0	0,0	659,0	930,0	429,9	134,1	13,9	27,8	6,7	0,0	136,8
2003	24,6	8,9	904,3	1 014,7	536,4	117,0	30,5	22,3	0,0	0,0	162,9
2004	0,0	9,2	948,2	1 091,8	112,6	196,8	65,4	33,8	0,0	0,0	152,7
2005	0,0	19,1	1 062,2	1 057,0	428,4	273,0	88,3	23,0	0,0	0,0	176,5
2006	0,0	19,9	613,9	1 229,0	419,5	137,1	55,6	5,9	0,0	0,0	143,9
2007	0,0	10,3	888,2	771,3	313,7	97,4	57,9	18,6	0,0	0,0	127,4
2008	0,0	21,2	787,3	952,4	517,5	93,8	58,7	6,5	5,7	0,0	140,3
2009	0,0	0,0	1 128,3	1 054,9	499,8	167,2	19,6	34,4	0,0	0,0	166,0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1994	0,0	27,8	1 014,4	1 311,6	266,5	93,1	72,6	27,9	0,0	0,0	207,3
1995	11,3	14,4	928,7	1 152,3	380,3	121,8	14,6	13,5	6,5	4,2	192,2
1996	0,0	29,8	1 150,1	965,7	248,7	61,3	36,5	8,8	6,4	0,0	188,3
1997	12,8	0,0	632,7	773,7	287,4	37,8	44,8	12,9	0,0	0,0	134,2
1998	0,0	5,3	635,1	758,1	293,2	134,8	46,1	12,5	5,9	4,0	140,8
1999	0,0	5,4	634,9	1 112,4	530,0	101,4	48,0	12,2	5,7	0,0	170,1
2000	0,0	16,8	1 053,9	976,0	245,7	110,7	50,1	12,0	5,5	0,0	177,0
2001	0,0	23,2	693,0	907,1	371,4	263,7	26,7	15,8	0,0	0,0	158,5
2002	0,0	0,0	987,6	1 333,6	452,1	180,4	67,3	7,9	5,2	0,0	204,1
2003	16,3	6,0	1 303,0	1 195,0	540,7	142,9	31,8	11,9	20,1	0,0	220,7
2004	0,0	6,2	1 376,1	1 350,3	659,9	117,2	115,8	24,0	0,0	0,0	234,4
2005	0,0	0,0	1 120,1	1 276,5	499,9	261,2	63,6	12,3	4,8	0,0	203,1
2006	0,0	20,5	965,4	1 356,6	536,2	212,8	96,0	12,6	4,6	0,0	197,9
2007	0,0	0,0	1 101,1	1 441,0	559,3	203,9	86,5	4,4	4,5	0,0	207,3
2008	0,0	0,0	1 146,6	1 206,3	603,6	224,0	73,6	9,3	0,0	0,0	197,6
2009	0,0	22,7	1 233,6	1 546,0	481,0	155,3	74,4	29,6	4,3	0,0	216,5

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1994	5,5	16,6	843,5	889,8	321,3	118,8	92,5	28,7	8,5	1,6	166,2
1995	0,0	11,3	647,1	743,8	243,7	100,0	34,8	18,8	0,0	1,6	125,7
1996	11,4	14,2	607,6	840,3	205,6	69,3	20,9	24,0	7,8	1,5	124,9
1997	6,0	14,3	789,7	851,4	257,3	121,2	28,4	20,1	4,9	1,5	142,3
1998	0,0	11,4	920,5	927,2	349,1	146,1	57,8	7,2	4,7	0,0	160,9
1999	0,0	17,1	990,6	1 056,0	389,0	155,1	40,4	23,2	9,0	2,9	178,2
2000	6,8	20,1	910,1	1 009,1	437,3	129,8	78,7	17,7	6,5	2,9	173,6
2001	7,1	8,6	1 274,5	1 191,2	547,6	157,9	50,7	31,8	10,5	0,0	213,6
2002	0,0	17,2	1 108,0	1 262,2	483,0	203,1	57,1	30,0	10,2	0,0	208,3
2003	0,0	17,3	1 454,0	1 501,7	628,3	186,5	94,8	38,8	14,0	2,7	255,6
2004	0,0	5,8	1 650,9	1 596,6	638,8	196,6	63,7	23,0	5,8	1,3	265,4
2005	0,0	44,8	1 307,8	1 446,4	664,3	203,2	134,3	34,1	11,5	1,3	248,5
2006	0,0	12,3	1 295,5	1 610,3	624,5	248,8	129,2	38,4	16,9	1,2	257,2
2007	0,0	19,1	1 136,9	1 607,0	634,9	214,2	81,7	28,3	9,2	2,4	239,6
2008	0,0	9,8	1 484,3	1 581,6	617,1	238,5	139,9	19,4	7,3	2,3	257,7
2009	0,0	16,7	1 632,1	1 801,2	589,5	250,8	113,7	36,1	5,4	2,2	276,7
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1994	0,0	9,6	825,1	806,3	305,2	125,2	61,3	27,7	3,9	4,0	144,6
1995	0,0	13,1	616,7	724,4	186,7	104,1	33,0	18,9	3,8	0,0	111,2
1996	0,0	19,8	680,6	744,6	306,7	92,5	47,7	31,8	7,2	3,9	129,8
1997	0,0	10,1	640,4	624,7	209,8	46,1	19,2	5,2	0,0	1,9	103,3
1998	0,0	17,1	581,9	920,3	358,0	93,2	19,4	5,1	3,3	0,0	128,4
1999	0,0	3,5	586,0	804,6	312,0	66,5	25,0	7,5	6,4	0,0	117,5
2000	0,0	21,2	884,2	976,9	377,6	99,4	5,2	4,9	9,3	0,0	151,2
2001	0,0	21,4	1 179,2	985,3	450,0	90,0	48,7	17,1	6,0	0,0	177,3
2002	0,0	21,7	1 476,6	1 374,0	475,1	94,3	34,3	17,0	0,0	0,0	218,5
2003	0,0	32,8	1 801,6	1 547,3	656,7	251,1	79,8	17,0	0,0	0,0	268,5
2004	9,6	29,5	1 917,4	1 856,2	762,3	271,9	85,1	17,0	8,3	0,0	299,6
2005	0,0	30,2	1 612,7	1 736,0	846,1	319,9	132,3	14,7	8,1	1,7	280,7
2006	0,0	34,9	1 452,6	1 881,4	810,8	301,8	169,3	40,0	2,6	4,9	280,9
2007	0,0	31,9	1 565,6	1 563,2	709,7	364,6	183,4	30,9	2,6	0,0	263,2
2008	0,0	40,9	1 935,0	1 741,2	684,9	230,4	117,8	48,1	2,5	0,0	286,1
2009	0,0	21,0	2 005,8	1 804,9	526,0	221,9	151,7	44,5	4,9	1,5	281,3

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1994	0,0	43,6	859,3	954,9	151,7	112,1	51,1	9,6	7,0	0,0	152,9
1995	0,0	5,5	918,1	921,1	350,4	88,0	59,5	23,5	20,3	7,2	168,2
1996	0,0	5,5	855,4	936,3	381,5	82,9	59,2	36,7	0,0	0,0	163,5
1997	0,0	5,6	795,1	777,8	329,3	57,7	68,2	9,0	6,1	0,0	140,4
1998	0,0	5,5	775,9	793,9	225,8	121,3	68,1	13,2	0,0	0,0	136,8
1999	0,0	0,0	833,9	1 058,6	288,7	64,4	51,3	26,2	5,5	0,0	157,8
2000	0,0	5,6	1 107,0	1 209,0	323,2	113,4	26,0	4,3	5,3	0,0	184,4
2001	0,0	16,7	1 314,5	1 203,5	412,3	195,4	9,0	17,0	5,1	3,2	208,7
2002	0,0	50,1	1 390,7	1 376,6	471,0	201,9	46,6	12,6	9,8	0,0	234,5
2003	0,0	22,5	1 616,5	1 679,3	519,3	182,3	69,1	29,1	0,0	0,0	269,8
2004	0,0	17,1	1 775,6	1 522,2	577,6	343,4	62,2	16,6	4,6	0,0	279,5
2005	0,0	17,3	1 403,5	1 682,2	555,7	267,2	32,8	29,1	4,5	0,0	260,3
2006	0,0	5,9	1 081,5	1 248,9	621,8	371,4	90,1	12,7	17,6	2,9	223,5
2007	0,0	18,3	1 423,1	1 419,4	468,7	81,0	164,3	25,9	4,3	2,8	234,2
2008	0,0	31,3	1 538,0	1 766,7	746,0	312,4	179,2	26,6	4,2	0,0	294,7
2009	0,0	19,2	2 038,7	2 116,8	657,6	293,0	84,1	22,8	4,2	0,0	330,7
06 - Montréal-Centre											
1994	3,8	22,4	982,9	657,9	212,1	124,4	57,5	29,5	3,0	0,9	143,2
1995	1,9	24,6	941,4	724,2	233,1	109,1	33,2	12,7	4,0	0,0	142,0
1996	0,0	13,3	820,0	717,7	242,1	103,8	44,8	17,0	5,9	0,0	135,1
1997	0,0	22,0	946,3	734,1	247,2	87,7	44,1	21,2	3,8	1,9	143,6
1998	2,0	19,5	1 082,4	856,9	280,9	102,4	32,2	9,4	6,5	1,0	159,1
1999	0,0	17,2	1 248,0	989,5	340,4	123,1	60,4	19,4	3,6	0,5	187,8
2000	2,1	20,1	1 362,3	1 025,2	383,7	134,3	66,0	19,8	7,1	0,5	203,6
2001	0,0	22,9	1 380,8	1 146,2	464,6	200,0	61,3	27,2	4,3	0,9	225,3
2002	0,0	17,5	1 376,4	1 254,8	477,1	206,4	84,1	21,5	6,8	0,5	233,8
2003	0,0	38,3	1 401,7	1 373,8	523,2	226,4	95,0	23,6	7,5	0,0	251,1
2004	2,1	27,2	1 361,3	1 232,1	546,8	227,9	81,4	28,6	5,7	1,4	238,9
2005	0,0	18,0	1 352,1	1 166,4	525,4	254,3	87,7	30,2	12,1	3,3	235,8
2006	2,2	19,5	1 373,0	1 242,7	536,7	279,2	118,6	32,8	9,6	0,9	247,6
2007	0,0	23,1	1 435,8	1 234,5	519,7	259,1	146,5	38,2	11,1	0,9	249,5
2008	0,0	24,5	1 556,9	1 449,6	567,0	290,4	183,0	44,4	10,3	0,5	280,1
2009	0,0	28,0	1 484,9	1 583,8	566,7	278,9	152,7	47,1	10,2	0,9	280,1

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1994	0,0	14,5	1 120,0	974,9	356,8	129,0	100,1	63,8	14,0	0,0	201,5
1995	0,0	4,8	840,9	1 016,1	308,6	143,1	103,7	32,9	13,4	0,0	174,2
1996	9,2	14,0	871,4	776,8	248,5	92,6	44,7	12,0	0,0	0,0	145,1
1997	0,0	9,2	678,2	727,6	225,0	68,2	51,0	7,8	0,0	0,0	118,3
1998	10,3	18,3	738,0	817,2	389,9	57,5	32,0	0,0	17,0	0,0	138,3
1999	0,0	4,5	1 252,5	903,9	369,5	107,6	32,1	7,3	0,0	0,0	173,9
2000	0,0	36,3	1 002,8	1 051,5	364,7	98,2	64,7	10,6	5,1	0,0	173,1
2001	0,0	9,1	1 262,0	1 355,2	440,7	178,0	46,2	13,8	4,9	0,0	213,8
2002	0,0	13,6	1 568,2	1 347,4	486,5	120,8	67,8	13,5	0,0	0,0	232,5
2003	0,0	4,5	1 436,9	1 348,5	459,4	191,0	28,1	19,7	0,0	0,0	222,6
2004	0,0	9,1	1 499,5	1 420,5	564,0	268,1	73,6	19,3	4,3	0,0	249,9
2005	0,0	0,0	1 279,0	1 716,2	549,5	121,8	122,8	19,0	0,0	3,5	245,5
2006	0,0	14,3	1 456,7	1 406,2	560,9	175,8	87,0	15,9	4,0	0,0	241,9
2007	0,0	29,5	1 707,5	1 577,9	740,9	182,7	97,0	35,2	0,0	0,0	288,5
2008	0,0	20,1	1 835,8	1 706,3	696,4	332,5	82,1	45,5	3,8	0,0	312,0
2009	10,3	30,8	2 062,9	2 131,3	741,7	243,3	66,1	36,4	10,9	2,9	351,4
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1994	17,6	60,8	2 131,2	1 254,5	639,3	240,1	141,9	36,9	29,7	0,0	348,1
1995	0,0	35,1	1 472,5	1 121,5	630,1	173,2	84,8	44,3	0,0	0,0	266,3
1996	0,0	8,8	1 634,5	1 388,0	271,7	241,1	83,2	34,7	13,7	0,0	271,5
1997	0,0	53,4	1 402,3	939,5	458,5	94,6	55,8	16,9	0,0	0,0	223,1
1998	0,0	18,0	1 386,2	845,1	231,5	167,1	14,2	0,0	0,0	0,0	192,3
1999	0,0	36,9	1 123,6	688,0	291,5	142,4	0,0	8,0	35,8	0,0	167,7
2000	0,0	66,5	1 564,2	1 522,2	539,0	214,8	0,0	7,9	34,6	0,0	274,7
2001	0,0	29,3	1 518,6	1 493,2	518,9	148,0	48,6	15,6	11,1	0,0	255,6
2002	0,0	59,5	2 097,6	1 538,8	440,2	307,2	86,1	15,6	0,0	0,0	305,2
2003	0,0	60,6	1 871,1	1 817,8	607,4	321,9	91,9	46,6	0,0	0,0	317,1
2004	0,0	84,2	1 694,6	1 857,8	619,3	336,8	155,5	15,6	10,1	0,0	310,7
2005	0,0	65,2	1 543,5	2 183,2	881,1	393,0	125,6	7,9	9,8	0,0	329,4
2006	0,0	45,1	1 955,6	2 001,9	848,0	296,6	264,1	8,0	0,0	0,0	343,7
2007	0,0	35,0	1 966,6	2 237,0	825,9	193,1	158,2	41,1	18,5	13,8	351,7
2008	0,0	36,4	1 842,1	1 523,6	783,7	469,5	259,3	17,0	9,0	0,0	315,3
2009	0,0	37,5	1 538,2	1 234,6	571,4	346,2	244,1	17,8	0,0	0,0	253,9

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1994	27,4	149,5	2 302,2	1 945,8	813,0	264,4	84,4	38,5	19,5	0,0	446,6
1995	56,5	55,0	2 472,5	1 727,2	986,1	207,2	104,8	25,1	0,0	17,2	438,1
1996	0,0	69,8	1 855,5	2 103,4	616,1	320,7	103,2	12,4	0,0	0,0	388,7
1997	31,0	70,1	1 619,4	1 305,3	453,4	154,0	125,0	0,0	0,0	0,0	287,3
1998	0,0	99,6	1 794,2	1 499,4	687,6	348,8	104,5	24,1	0,0	0,0	343,3
1999	0,0	101,2	2 579,6	1 702,5	630,5	470,1	107,2	35,6	0,0	0,0	411,4
2000	0,0	59,2	2 288,3	1 469,7	698,1	320,9	64,9	23,5	0,0	14,5	349,5
2001	0,0	76,1	1 934,3	1 852,5	914,6	144,8	89,3	34,8	0,0	14,0	345,6
2002	0,0	109,0	2 427,0	1 942,7	912,3	277,1	47,2	34,5	0,0	0,0	389,8
2003	0,0	110,6	2 656,9	2 375,2	934,6	352,3	101,2	57,4	0,0	0,0	432,9
2004	0,0	64,8	3 018,5	2 798,9	1 127,7	429,3	241,9	23,1	0,0	0,0	490,5
2005	0,0	116,8	3 213,4	2 108,6	1 105,6	658,8	142,7	80,9	14,5	0,0	484,1
2006	0,0	188,5	2 313,1	2 350,7	1 061,2	209,8	151,9	58,3	0,0	0,0	409,3
2007	0,0	232,9	3 148,1	2 861,6	1 054,9	412,9	125,9	24,0	14,0	0,0	503,5
2008	0,0	149,6	2 905,2	2 546,0	945,9	272,9	131,9	61,8	27,6	0,0	453,9
2009	0,0	114,4	2 999,7	2 288,3	897,0	375,7	102,2	25,7	0,0	10,6	432,0
10 - Nord-du-Québec											
1994	131,1	61,9	1 662,4	792,4	504,4	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0
1995	0,0	0,0	2 372,0	627,0	0,0	208,3	119,5	74,4	0,0	0,0	313,8
1996	0,0	0,0	756,6	953,9	290,7	109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	171,2
1997	0,0	0,0	903,2	0,0	151,1	116,0	114,0	0,0	0,0	0,0	115,7
1998	0,0	0,0	929,6	499,2	0,0	127,2	112,9	0,0	0,0	0,0	141,9
1999	0,0	0,0	997,2	807,8	328,4	0,0	115,1	0,0	0,0	0,0	179,9
2000	0,0	79,4	899,6	499,2	0,0	0,0	120,5	69,9	0,0	0,0	147,5
2001	0,0	0,0	1 127,2	177,0	0,0	0,0	129,5	0,0	0,0	0,0	114,6
2002	0,0	0,0	2 177,6	731,3	183,5	373,1	138,9	0,0	0,0	0,0	273,6
2003	0,0	0,0	2 333,9	1 851,9	592,9	0,0	0,0	0,0	102,4	0,0	360,2
2004	0,0	0,0	2 504,8	1 754,4	1 028,8	589,4	170,4	0,0	0,0	0,0	423,2
2005	0,0	0,0	1 968,5	3 118,5	628,9	0,0	190,1	0,0	0,0	0,0	402,1
2006	0,0	0,0	1 636,0	2 844,6	424,6	207,0	0,0	71,0	0,0	0,0	351,4
2007	0,0	105,6	1 043,8	2 758,6	407,3	425,5	208,8	0,0	0,0	0,0	325,9
2008	0,0	0,0	1 483,1	484,3	0,0	443,5	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0
2009	0,0	0,0	2 553,2	2 030,5	879,1	647,9	0,0	0,0	0,0	0,0	392,7

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1994	0,0	28,5	619,0	779,3	288,8	195,0	103,6	36,9	0,0	0,0	146,8
1995	0,0	14,4	500,5	727,4	122,5	201,1	41,5	0,0	17,4	10,0	115,7
1996	0,0	14,8	529,7	873,2	96,0	164,4	20,6	0,0	0,0	0,0	112,7
1997	0,0	15,3	459,2	324,3	267,6	24,7	42,5	23,1	0,0	0,0	79,5
1998	0,0	0,0	229,0	164,5	179,4	26,5	0,0	22,8	15,6	0,0	42,2
1999	0,0	16,2	151,0	286,2	111,6	58,6	0,0	11,4	0,0	0,0	39,0
2000	0,0	0,0	635,7	473,9	317,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	87,5
2001	0,0	34,4	890,2	704,8	125,4	170,6	100,5	11,3	14,1	0,0	125,0
2002	0,0	0,0	651,4	1 753,7	90,1	144,3	53,2	0,0	0,0	0,0	143,4
2003	0,0	55,0	1 450,3	1 023,3	418,8	114,3	85,7	0,0	0,0	0,0	175,8
2004	0,0	19,0	1 493,1	1 449,9	765,9	308,3	61,6	45,8	0,0	0,0	225,7
2005	0,0	19,9	1 029,5	1 296,0	861,7	40,2	65,7	0,0	0,0	0,0	174,3
2006	0,0	20,9	979,4	1 255,6	859,0	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	166,4
2007	0,0	0,0	1 191,7	963,3	296,7	135,7	73,6	24,5	23,7	0,0	154,6
2008	0,0	0,0	814,9	1 092,9	797,5	131,9	116,1	0,0	0,0	0,0	152,7
2009	0,0	0,0	1 513,6	1 504,4	455,0	428,6	40,0	0,0	0,0	0,0	205,0
12 - Chaudière-Appalaches											
1994	0,0	3,7	446,1	421,4	238,1	67,6	41,8	17,1	0,0	0,0	86,2
1995	0,0	0,0	239,4	377,7	217,3	38,0	17,8	3,3	5,2	0,0	59,8
1996	0,0	3,8	411,5	452,0	178,3	92,3	41,4	9,8	0,0	2,9	83,0
1997	0,0	0,0	424,3	425,2	136,0	48,2	35,8	3,2	0,0	0,0	74,9
1998	9,3	7,8	375,8	521,3	230,6	109,5	12,1	6,3	4,4	0,0	88,1
1999	0,0	0,0	413,0	534,9	183,9	39,0	30,5	12,5	0,0	0,0	82,8
2000	0,0	0,0	517,5	537,3	253,8	49,6	24,9	12,3	8,0	2,7	96,5
2001	10,3	8,2	550,6	755,5	234,5	42,9	6,5	15,3	0,0	0,0	108,2
2002	0,0	4,2	578,2	674,9	332,7	43,6	54,5	6,1	0,0	0,0	110,3
2003	0,0	8,4	555,8	867,3	270,6	169,8	14,4	9,2	0,0	2,5	122,9
2004	0,0	4,3	705,3	1 009,2	363,3	169,4	30,7	12,2	3,5	0,0	146,1
2005	0,0	17,5	681,1	994,5	405,0	168,6	65,2	0,0	6,7	2,4	146,6
2006	0,0	0,0	687,7	912,7	376,9	122,8	33,7	18,6	0,0	0,0	133,8
2007	10,0	4,6	593,4	863,0	319,1	152,8	60,1	19,0	3,2	2,3	126,1
2008	0,0	9,5	601,7	779,3	322,3	98,8	69,8	16,4	6,4	4,3	118,4
2009	0,0	14,4	822,7	881,6	324,9	233,7	60,8	16,9	3,2	0,0	143,7

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1994	0,0	19,3	931,8	565,3	157,0	70,8	32,8	4,0	5,3	3,6	118,4
1995	9,0	9,6	647,0	572,4	190,7	66,1	13,0	0,0	5,1	0,0	97,0
1996	0,0	9,6	520,6	454,5	124,9	48,5	32,0	7,6	5,0	0,0	77,5
1997	0,0	14,1	834,6	595,2	167,3	28,5	25,4	18,7	4,8	0,0	108,3
1998	0,0	18,6	746,3	698,0	210,5	75,1	31,3	7,3	4,7	9,4	115,6
1999	0,0	27,4	951,6	657,8	194,6	62,4	25,4	7,1	4,6	0,0	121,4
2000	0,0	13,5	1 087,0	883,9	310,5	129,7	57,6	6,9	4,5	0,0	155,3
2001	0,0	13,3	987,9	1 012,7	336,4	114,3	65,8	13,3	8,8	0,0	159,1
2002	0,0	13,1	1 334,5	1 107,1	434,8	141,9	93,0	26,1	4,3	0,0	194,3
2003	0,0	4,3	1 403,2	1 198,9	314,4	170,4	88,5	28,6	4,2	0,0	197,0
2004	0,0	0,0	1 406,5	1 478,8	452,0	164,2	90,6	25,1	4,1	0,0	221,4
2005	0,0	4,4	1 321,9	1 404,0	561,9	231,3	50,5	30,9	4,0	0,0	223,1
2006	0,0	8,8	1 386,7	1 301,0	607,2	101,7	65,6	12,4	7,9	0,0	215,8
2007	0,0	0,0	1 610,2	1 379,1	524,3	175,6	73,6	18,6	15,5	0,0	238,6
2008	0,0	13,7	1 697,6	1 365,9	552,3	290,3	44,9	55,8	7,5	0,0	259,9
2009	0,0	18,4	1 493,1	1 641,8	563,4	170,4	90,7	40,6	11,0	0,0	257,9
14 - Lanaudière											
1994	7,1	15,0	890,9	648,7	226,1	70,2	43,5	24,5	5,6	0,0	127,0
1995	0,0	25,8	515,6	456,6	216,0	49,5	37,3	33,6	5,3	0,0	90,3
1996	0,0	7,2	650,9	567,3	163,3	28,7	46,6	9,8	0,0	0,0	93,3
1997	0,0	3,6	749,8	655,1	162,3	108,1	25,8	25,2	0,0	0,0	114,6
1998	0,0	34,9	689,3	533,4	130,6	63,9	31,0	9,1	0,0	0,0	96,4
1999	0,0	17,3	1 071,3	922,2	303,0	82,7	41,9	3,0	4,2	0,0	149,6
2000	0,0	24,3	943,8	1 117,9	341,5	88,5	21,2	5,8	0,0	0,0	151,5
2001	0,0	27,7	919,9	890,0	365,6	91,5	38,7	5,6	0,0	0,0	140,9
2002	0,0	13,8	1 022,7	1 003,8	314,9	111,1	34,4	8,2	18,4	0,0	152,4
2003	0,0	48,6	1 335,9	973,6	455,7	193,3	54,1	24,1	7,1	0,0	191,6
2004	0,0	38,3	1 211,3	1 369,7	419,6	143,8	56,9	15,7	0,0	2,7	199,2
2005	0,0	17,7	1 309,0	1 384,7	497,9	148,3	85,9	25,6	0,0	0,0	213,0
2006	0,0	14,5	1 413,2	1 425,0	503,6	228,8	88,0	17,9	6,3	0,0	229,4
2007	0,0	14,8	1 317,8	1 414,3	487,8	207,4	95,6	25,7	3,0	0,0	223,7
2008	0,0	7,6	2 004,1	1 743,9	524,5	226,8	82,6	36,6	2,9	2,2	298,0
2009	0,0	31,1	1 830,5	1 519,0	611,4	249,5	116,9	42,6	5,6	2,1	286,2

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1994	0,0	30,9	1 046,5	1 101,8	227,0	61,3	89,4	18,6	19,2	0,0	167,2
1995	0,0	20,1	901,0	986,4	360,9	61,5	72,0	6,0	9,1	0,0	153,6
1996	0,0	19,7	839,3	860,0	209,3	73,0	64,8	8,7	30,0	3,0	134,8
1997	0,0	12,9	736,9	725,9	363,2	45,5	50,1	8,4	8,0	0,0	122,4
1998	0,0	6,3	826,9	869,1	306,2	58,7	49,3	8,1	3,8	0,0	131,2
1999	0,0	21,6	1 049,5	695,5	249,1	73,4	13,3	10,4	0,0	0,0	130,8
2000	0,0	18,2	1 245,7	984,2	286,8	100,8	44,3	15,0	13,6	0,0	166,1
2001	0,0	20,9	1 697,8	1 281,3	356,3	91,3	40,8	14,5	3,2	0,0	210,4
2002	0,0	29,5	1 897,6	1 523,4	491,3	204,6	46,7	7,0	3,1	0,0	250,2
2003	0,0	32,1	2 047,7	1 664,9	449,0	163,1	58,2	6,7	3,0	0,0	261,2
2004	0,0	17,5	2 152,9	1 685,2	464,0	176,7	60,8	15,3	8,7	2,3	270,1
2005	0,0	14,8	1 813,0	1 616,4	425,4	208,3	47,6	27,9	11,0	0,0	248,8
2006	0,0	18,1	1 522,0	1 558,4	544,2	144,0	91,9	34,0	2,7	0,0	235,9
2007	0,0	12,4	1 787,0	1 598,3	450,3	201,7	121,3	21,4	2,6	0,0	256,0
2008	0,0	22,4	1 809,2	1 870,9	552,2	251,1	89,2	21,7	12,3	0,0	285,1
2009	0,0	23,0	2 086,4	1 919,1	566,7	239,2	174,3	39,6	9,6	0,0	318,1
16 - Montérégie											
1994	2,2	17,4	704,4	635,3	159,8	85,8	52,9	18,6	6,1	0,0	118,3
1995	0,0	16,3	692,5	723,7	177,2	61,4	23,6	8,7	4,4	0,0	114,3
1996	0,0	11,6	526,5	544,9	179,5	41,9	20,0	18,0	4,2	0,0	90,7
1997	0,0	9,2	564,6	555,9	139,1	45,6	21,7	11,2	6,5	0,0	90,1
1998	0,0	9,1	681,6	577,2	190,4	48,3	16,7	3,7	1,2	0,9	99,5
1999	0,0	12,5	739,8	662,6	213,0	51,0	21,9	5,4	1,2	0,9	110,7
2000	0,0	17,1	925,4	782,1	237,4	58,3	27,3	9,8	2,3	0,9	132,5
2001	0,0	22,7	1 083,1	802,3	261,4	92,5	28,3	8,7	2,2	0,9	146,3
2002	0,0	22,7	1 121,7	850,1	300,6	80,9	27,4	6,9	2,1	0,8	151,2
2003	3,0	15,8	1 184,2	970,3	327,1	123,4	43,7	16,1	4,2	0,0	167,2
2004	0,0	18,3	1 245,3	1 103,1	357,4	128,6	53,5	13,4	1,0	0,8	180,7
2005	0,0	15,1	1 084,5	1 023,1	372,8	140,0	18,6	18,3	2,0	0,0	165,6
2006	0,0	19,1	1 044,0	1 049,4	368,3	166,4	65,3	11,7	5,8	1,4	169,9
2007	0,0	12,3	1 187,0	1 213,6	419,1	151,1	66,8	16,0	3,8	0,7	191,1
2008	0,0	20,1	1 356,2	1 396,4	465,8	184,6	70,0	20,6	0,9	0,7	220,1
2009	0,0	10,2	1 506,9	1 565,6	584,3	177,2	90,1	22,7	8,2	1,9	248,1

Tableau 7 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1994	299,4	859,3	20 000,0	18 766,8	9 046,5	3 738,3	3 619,9	828,7	480,8	502,5	5 348,8
1995	143,5	103,4	14 960,6	16 622,7	11 414,4	8 011,9	2 183,4	536,2	502,5	1 063,8	4 960,3
1996	0,0	485,4	20 959,6	16 829,3	11 793,6	9 116,0	3 861,0	2 412,9	1 578,9	471,7	6 103,8
1997	0,0	636,4	12 694,3	13 583,1	7 925,4	7 526,9	3 237,4	1 827,7	454,5	463,0	4 327,5
1998	313,5	716,2	8 000,0	11 386,1	6 997,7	6 182,8	4 745,8	255,8	0,0	0,0	3 530,5
1999	0,0	540,1	11 816,2	13 131,3	7 243,0	5 276,4	5 592,1	990,1	2 000,0	0,0	4 109,3
2000	0,0	168,4	13 569,9	13 659,8	6 682,0	5 897,4	3 374,2	492,6	0,0	0,0	3 867,9
2001	0,0	251,3	20 210,5	15 803,1	9 738,7	5 263,2	4 833,8	1 432,0	711,7	0,0	5 186,6
2002	0,0	830,6	18 441,1	16 279,1	13 270,1	6 982,5	7 396,4	2 267,6	0,0	0,0	5 914,9
2003	297,2	584,8	14 872,8	12 357,0	5 679,0	5 741,6	3 939,4	2 053,4	1 929,3	0,0	4 321,7
2004	0,0	162,9	13 026,8	13 519,3	8 780,5	3 482,6	4 651,2	1 757,8	295,0	0,0	4 055,9
2005	0,0	319,0	12 284,1	11 693,5	6 310,7	4 096,4	4 843,3	1 102,9	558,7	0,0	3 679,8
2006	305,8	156,6	13 443,8	11 627,9	7 390,3	3 448,3	3 746,4	1 598,6	263,2	0,0	3 774,6
2007	0,0	403,9	10 873,4	13 529,4	6 744,2	5 301,2	1 377,4	336,7	276,2	0,0	3 580,0
2008	0,0	740,7	15 319,9	11 764,7	7 017,5	3 117,5	1 326,3	825,1	1 061,0	371,7	3 987,7
2009	0,0	0,0	10 256,4	11 132,8	6 118,1	3 414,6	2 949,1	321,0	254,5	0,0	3 118,3
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1994	0,0	263,9	6 944,4	5 396,3	3 232,3	1 670,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 822,5
1995	0,0	258,0	7 129,8	6 521,7	2 816,9	468,4	0,0	214,1	0,0	0,0	1 859,9
1996	0,0	252,3	5 009,3	5 288,5	2 238,8	1 089,3	0,0	209,2	274,7	0,0	1 462,6
1997	0,0	0,0	4 918,0	3 453,9	2 473,5	634,2	267,4	0,0	0,0	0,0	1 148,4
1998	0,0	78,1	7 581,2	7 118,1	3 846,2	1 626,0	0,0	569,3	536,2	0,0	2 075,8
1999	0,0	77,5	4 537,2	4 406,8	2 961,7	828,2	496,3	184,5	0,0	0,0	1 288,4
2000	0,0	75,2	3 710,6	3 407,2	2 080,0	641,0	712,6	0,0	253,2	0,0	1 013,1
2001	0,0	0,0	5 190,3	3 819,4	2 381,0	959,7	683,4	316,5	0,0	0,0	1 220,7
2002	0,0	287,6	4 769,7	4 490,5	2 150,5	902,5	1 063,8	0,0	227,8	0,0	1 292,1
2003	0,0	0,0	7 986,7	7 483,0	2 922,1	2 192,2	404,0	144,9	0,0	0,0	1 890,8
2004	0,0	135,0	9 290,5	6 765,7	3 656,6	2 173,9	1 255,2	530,5	0,0	0,0	2 121,4
2005	0,0	268,3	10 743,8	6 988,4	4 455,4	2 247,2	627,6	0,0	0,0	0,0	2 237,9
2006	0,0	612,2	8 225,8	10 147,3	4 132,2	2 076,7	813,0	0,0	0,0	0,0	2 349,2
2007	0,0	620,3	10 172,1	8 064,5	4 283,4	645,2	1 550,4	242,7	0,0	185,9	2 292,9
2008	0,0	475,2	10 494,8	8 059,2	4 045,3	2 166,7	1 096,9	358,9	0,0	0,0	2 363,2
2009	0,0	133,7	9 640,3	11 447,8	3 745,9	2 100,2	179,2	232,6	0,0	0,0	2 337,9

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Ensemble du Québec*											
1994	1,2	0,8	157,9	294,5	159,4	69,2	33,8	18,3	5,5	2,0	58,1
1995	0,8	1,1	127,3	274,7	127,5	61,2	29,2	15,9	4,2	1,0	49,2
1996	0,4	0,2	105,5	254,4	129,7	65,8	25,9	13,4	5,9	1,0	45,8
1997	0,4	0,6	98,8	243,2	139,3	64,3	32,6	11,2	4,9	0,8	45,2
1998	0,5	1,3	114,6	306,4	167,3	75,0	45,2	14,4	4,9	1,0	54,8
1999	1,4	0,6	118,7	332,3	177,4	95,2	41,7	19,7	4,5	0,8	59,2
2000	0,0	0,4	132,0	329,8	183,6	88,8	47,9	21,5	5,8	0,9	60,6
2001	0,5	1,1	151,1	425,8	260,2	126,0	58,3	27,1	5,9	2,5	78,4
2002	0,5	0,0	161,2	453,0	274,1	134,6	62,7	31,0	6,9	1,7	83,0
2003	1,1	0,6	194,4	512,0	297,1	159,3	75,3	27,9	8,6	2,0	92,9
2004	1,0	0,6	195,4	527,4	329,6	159,2	81,7	31,3	11,0	1,8	97,1
2005	1,0	0,7	173,7	517,5	351,3	184,1	90,8	36,4	14,3	3,0	99,8
2006	0,0	0,7	194,8	542,5	333,9	164,4	98,4	40,4	13,1	3,3	100,8
2007	0,5	0,7	209,9	570,5	350,0	198,3	98,0	45,5	17,9	3,9	107,7
2008	0,0	1,2	263,0	664,7	388,3	193,1	120,6	46,4	15,7	2,1	120,2
2009	0,9	1,7	287,6	715,2	396,8	196,9	113,9	51,9	19,0	2,6	126,4
Ensemble du Québec hors Montréal											
1994	1,6	1,1	160,5	325,7	174,3	66,0	33,2	17,3	6,2	2,0	59,7
1995	1,1	0,8	130,3	302,3	132,3	52,9	24,6	14,3	3,5	0,8	48,8
1996	0,6	0,3	104,0	273,5	126,3	58,4	22,5	11,8	5,7	0,8	44,0
1997	0,6	0,8	96,3	249,9	133,6	55,7	27,7	8,2	4,1	1,1	41,9
1998	0,6	1,6	114,5	308,0	165,2	65,9	36,6	13,7	3,9	1,3	51,4
1999	1,3	0,3	115,6	321,4	170,6	73,6	29,0	15,9	3,2	0,8	52,4
2000	0,0	0,5	126,6	348,4	189,5	79,1	32,7	16,7	6,4	1,2	57,1
2001	0,0	1,1	150,6	430,8	251,4	106,7	43,6	19,4	4,6	2,4	71,1
2002	0,7	0,0	165,9	450,2	267,2	109,4	47,0	23,4	5,2	0,9	75,1
2003	1,4	0,8	197,9	544,0	286,7	140,2	53,1	21,1	6,1	1,6	86,8
2004	1,4	0,8	209,1	570,8	352,6	150,5	71,3	24,3	6,9	1,5	95,6
2005	0,7	0,8	183,1	551,9	364,5	170,4	75,6	23,6	10,8	2,3	94,7
2006	0,0	0,9	205,7	565,1	338,3	154,4	83,0	27,3	7,3	2,2	94,4
2007	0,0	0,3	205,2	579,3	345,2	175,6	71,1	30,4	11,0	3,0	96,6
2008	0,0	1,5	258,8	654,5	385,4	168,7	92,0	29,9	8,2	1,6	107,5
2009	0,6	1,5	290,2	722,9	380,9	168,0	87,4	36,1	12,9	1,9	114,4

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1994	0,0	0,0	152,7	723,4	95,4	103,8	52,5	0,0	0,0	0,0	76,1
1995	0,0	0,0	197,9	590,4	219,6	12,1	21,3	11,7	0,0	0,0	71,5
1996	0,0	0,0	197,6	373,2	187,7	65,3	10,7	17,2	17,6	0,0	63,9
1997	0,0	0,0	140,6	479,3	174,3	96,2	0,0	11,2	0,0	0,0	62,1
1998	0,0	0,0	244,9	774,3	266,2	118,0	34,7	16,5	0,0	0,0	101,4
1999	0,0	0,0	125,7	331,3	163,6	109,2	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9
2000	0,0	0,0	39,4	236,8	234,5	83,1	49,0	11,0	14,3	5,7	46,3
2001	0,0	0,0	123,3	419,3	302,4	139,2	52,2	22,0	0,0	11,1	73,1
2002	22,2	0,0	144,0	472,5	418,4	127,0	83,0	11,1	13,3	0,0	84,7
2003	0,0	0,0	264,0	863,1	563,4	259,5	44,4	0,0	0,0	0,0	126,9
2004	0,0	0,0	284,5	544,4	407,0	172,5	79,0	22,7	18,6	0,0	100,9
2005	0,0	0,0	227,1	739,7	631,8	266,2	118,1	11,6	0,0	0,0	123,8
2006	0,0	0,0	239,9	893,7	300,2	92,2	123,3	17,9	0,0	0,0	104,9
2007	0,0	0,0	106,2	622,6	394,2	110,7	18,2	18,7	11,5	0,0	81,1
2008	0,0	0,0	247,5	596,7	451,2	161,4	55,6	19,6	0,0	0,0	94,1
2009	0,0	0,0	220,9	625,5	433,4	227,2	57,0	13,6	0,0	0,0	95,0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1994	10,6	0,0	107,4	479,9	359,0	68,1	21,0	8,8	0,0	0,0	74,4
1995	0,0	0,0	126,4	479,9	93,6	78,9	21,4	17,2	6,7	0,0	61,7
1996	0,0	0,0	104,0	347,8	170,7	76,7	21,7	16,7	6,5	0,0	55,8
1997	0,0	0,0	60,5	312,4	215,1	64,7	36,8	8,2	0,0	0,0	49,6
1998	0,0	5,0	85,9	236,0	166,2	120,4	15,1	4,0	5,9	5,1	48,3
1999	0,0	0,0	64,5	256,3	291,1	131,2	38,8	11,7	5,6	0,0	57,6
2000	0,0	0,0	144,4	362,3	237,8	70,0	16,1	7,7	0,0	0,0	60,8
2001	0,0	0,0	62,6	325,2	195,9	98,4	34,3	15,4	0,0	0,0	52,8
2002	0,0	0,0	56,7	376,1	287,3	209,8	28,0	30,6	0,0	0,0	71,8
2003	15,8	0,0	138,6	440,9	223,6	136,6	61,9	22,9	0,0	0,0	75,3
2004	0,0	0,0	216,8	498,5	321,8	110,1	68,4	15,5	4,7	0,0	88,1
2005	15,9	0,0	73,7	436,1	325,5	260,8	24,6	23,8	4,6	4,1	79,2
2006	0,0	0,0	127,1	605,4	301,6	184,3	65,7	8,2	8,9	0,0	87,5
2007	0,0	0,0	212,4	592,2	259,6	176,0	55,8	47,8	8,7	0,0	94,5
2008	0,0	0,0	138,6	426,9	284,3	159,8	113,2	27,5	0,0	0,0	75,6
2009	0,0	0,0	196,1	579,1	261,2	242,1	56,3	19,3	20,8	3,5	92,6

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1994	0,0	2,6	135,8	295,1	223,0	51,5	23,9	21,9	3,0	2,3	63,7
1995	0,0	0,0	93,1	264,2	155,8	45,5	17,2	5,9	5,8	0,0	47,5
1996	0,0	0,0	114,8	301,2	118,9	72,3	17,3	13,4	5,5	2,3	50,5
1997	0,0	0,0	95,8	349,1	121,0	90,4	34,7	17,0	2,6	6,7	56,4
1998	0,0	2,7	143,0	319,5	201,8	96,2	70,0	20,5	5,0	4,4	67,2
1999	12,5	0,0	151,2	427,0	190,6	80,5	38,8	22,1	4,8	2,1	70,5
2000	0,0	0,0	152,4	361,8	237,9	62,3	43,0	32,9	9,2	2,1	70,4
2001	0,0	0,0	164,4	565,4	335,1	195,5	37,3	25,4	13,3	6,0	102,4
2002	0,0	0,0	162,5	508,6	333,5	139,7	70,1	30,5	4,3	1,9	94,9
2003	0,0	0,0	179,6	671,6	360,6	234,6	123,0	32,1	6,4	1,8	121,2
2004	0,0	0,0	221,8	616,3	400,6	200,8	64,8	24,9	8,3	3,5	115,0
2005	0,0	2,9	154,1	706,8	362,7	181,9	122,8	28,5	14,2	1,7	118,5
2006	0,0	0,0	167,6	625,0	426,2	189,7	74,6	45,3	17,9	6,5	118,5
2007	0,0	0,0	238,0	605,5	402,6	152,3	94,4	44,4	19,6	6,2	116,4
2008	0,0	3,1	267,5	662,2	407,0	203,6	141,7	49,3	17,3	6,0	128,5
2009	6,1	0,0	232,2	795,2	409,1	120,7	61,2	36,9	17,1	0,0	119,4
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1994	0,0	0,0	117,5	355,3	242,6	83,7	41,8	16,2	0,0	2,7	61,2
1995	0,0	0,0	120,0	348,4	121,4	76,0	42,1	26,2	0,0	2,7	53,1
1996	0,0	0,0	85,5	225,0	139,3	57,9	37,6	15,4	0,0	0,0	39,9
1997	0,0	0,0	64,2	241,5	150,5	39,0	33,0	2,5	0,0	0,0	36,9
1998	0,0	0,0	125,1	368,4	190,8	82,6	28,8	14,8	0,0	0,0	58,1
1999	0,0	0,0	95,2	286,0	132,0	31,6	34,1	22,0	3,2	0,0	43,9
2000	0,0	0,0	150,7	356,4	161,4	93,6	20,1	19,4	9,3	5,0	59,0
2001	0,0	6,7	199,4	503,9	254,2	125,3	36,7	16,8	3,0	0,0	80,1
2002	0,0	0,0	212,3	589,8	362,5	94,2	33,3	14,4	2,9	4,7	91,0
2003	0,0	0,0	244,4	668,9	301,4	127,5	70,5	21,6	2,8	0,0	99,3
2004	0,0	0,0	241,3	882,4	520,4	188,4	100,2	28,8	2,7	2,2	132,8
2005	0,0	0,0	287,0	911,1	519,3	247,3	112,7	31,6	5,4	0,0	141,1
2006	0,0	0,0	332,6	710,5	543,5	250,7	151,9	37,0	7,9	2,1	134,9
2007	0,0	0,0	305,3	768,3	505,6	326,1	120,6	33,0	7,7	0,0	134,8
2008	0,0	0,0	356,3	884,9	513,5	193,7	145,6	44,7	5,0	0,0	140,3
2009	0,0	0,0	410,4	990,3	457,8	159,6	110,1	54,4	12,3	3,7	144,5

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1994	0,0	0,0	143,9	363,6	141,0	68,8	50,9	14,1	14,5	4,9	60,4
1995	0,0	0,0	170,6	357,1	103,2	43,7	8,4	13,8	6,9	0,0	52,7
1996	0,0	0,0	27,9	314,0	126,7	99,4	33,7	27,1	13,1	0,0	49,4
1997	0,0	0,0	139,5	306,0	151,0	46,0	75,9	4,4	0,0	0,0	53,3
1998	0,0	0,0	122,2	466,2	240,8	58,1	50,4	8,7	0,0	0,0	68,6
1999	0,0	0,0	123,4	392,2	189,0	132,5	58,8	17,3	11,1	0,0	68,3
2000	0,0	0,0	116,6	476,6	210,0	116,6	51,0	21,3	15,9	0,0	74,9
2001	0,0	0,0	199,1	482,2	321,0	117,2	52,4	37,9	10,1	4,3	90,8
2002	0,0	0,0	210,2	673,8	277,2	111,0	53,8	41,9	4,9	0,0	101,8
2003	0,0	0,0	182,7	754,9	435,6	181,2	47,1	24,9	9,6	0,0	117,4
2004	0,0	0,0	276,0	635,7	394,5	194,8	108,6	24,8	18,6	3,9	118,6
2005	0,0	0,0	144,5	665,2	560,3	158,4	92,8	24,9	18,2	3,7	119,8
2006	0,0	5,6	111,7	475,3	423,5	168,9	125,8	33,7	0,0	3,5	95,8
2007	0,0	0,0	108,9	571,6	365,7	227,5	55,3	51,3	8,8	3,4	99,9
2008	0,0	0,0	254,5	781,5	449,3	209,2	56,1	26,3	12,9	0,0	123,7
2009	0,0	0,0	360,7	667,1	453,0	173,9	89,9	26,8	29,9	0,0	124,9
06 - Montréal-Centre											
1994	0,0	0,0	147,8	212,3	124,9	78,7	35,8	22,0	3,4	2,1	53,1
1995	0,0	2,1	115,3	200,7	116,4	85,1	44,3	21,5	6,7	1,4	50,4
1996	0,0	0,0	111,4	202,1	137,2	86,3	37,1	18,9	6,6	1,4	51,4
1997	0,0	0,0	108,5	224,2	151,9	87,4	48,3	21,7	7,5	0,0	55,5
1998	0,0	0,0	115,1	301,7	172,2	98,6	72,7	16,8	8,3	0,0	65,5
1999	1,9	2,1	130,8	363,1	193,1	149,5	81,6	32,9	9,1	0,7	80,4
2000	0,0	0,0	152,4	279,6	170,1	112,6	94,2	38,0	3,9	0,0	71,5
2001	2,0	1,0	152,6	412,5	279,6	172,6	101,5	53,3	10,5	2,8	100,7
2002	0,0	0,0	144,1	460,3	288,9	193,1	107,2	56,6	13,1	4,1	106,9
2003	0,0	0,0	182,1	426,1	319,8	202,9	136,7	51,0	17,4	3,4	111,9
2004	0,0	0,0	145,7	409,8	278,5	179,2	109,8	55,2	26,1	2,7	101,6
2005	2,1	0,0	139,0	424,8	321,3	216,1	130,9	79,8	27,3	5,3	115,8
2006	0,0	0,0	154,0	482,5	324,0	188,3	138,4	84,3	34,7	7,1	120,8
2007	2,0	2,1	227,6	546,9	360,9	252,6	167,4	95,3	43,7	7,0	142,8
2008	0,0	0,0	278,9	692,4	394,9	251,3	193,6	100,2	43,9	3,7	160,4
2009	1,9	2,1	277,7	694,1	434,2	266,3	181,8	102,1	42,4	4,9	164,1

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1994	0,0	0,0	109,3	241,2	102,2	72,0	33,6	8,4	0,0	0,0	44,6
1995	0,0	0,0	159,1	243,0	66,8	19,7	26,5	16,2	0,0	0,0	39,1
1996	8,9	0,0	98,4	188,1	122,6	13,4	0,0	11,8	0,0	0,0	32,3
1997	0,0	4,4	48,3	180,0	126,0	27,9	19,7	7,7	5,9	0,0	32,1
1998	0,0	0,0	67,2	170,4	92,4	66,5	32,8	26,3	22,3	0,0	37,7
1999	0,0	4,4	113,4	251,5	198,0	55,1	19,8	11,1	0,0	0,0	45,9
2000	0,0	0,0	102,6	366,3	180,4	116,8	33,2	14,5	0,0	0,0	58,3
2001	0,0	4,4	100,6	464,4	265,3	110,4	61,0	31,7	4,9	0,0	75,1
2002	0,0	0,0	145,5	602,1	197,0	94,4	20,7	51,5	4,7	4,7	82,7
2003	0,0	0,0	189,0	442,8	193,6	103,2	42,8	30,1	18,2	0,0	74,1
2004	0,0	0,0	114,8	528,1	265,7	137,1	67,2	22,9	13,1	0,0	81,4
2005	0,0	0,0	102,2	639,3	399,2	136,4	85,8	25,8	12,5	0,0	98,5
2006	0,0	0,0	274,8	522,2	278,2	180,7	56,3	41,8	4,0	0,0	96,4
2007	0,0	0,0	207,8	670,1	472,4	215,3	49,1	29,1	7,8	3,7	114,9
2008	0,0	0,0	265,7	878,6	474,3	205,1	73,4	39,5	3,8	0,0	134,2
2009	0,0	9,8	374,8	716,9	390,1	143,7	113,3	50,2	7,4	13,4	130,2
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1994	0,0	0,0	478,4	626,5	185,1	189,9	52,7	16,8	14,1	10,5	120,3
1995	0,0	0,0	378,2	443,1	232,1	151,5	26,0	48,8	27,1	0,0	102,2
1996	0,0	0,0	156,3	645,8	187,8	171,7	26,0	7,9	12,9	10,4	89,6
1997	0,0	0,0	252,2	300,7	136,0	60,1	26,3	7,7	12,2	0,0	59,4
1998	0,0	0,0	224,4	317,5	239,7	80,7	0,0	7,6	0,0	0,0	62,4
1999	0,0	0,0	148,0	336,4	188,3	69,8	42,3	14,9	0,0	0,0	59,3
2000	0,0	0,0	102,2	334,6	238,7	114,0	43,7	29,6	0,0	0,0	61,6
2001	0,0	0,0	139,0	418,5	201,5	103,1	46,1	29,6	0,0	0,0	65,3
2002	0,0	0,0	273,8	547,4	323,7	86,5	82,1	29,5	10,1	0,0	93,1
2003	0,0	0,0	341,9	631,4	377,4	88,3	35,5	22,2	0,0	0,0	102,0
2004	0,0	0,0	254,7	619,3	590,9	225,5	19,1	14,9	0,0	0,0	111,9
2005	0,0	0,0	365,3	809,2	445,2	296,7	20,6	7,5	27,5	0,0	131,4
2006	0,0	0,0	189,1	638,3	389,3	113,7	21,6	38,1	0,0	0,0	92,8
2007	0,0	0,0	337,0	923,5	293,3	115,6	88,1	23,6	17,3	0,0	120,2
2008	0,0	11,2	205,1	629,2	448,4	115,0	66,8	24,6	8,4	0,0	99,6
2009	0,0	0,0	263,5	719,9	420,7	226,8	45,3	51,4	0,0	7,3	115,9

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1994	26,6	0,0	482,6	398,4	362,0	221,1	98,7	58,4	0,0	0,0	137,7
1995	26,8	13,2	250,8	646,7	394,2	199,7	19,9	11,4	0,0	0,0	121,1
1996	0,0	0,0	410,8	531,1	265,1	206,4	77,7	11,1	0,0	0,0	117,3
1997	0,0	13,7	328,1	675,9	304,6	148,0	59,5	22,0	16,0	0,0	123,3
1998	30,2	13,8	172,5	623,9	462,8	68,5	20,2	10,9	0,0	16,3	103,9
1999	0,0	0,0	411,9	670,8	361,9	97,2	41,2	32,6	0,0	0,0	118,3
2000	0,0	14,2	374,7	675,3	436,4	212,4	42,2	32,7	14,6	0,0	129,8
2001	0,0	14,5	110,3	391,2	444,0	115,1	0,0	21,7	0,0	0,0	74,7
2002	0,0	0,0	376,6	818,4	354,7	90,9	92,2	32,8	0,0	0,0	121,7
2003	0,0	0,0	509,9	1 003,1	394,5	155,4	24,7	10,9	13,6	0,0	140,6
2004	0,0	30,9	617,7	975,9	684,2	346,5	183,2	32,9	13,3	0,0	193,3
2005	0,0	15,7	688,1	1 022,3	544,0	253,6	111,3	33,1	0,0	0,0	175,7
2006	0,0	16,4	457,7	819,7	429,3	191,0	88,1	33,4	0,0	0,0	133,6
2007	0,0	0,0	630,6	688,7	317,9	391,8	61,7	34,3	0,0	11,9	140,4
2008	0,0	17,9	442,3	846,9	353,6	162,5	0,0	11,8	0,0	0,0	116,4
2009	0,0	18,5	329,0	680,5	290,8	65,3	66,1	61,1	0,0	0,0	100,5
10 - Nord-du-Québec											
1994	0,0	0,0	343,2	1 047,9	375,0	280,1	0,0	0,0	0,0	0,0	168,3
1995	0,0	0,0	225,7	438,6	0,0	0,0	93,8	0,0	0,0	0,0	60,2
1996	0,0	0,0	0,0	583,1	128,2	199,2	0,0	0,0	96,7	0,0	80,6
1997	0,0	0,0	124,7	144,7	136,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,1	0,0	0,0	10,5
1999	0,0	0,0	0,0	591,7	152,9	0,0	100,5	59,8	0,0	0,0	75,1
2000	0,0	0,0	289,0	151,3	156,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1
2001	0,0	0,0	0,0	772,8	168,9	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	79,7
2002	0,0	0,0	0,0	675,7	171,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3
2003	0,0	0,0	156,5	874,1	347,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,6
2004	217,9	0,0	0,0	530,0	696,9	180,2	0,0	0,0	0,0	0,0	108,5
2005	0,0	93,3	0,0	182,8	714,3	575,8	173,3	0,0	0,0	0,0	123,2
2006	0,0	0,0	0,0	404,0	201,2	207,0	181,2	0,0	0,0	0,0	63,5
2007	0,0	0,0	182,8	378,1	190,8	191,2	200,8	0,0	0,0	0,0	76,1
2008	0,0	0,0	0,0	393,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7
2009	0,0	0,0	190,5	419,3	197,2	574,7	0,0	74,0	0,0	0,0	104,2

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1994	0,0	0,0	117,1	177,4	170,6	86,3	40,3	34,5	18,0	0,0	53,5
1995	0,0	0,0	48,2	149,9	120,4	66,7	82,1	0,0	0,0	0,0	33,5
1996	0,0	0,0	49,4	90,2	64,7	23,3	20,7	11,1	0,0	0,0	18,8
1997	34,6	0,0	50,8	60,8	68,3	49,3	21,2	32,8	0,0	0,0	26,6
1998	0,0	0,0	0,0	123,8	70,6	54,5	22,0	0,0	0,0	0,0	17,4
1999	0,0	0,0	27,7	32,3	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
2000	0,0	0,0	115,0	248,7	161,2	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	32,2
2001	0,0	0,0	118,8	529,5	128,0	70,8	25,1	0,0	0,0	10,7	51,0
2002	0,0	0,0	93,6	414,5	179,5	112,6	53,7	11,1	0,0	0,0	51,8
2003	0,0	0,0	197,5	370,0	140,3	234,2	58,5	33,8	0,0	0,0	62,8
2004	0,0	0,0	68,2	333,6	274,9	82,4	62,4	11,5	0,0	0,0	48,4
2005	0,0	0,0	69,8	344,7	401,6	83,9	67,9	0,0	0,0	0,0	50,7
2006	0,0	0,0	0,0	479,2	265,6	84,2	36,7	23,9	0,0	0,0	57,3
2007	0,0	0,0	138,4	287,5	211,1	176,4	77,7	12,3	11,7	0,0	51,2
2008	0,0	0,0	174,2	376,6	387,9	43,1	39,5	38,9	23,0	0,0	68,4
2009	0,0	0,0	175,4	516,8	391,3	165,6	41,1	40,5	0,0	0,0	72,7
12 - Chaudière-Appalaches											
1994	0,0	0,0	65,8	169,6	84,9	65,5	28,9	13,1	0,0	0,0	34,0
1995	0,0	0,0	51,3	150,7	72,8	30,4	11,6	6,4	5,1	0,0	23,9
1996	0,0	0,0	37,9	222,0	106,2	44,0	28,9	0,0	0,0	0,0	30,6
1997	0,0	0,0	56,8	159,2	141,5	59,2	35,1	3,1	4,5	0,0	34,1
1998	0,0	0,0	51,2	213,8	83,8	48,8	17,6	9,2	0,0	0,0	30,9
1999	0,0	0,0	71,7	242,0	75,5	29,1	11,9	12,1	4,1	0,0	33,9
2000	0,0	0,0	26,9	261,7	134,1	67,9	24,0	15,0	0,0	3,5	39,4
2001	0,0	0,0	69,1	301,0	197,8	70,1	30,8	3,0	0,0	0,0	48,0
2002	0,0	0,0	79,1	343,1	186,1	96,1	25,6	8,9	3,6	0,0	53,0
2003	0,0	4,0	103,1	407,8	261,1	105,2	27,1	8,9	3,5	0,0	65,0
2004	0,0	0,0	181,6	394,2	253,0	114,2	42,6	23,6	0,0	0,0	71,3
2005	0,0	0,0	91,4	305,6	304,6	114,2	52,0	26,6	10,0	5,8	65,5
2006	0,0	0,0	91,0	312,7	325,4	112,0	92,4	14,9	3,3	2,8	65,6
2007	0,0	0,0	44,5	321,5	217,4	93,6	31,7	15,2	6,4	5,3	50,9
2008	0,0	0,0	88,5	296,3	263,8	136,9	63,6	25,1	3,1	0,0	59,5
2009	0,0	0,0	208,9	452,9	323,8	141,7	55,7	25,7	9,3	2,4	81,8

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1994	8,6	0,0	207,0	258,1	103,3	38,1	13,4	16,5	11,0	4,5	49,5
1995	0,0	0,0	142,0	255,1	117,2	39,1	13,1	12,1	0,0	0,0	42,6
1996	0,0	0,0	132,1	177,0	52,5	20,2	19,3	11,9	0,0	4,2	30,4
1997	0,0	4,5	79,1	175,5	90,0	35,2	6,3	3,9	5,2	0,0	28,3
1998	0,0	4,5	121,9	299,4	175,2	59,5	37,7	7,6	5,0	0,0	50,4
1999	0,0	0,0	97,0	303,1	139,1	102,3	25,2	33,1	9,9	0,0	52,4
2000	0,0	0,0	134,8	304,6	248,1	97,7	31,6	14,2	14,5	0,0	59,4
2001	0,0	0,0	126,8	417,3	275,3	97,7	25,8	31,1	0,0	0,0	68,7
2002	0,0	0,0	179,4	443,4	244,3	99,1	85,8	20,1	9,1	0,0	75,8
2003	0,0	0,0	178,8	545,9	302,4	92,2	47,7	29,1	17,9	0,0	85,0
2004	0,0	0,0	245,2	596,3	352,5	142,6	56,2	25,2	8,7	0,0	97,4
2005	0,0	0,0	218,7	561,8	402,3	126,4	71,8	33,9	12,7	3,3	98,9
2006	0,0	0,0	284,0	715,6	321,0	127,3	94,3	18,4	4,1	6,3	106,4
2007	0,0	0,0	186,3	610,7	343,1	225,9	102,9	30,5	12,1	6,1	104,7
2008	0,0	0,0	352,6	774,6	478,9	203,8	82,1	46,0	15,6	0,0	133,7
2009	0,0	0,0	277,6	821,0	403,3	199,1	104,7	49,4	18,8	0,0	128,5
14 - Lanaudière											
1994	0,0	0,0	112,0	240,2	157,1	49,4	43,6	30,1	5,3	4,6	47,3
1995	6,9	3,5	123,9	254,3	44,1	16,9	10,7	9,8	5,0	0,0	31,8
1996	0,0	0,0	121,8	257,6	72,8	29,6	5,2	9,5	0,0	0,0	31,9
1997	0,0	0,0	92,6	217,5	47,3	18,6	15,6	3,1	0,0	0,0	26,4
1998	0,0	0,0	99,9	246,4	161,3	6,6	20,6	3,0	4,2	0,0	33,8
1999	0,0	0,0	113,7	383,9	258,2	78,6	5,2	14,7	4,0	0,0	54,4
2000	0,0	0,0	128,5	344,8	132,7	76,1	15,9	8,6	3,9	0,0	45,5
2001	0,0	0,0	186,3	368,6	226,8	47,3	66,5	22,4	3,7	0,0	61,3
2002	0,0	0,0	122,4	269,2	251,1	49,2	40,5	16,3	3,6	0,0	48,8
2003	0,0	0,0	136,4	413,8	178,9	115,6	48,6	10,6	7,0	3,2	59,3
2004	0,0	0,0	84,1	415,2	234,3	156,9	63,5	28,5	3,4	3,1	65,4
2005	0,0	0,0	193,7	291,7	279,1	102,7	33,3	17,7	3,3	2,9	60,6
2006	0,0	3,5	208,8	567,3	325,4	142,2	54,0	20,1	6,3	0,0	86,0
2007	0,0	0,0	173,0	501,5	264,1	195,2	54,2	22,9	9,1	5,2	80,3
2008	0,0	3,7	257,3	620,3	357,0	118,2	60,4	15,5	8,8	0,0	93,3
2009	0,0	0,0	335,9	758,1	312,4	146,9	87,1	23,6	14,1	0,0	110,6

Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1994	0,0	0,0	212,1	415,7	190,5	38,3	43,9	21,0	9,3	0,0	65,2
1995	0,0	0,0	119,9	335,3	165,4	48,2	47,4	14,4	0,0	0,0	50,0
1996	0,0	0,0	72,1	298,7	121,1	29,4	36,5	5,6	20,7	0,0	39,1
1997	0,0	0,0	84,3	163,4	103,8	15,2	31,6	8,2	3,9	0,0	27,8
1998	0,0	3,0	84,6	261,7	113,6	37,6	53,6	23,7	7,3	3,3	42,0
1999	0,0	0,0	129,3	348,6	144,0	34,2	17,8	7,6	0,0	3,2	44,1
2000	0,0	2,9	129,3	391,8	172,9	65,7	13,5	9,8	3,4	0,0	50,8
2001	0,0	0,0	207,3	394,0	201,3	97,8	36,6	16,7	6,4	3,0	63,5
2002	0,0	0,0	238,4	430,7	306,5	137,4	41,9	20,8	6,2	0,0	76,6
2003	0,0	0,0	287,5	625,5	247,8	176,2	57,9	15,7	6,0	8,0	91,4
2004	0,0	0,0	262,8	762,9	329,2	138,6	85,2	30,5	5,8	0,0	103,6
2005	0,0	0,0	192,7	615,9	348,7	186,1	68,1	27,8	24,9	2,4	95,0
2006	0,0	0,0	264,0	709,7	264,8	178,5	70,6	19,0	5,4	0,0	95,0
2007	0,0	0,0	180,2	683,1	374,9	150,9	66,7	23,4	15,5	0,0	93,9
2008	0,0	3,1	228,7	798,1	349,6	88,6	117,2	19,4	7,5	2,1	101,4
2009	0,0	3,1	300,2	810,3	464,7	121,7	117,0	35,0	16,8	0,0	120,7
16 - Montérégie											
1994	0,0	1,1	140,2	228,4	127,0	41,2	22,3	12,9	9,0	1,3	44,1
1995	0,0	0,0	100,5	208,4	117,4	41,9	13,6	12,7	2,9	2,6	36,8
1996	0,0	0,0	81,0	180,8	87,9	41,9	10,1	10,6	2,7	0,0	30,4
1997	0,0	0,0	75,0	151,1	108,5	40,1	10,1	6,6	6,5	1,2	28,5
1998	0,0	1,1	78,1	238,7	97,7	36,5	16,8	8,4	2,5	0,0	33,8
1999	0,0	0,0	85,2	223,7	127,2	60,2	22,0	11,0	1,2	0,0	37,4
2000	0,0	0,0	108,8	283,0	127,2	47,2	35,9	8,2	4,6	0,0	43,4
2001	0,0	0,0	108,9	344,1	177,6	75,8	37,1	8,0	2,3	1,1	52,1
2002	0,0	0,0	115,1	288,1	166,4	73,1	23,7	15,8	5,5	0,0	47,9
2003	2,9	0,0	136,8	339,7	186,2	81,0	26,6	14,6	2,2	2,0	54,2
2004	2,8	1,1	145,6	383,7	249,3	90,3	55,3	15,2	3,2	0,9	64,6
2005	0,0	0,0	123,4	303,2	199,3	117,6	51,0	16,7	7,2	2,7	56,3
2006	0,0	0,0	122,3	360,6	209,6	89,9	70,8	24,2	7,1	1,7	61,1
2007	0,0	1,2	157,8	417,1	251,4	108,2	46,6	26,2	7,9	1,6	69,4
2008	0,0	0,0	188,0	495,9	282,5	147,1	66,1	21,4	7,8	3,1	81,3
2009	0,0	1,2	229,3	573,6	303,3	171,3	66,2	30,5	8,5	1,5	93,3


Tableau 8 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1994	0,0	195,7	2 722,8	4 986,9	2 347,4	1 152,7	0,0	520,8	469,5	0,0	1 117,7
1995	0,0	92,7	1 750,0	4 392,8	1 639,3	2 222,2	2 083,3	728,2	0,0	0,0	1 085,3
1996	0,0	0,0	1 682,7	4 651,2	4 629,6	2 472,5	2 006,7	250,0	478,5	0,0	1 408,5
1997	0,0	0,0	2 102,8	4 464,3	2 752,3	4 020,1	1 960,8	242,1	454,5	0,0	1 371,3
1998	0,0	0,0	3 463,2	2 663,4	2 784,2	3 058,8	3 658,5	1 405,2	0,0	0,0	1 458,5
1999	0,0	0,0	2 526,3	6 443,9	2 237,1	2 836,9	2 339,2	921,7	0,0	440,5	1 506,0
2000	0,0	0,0	2 680,4	4 929,6	2 460,9	1 566,0	1 466,3	1 720,4	371,7	0,0	1 286,5
2001	0,0	0,0	4 251,0	7 052,9	3 579,4	1 354,4	2 542,4	1 059,3	706,7	418,4	1 733,3
2002	0,0	0,0	4 158,8	6 250,0	2 702,7	2 083,3	2 083,3	829,9	327,9	0,0	1 555,0
2003	0,0	153,8	2 626,6	5 077,3	4 439,3	1 882,4	255,1	1 688,6	660,1	0,0	1 468,6
2004	0,0	0,0	1 567,9	5 567,5	4 796,2	1 650,9	771,2	1 291,5	295,0	395,3	1 366,6
2005	0,0	0,0	2 280,1	5 341,9	3 301,9	1 873,5	1 754,4	539,6	551,0	0,0	1 319,6
2006	0,0	0,0	2 317,9	4 216,9	3 547,7	2 325,6	733,5	516,4	512,8	0,0	1 226,2
2007	0,0	0,0	2 607,4	5 675,1	4 488,8	1 777,8	2 313,6	640,0	516,8	0,0	1 516,5
2008	0,0	0,0	4 566,2	4 440,2	5 011,4	1 847,6	2 325,6	458,7	0,0	0,0	1 630,3
2009	0,0	0,0	2 184,1	4 735,9	2 000,0	2 619,0	2 244,4	457,3	245,7	0,0	1 232,7
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1994	0,0	0,0	332,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4
1995	0,0	0,0	167,8	158,7	847,5	216,9	0,0	0,0	0,0	0,0	139,5
1996	0,0	82,7	517,2	327,9	172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,4
1997	0,0	0,0	350,9	635,9	529,1	0,0	248,8	0,0	0,0	0,0	167,5
1998	0,0	0,0	565,0	660,1	856,2	189,8	248,8	0,0	0,0	0,0	233,4
1999	0,0	0,0	365,6	341,9	166,4	0,0	235,8	0,0	0,0	0,0	99,1
2000	0,0	0,0	0,0	523,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8
2001	0,0	0,0	1 034,5	518,1	472,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,1
2002	0,0	0,0	352,7	866,6	782,5	676,8	0,0	299,9	0,0	0,0	270,8
2003	0,0	0,0	1 188,5	1 256,7	800,0	331,7	380,2	0,0	0,0	0,0	337,9
2004	0,0	0,0	1 800,3	2 284,7	834,7	307,2	546,4	270,3	437,6	0,0	544,6
2005	0,0	0,0	1 408,5	1 718,2	1 003,3	1 065,4	181,2	0,0	0,0	0,0	458,9
2006	0,0	0,0	2 413,3	2 141,7	975,6	646,2	180,2	0,0	207,0	0,0	571,0
2007	0,0	0,0	2 425,1	2 079,7	819,7	632,9	371,1	0,0	0,0	202,4	551,4
2008	0,0	0,0	2 872,8	3 209,5	705,5	1 840,5	544,5	0,0	0,0	0,0	788,4
2009	0,0	0,0	2 046,4	4 404,6	2 040,8	635,9	834,7	108,9	185,5	0,0	835,5


Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Figure 21 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, province de Québec*, 1994 à 2009

Chez les femmes




Chez les hommes




* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.
 Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.
 Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 22 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Bas-Saint-Laurent, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 23 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 24 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Québec, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 25 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Mauricie et Centre-du-Québec, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 26 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Estrie, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 27 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Montréal, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 28 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Outaouais, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 29 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Abitibi-Témiscamingue, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 30 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Côte-Nord, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 31 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Nord-du-Québec, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 32 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 33 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Chaudière-Appalaches, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 34 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Laval, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 35 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Lanaudière, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 36 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Laurentides, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 37 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Montérégie, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 38 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Nunavik, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 39 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, selon le groupe d'âge, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes



Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009)..

Tableau 9 Nombre de cas déclarés d'infection à *Chlamydia trachomatis* selon le type chez les moins d'un an, province de Québec*, 1994 à 2009

Chlamydia	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	1994-2009
Génitale	8	5	2	3	5	3	1	3	1	7	2	2	3	2	0	3	50
Occulaire	11	8	9	6	3	5	4	6	1	6	5	1	1	3	1	3	73
Pulmonaire	10	8	5	4	4	6	5	6	4	5	2	1	2	2	2	3	69

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 10 Nombre de cas déclarés d'infection à *Chlamydia trachomatis* selon le type chez les moins d'un an, province de Québec* hors Montréal, 1994 à 2009

Chlamydia	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	1994-2009
Génitale	7	4	2	3	4	2	1	2	1	7	2	1	2	1	0	2	41
Occulaire	8	5	4	3	2	3	1	2	0	4	1	0	1	1	1	3	39
Pulmonaire	6	6	5	3	3	3	1	5	3	5	0	1	1	1	2	2	47

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.


Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 11 Nombre de cas déclarés d'infection à *Chlamydia trachomatis* selon le type chez les moins d'un an, Montréal, 1994 à 2009

Chlamydia	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	1994-2009
Génitale	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	9
Occulaire	3	3	5	3	1	2	3	4	1	2	4	1	0	2	0	0	34
Pulmonaire	4	2	0	1	1	3	4	1	1	0	2	0	1	1	0	1	22

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Figure 40 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, province de Québec*, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	230	171	145	139	114	137	127	163	204	207	148	166	364	420	595	658
Hommes	516	430	324	410	374	485	541	664	672	673	678	730	908	988	1 056	1 222
Inconnu	6	5	9	6	8	2	6	4	4	4	0	5	2	1	1	4
Total	752	606	478	555	496	624	674	831	880	884	826	901	1 274	1 409	1 652	1 884

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 41 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Bas-Saint-Laurent, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	2	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	1	3	3
Hommes	4	4	0	6	5	5	4	1	3	1	1	2	4	2	1	5
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	6	6	0	6	5	5	4	1	6	1	2	3	5	3	4	8

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 42 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	4	1	0	0	4	1	0	0	3	4	2	1	3	0	4	4
Hommes	8	5	6	4	5	4	5	4	3	6	4	1	6	6	18	10
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	12	6	6	4	9	5	5	4	6	10	6	2	9	6	22	14

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 43 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Québec, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	7	1	4	3	6	19	3	0	9	6	7	6	11	24	29	21
Hommes	48	26	12	23	23	44	42	41	29	45	26	41	47	60	66	50
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	55	27	16	26	29	63	45	41	38	51	33	47	58	84	95	71

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 44 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	11	2	1	8	2	2	6	3	4	7	4	6	8	6	7	12
Hommes	8	6	3	5	6	4	16	9	12	11	8	14	24	21	24	30
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	19	8	4	13	8	6	22	12	16	18	12	20	32	27	31	42

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 45 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Estrie, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	4	3	0	1	0	1	3	4	5	5	4	2	2	6	4	4
Hommes	8	4	3	7	2	5	5	18	11	13	5	8	10	7	8	9
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	12	7	3	8	2	6	8	22	16	18	9	10	12	13	12	13

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 46 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Montréal, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	107	98	89	66	46	74	72	98	88	79	69	77	185	232	250	272
Hommes	326	291	208	278	256	305	366	466	431	423	480	472	554	606	572	708
Inconnu	6	5	9	6	7	2	4	4	4	3	0	5	2	1	1	4
Total	439	394	306	350	309	381	442	568	523	505	549	554	741	839	823	984

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 47 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Outaouais, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	5	4	5	4	7	6	4	4	7	7	6	7	15	11	32	66
Hommes	8	5	4	9	6	17	18	17	19	25	37	28	18	25	26	40
Inconnu	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Total	13	9	9	13	13	23	23	21	26	33	43	35	33	36	58	106

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 48 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	2	8	6	3	5	1	0	6	0	7	2	1	2	1	3	7
Hommes	3	8	8	4	1	0	0	1	1	3	1	3	7	5	4	16
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	5	16	14	7	6	1	0	7	1	10	3	4	9	6	7	23

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 49 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Côte-Nord, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	3	2	3	4	2	0	1	0	0	0	4	1	0	3	4	5
Hommes	3	5	6	2	0	0	2	1	1	2	2	0	0	2	3	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	6	7	9	6	2	0	3	1	1	2	6	1	0	5	7	5

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 50 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Nord-du-Québec, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	1	0

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 51 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Hommes	0	2	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	2	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	1

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 52 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	5	0	2	1	0	0	0	0	3	1	1	2	1	6	4	5
Hommes	11	7	3	2	4	5	6	4	5	6	5	7	10	10	13	14
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	16	7	5	3	4	5	6	4	8	7	6	9	11	16	17	19

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 53 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Laval, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	4	5	3	5	4	2	4	9	4	14	3	12	20	28	39	43
Hommes	16	12	13	8	13	16	13	11	33	21	18	33	31	52	41	41
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	20	17	16	13	17	18	17	20	37	35	21	45	51	80	80	84

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2001-2009).

Figure 54 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Lanaudière, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	7	3	6	1	1	4	2	3	3	8	5	3	18	17	23	36
Hommes	10	4	3	1	7	11	9	19	16	14	10	17	26	28	30	40
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	17	7	9	2	8	15	11	22	19	22	15	20	44	45	53	76

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 55 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Laurentides, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	3	7	1	3	5	6	4	9	15	11	7	4	15	13	13	42
Hommes	8	7	7	5	8	14	10	16	19	17	17	14	39	28	27	34
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	11	14	8	8	13	20	14	25	34	28	24	18	54	41	40	76

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 56 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Montérégie, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	16	11	6	19	13	16	11	16	27	23	15	20	41	44	72	45
Hommes	35	36	42	47	34	50	36	46	69	68	53	74	92	91	109	113
Inconnu	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	51	47	48	66	48	66	48	62	96	91	68	94	133	135	181	158

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 57 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Nunavik, 1994 à 2009




Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	37	17	15	17	11	4	15	10	30	31	8	13	29	20	87	77
Hommes	20	6	2	6	2	5	9	8	17	13	8	14	32	40	104	99
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	57	23	17	23	13	9	24	18	47	44	16	27	61	60	191	176

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 58 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique selon le sexe, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	10	7	4	4	8	1	2	1	1	3	10	10	12	8	21	16
Hommes	0	2	1	2	2	0	0	1	0	3	3	2	8	3	8	12
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	10	9	5	6	10	1	2	2	1	6	13	12	20	11	29	28

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Ensemble du Québec*												
1994	1	4	112	164	170	142	60	65	20	2	0	752
1995	2	7	76	127	109	112	62	64	14	6	0	606
1996	0	3	64	99	83	71	67	48	21	4	0	478
1997	0	8	83	104	91	88	75	64	23	3	0	555
1998	1	4	54	105	84	83	70	55	18	3	0	496
1999	0	4	91	133	109	87	93	74	21	7	0	624
2000	0	4	86	130	120	95	117	91	20	4	0	674
2001	1	3	98	166	133	116	133	147	20	10	0	831
2002	1	2	124	229	137	117	120	111	25	11	0	880
2003	1	6	108	202	130	125	130	99	56	16	0	884
2004	1	2	87	190	140	105	109	137	44	8	0	826
2005	0	4	100	218	165	106	101	149	43	12	0	901
2006	2	7	180	308	216	142	121	171	69	18	0	1 274
2007	0	6	260	324	237	163	122	207	61	19	0	1 409
2008	0	12	285	489	305	190	114	180	60	14	0	1 652
2009	0	11	332	529	342	215	141	222	64	19	0	1 884
Ensemble du Québec hors Montréal												
1994	1	2	56	73	72	47	21	27	10	1	0	313
1995	1	2	31	50	37	38	20	24	3	3	0	212
1996	0	2	25	33	34	25	21	20	9	2	0	172
1997	0	5	38	44	37	27	21	21	11	0	0	205
1998	1	1	27	60	26	17	25	25	4	1	0	187
1999	0	3	41	54	36	30	32	34	11	2	0	243
2000	0	4	34	53	37	29	30	30	11	4	0	232
2001	0	2	41	64	32	34	32	43	7	7	0	263
2002	1	2	62	114	47	36	38	42	12	3	0	357
2003	1	5	71	98	42	37	50	42	25	8	0	379
2004	0	2	48	72	40	23	31	41	17	3	0	277
2005	0	4	52	84	69	30	40	39	22	7	0	347
2006	0	6	94	135	91	48	41	72	31	13	0	533
2007	0	2	120	146	95	60	42	72	25	8	0	570
2008	0	10	181	256	134	94	55	62	30	7	0	829
2009	0	5	202	284	153	94	54	75	26	7	0	900

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1994	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	6
1995	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	6
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	2	0	0	0	1	2	1	0	0	6
1998	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5
1999	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	5
2000	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	4
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2002	0	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0	6
2003	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2004	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2005	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3
2006	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	5
2007	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
2008	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	4
2009	0	0	1	1	3	2	0	1	0	0	0	8
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1994	0	0	0	5	2	4	1	0	0	0	0	12
1995	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	6
1996	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	0	6
1997	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4
1998	0	0	0	5	0	0	2	2	0	0	0	9
1999	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	5
2000	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5
2001	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	4
2002	0	0	1	2	1	0	0	0	2	0	0	6
2003	0	0	0	4	2	1	1	1	1	0	0	10
2004	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	6
2005	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2006	0	0	0	6	0	1	0	1	1	0	0	9
2007	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	6
2008	0	0	3	9	3	3	1	2	1	0	0	22
2009	0	0	1	4	4	1	2	1	1	0	0	14

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1994	0	0	1	10	19	9	4	10	2	0	0	55
1995	0	0	0	4	5	9	2	5	1	1	0	27
1996	0	0	1	4	4	3	3	0	1	0	0	16
1997	0	0	1	2	6	7	4	6	0	0	0	26
1998	0	0	5	7	3	2	8	4	0	0	0	29
1999	0	0	18	13	8	6	8	6	3	1	0	63
2000	0	0	5	11	9	8	5	4	1	2	0	45
2001	0	0	4	7	7	3	10	7	2	1	0	41
2002	0	0	5	8	4	7	7	4	2	1	0	38
2003	0	0	7	14	7	5	9	5	4	0	0	51
2004	0	0	0	8	7	2	7	3	5	1	0	33
2005	0	0	2	5	12	4	11	6	4	3	0	47
2006	0	1	4	13	13	8	4	8	3	4	0	58
2007	0	0	9	26	15	9	8	13	2	2	0	84
2008	0	0	19	28	15	11	6	8	6	2	0	95
2009	0	0	7	28	11	6	8	8	3	0	0	71
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1994	0	1	0	7	3	4	2	2	0	0	0	19
1995	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	0	8
1996	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	4
1997	0	2	1	5	2	2	1	0	0	0	0	13
1998	0	0	0	4	2	1	0	1	0	0	0	8
1999	0	0	0	3	0	1	1	1	0	0	0	6
2000	0	0	2	6	2	1	3	7	1	0	0	22
2001	0	0	5	2	1	1	0	1	2	0	0	12
2002	0	0	1	4	3	5	2	1	0	0	0	16
2003	0	0	2	6	5	0	3	2	0	0	0	18
2004	0	0	2	5	3	0	0	2	0	0	0	12
2005	0	1	4	3	4	3	1	4	0	0	0	20
2006	0	0	10	7	2	2	3	5	3	0	0	32
2007	0	0	5	7	4	2	0	5	4	0	0	27
2008	0	1	4	12	7	3	2	2	0	0	0	31
2009	0	0	4	7	10	6	4	6	4	1	0	42

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1994	0	0	0	3	3	4	1	1	0	0	0	12
1995	0	0	0	3	0	1	0	2	0	1	0	7
1996	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
1997	0	0	3	1	1	0	0	0	3	0	0	8
1998	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	6
2000	0	1	2	0	1	0	2	2	0	0	0	8
2001	0	0	3	3	0	5	4	3	0	4	0	22
2002	0	0	3	7	1	3	1	1	0	0	0	16
2003	0	0	3	2	2	3	4	1	3	0	0	18
2004	0	0	2	3	2	1	0	0	0	1	0	9
2005	0	0	1	4	3	0	1	0	1	0	0	10
2006	0	0	0	5	1	1	2	2	0	1	0	12
2007	0	1	3	1	4	0	0	2	1	1	0	13
2008	0	0	0	2	3	3	1	1	1	1	0	12
2009	0	0	1	4	4	2	1	1	0	0	0	13
06 - Montréal-Centre												
1994	0	2	56	91	98	95	39	38	10	1	0	439
1995	1	5	45	77	72	74	42	40	11	3	0	394
1996	0	1	39	66	49	46	46	28	12	2	0	306
1997	0	3	45	60	54	61	54	43	12	3	0	350
1998	0	3	27	45	58	66	45	30	14	2	0	309
1999	0	1	50	79	73	57	61	40	10	5	0	381
2000	0	0	52	77	83	66	87	61	9	0	0	442
2001	1	1	57	102	101	82	101	104	13	3	0	568
2002	0	0	62	115	90	81	82	69	13	8	0	523
2003	0	1	37	104	88	88	80	57	31	8	0	505
2004	1	0	39	118	100	82	78	96	27	5	0	549
2005	0	0	48	134	96	76	61	110	21	5	0	554
2006	2	1	86	173	125	94	80	99	38	5	0	741
2007	0	4	140	178	142	103	80	135	36	11	0	839
2008	0	2	104	233	171	96	59	118	30	7	0	823
2009	0	6	130	245	189	121	87	147	38	12	0	984

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1994	0	1	4	4	2	1	0	1	0	0	0	13
1995	0	0	2	1	2	3	1	0	0	0	0	9
1996	0	0	1	2	2	2	1	0	1	0	0	9
1997	0	0	2	6	2	0	2	0	0	0	0	13
1998	0	0	4	4	1	0	1	1	2	0	0	13
1999	0	0	2	6	5	2	4	3	1	0	0	23
2000	0	0	0	3	8	2	2	6	2	0	0	23
2001	0	0	4	8	2	3	1	2	0	1	0	21
2002	0	0	7	10	2	2	3	2	0	0	0	26
2003	0	1	8	6	2	4	1	6	5	0	0	33
2004	0	0	4	10	3	6	8	9	3	0	0	43
2005	0	0	5	10	9	1	4	2	4	0	0	35
2006	0	0	2	15	8	2	2	0	2	2	0	33
2007	0	0	10	8	7	4	2	3	2	0	0	36
2008	0	0	8	23	9	8	5	3	2	0	0	58
2009	0	0	28	33	20	9	3	10	2	1	0	106
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1994	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	5
1995	0	0	2	5	3	3	3	0	0	0	0	16
1996	0	0	2	3	2	3	2	0	1	1	0	14
1997	0	0	0	2	1	2	0	0	2	0	0	7
1998	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	6
1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	7
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	1	5	3	0	0	0	1	0	0	0	10
2004	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
2005	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4
2006	0	0	1	0	0	1	3	0	3	1	0	9
2007	0	0	0	2	1	0	1	1	1	0	0	6
2008	0	0	1	2	2	0	1	0	1	0	0	7
2009	0	0	6	9	4	1	0	2	1	0	0	23

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1994	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	6
1995	0	0	0	2	2	0	1	2	0	0	0	7
1996	0	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	9
1997	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	6
1998	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
2001	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2004	0	0	0	1	2	1	0	2	0	0	0	6
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	5
2008	0	1	3	0	0	0	1	2	0	0	0	7
2009	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5
10 - Nord-du-Québec												
1994	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
2003	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1994	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1995	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
1996	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
2008	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2009	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
12 - Chaudière-Appalaches												
1994	0	0	2	3	2	2	4	2	1	0	0	16
1995	0	0	2	1	2	0	0	0	0	1	0	7
1996	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	5
1997	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
1998	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4
1999	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	5
2000	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	6
2001	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4
2002	0	0	1	2	1	0	2	1	1	0	0	8
2003	0	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0	7
2004	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	6
2005	0	0	0	4	1	0	0	1	2	1	0	9
2006	0	0	2	2	2	0	0	3	2	0	0	11
2007	0	0	2	4	4	5	1	0	0	0	0	16
2008	0	0	4	5	3	1	0	3	1	0	0	17
2009	0	0	4	5	2	3	2	1	0	2	0	19

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1994	0	0	3	2	4	4	2	5	0	0	0	20
1995	0	0	1	6	4	3	2	1	0	0	0	17
1996	0	0	5	1	5	2	0	3	0	0	0	16
1997	0	0	3	4	1	3	2	0	0	0	0	13
1998	0	0	2	4	1	3	4	2	1	0	0	17
1999	0	0	0	1	5	3	3	3	3	0	0	18
2000	0	0	0	4	3	3	4	3	0	0	0	17
2001	0	0	3	7	2	1	4	2	1	0	0	20
2002	0	0	3	13	3	4	8	4	2	0	0	37
2003	1	0	9	10	3	1	3	6	1	1	0	35
2004	0	0	4	5	5	2	1	2	2	0	0	21
2005	0	2	11	13	7	4	2	2	4	0	0	45
2006	0	1	16	15	10	2	1	4	2	0	0	51
2007	0	0	19	20	12	12	4	11	0	2	0	80
2008	0	0	22	28	15	8	4	2	1	0	0	80
2009	0	0	26	27	11	6	1	8	4	1	0	84
14 - Lanaudière												
1994	0	0	3	1	8	1	1	1	2	0	0	17
1995	1	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	7
1996	0	0	0	2	4	0	1	2	0	0	0	9
1997	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
1998	0	0	0	3	2	1	0	2	0	0	0	8
1999	0	1	1	3	3	2	3	2	0	0	0	15
2000	0	0	0	1	3	4	2	0	1	0	0	11
2001	0	0	1	3	4	3	1	10	0	0	0	22
2002	0	0	4	7	2	1	2	2	1	0	0	19
2003	0	2	3	6	0	4	3	1	2	1	0	22
2004	0	0	4	1	1	2	2	4	1	0	0	15
2005	0	0	2	5	4	2	1	4	1	1	0	20
2006	0	2	7	12	9	3	2	9	0	0	0	44
2007	0	0	9	11	9	3	3	9	1	0	0	45
2008	0	5	18	13	4	7	1	3	2	0	0	53
2009	0	1	19	29	7	6	8	4	2	0	0	76

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1994	0	0	4	0	1	0	1	2	2	1	0	11
1995	0	0	1	3	4	2	3	1	0	0	0	14
1996	0	0	0	3	3	0	1	0	1	0	0	8
1997	0	0	2	1	2	2	1	0	0	0	0	8
1998	0	0	3	5	1	1	1	2	0	0	0	13
1999	0	1	4	3	4	4	2	1	1	0	0	20
2000	0	2	2	2	2	0	3	0	2	1	0	14
2001	0	2	6	8	1	3	2	2	0	1	0	25
2002	0	0	11	7	7	2	3	4	0	0	0	34
2003	0	0	3	9	1	4	4	2	3	2	0	28
2004	0	0	4	10	2	1	5	0	1	1	0	24
2005	0	0	4	4	3	3	1	2	1	0	0	18
2006	0	0	11	11	10	6	3	8	3	1	0	54
2007	0	0	13	11	6	2	1	4	3	1	0	41
2008	0	0	13	13	7	1	0	4	2	0	0	40
2009	0	0	27	23	9	7	4	6	0	0	0	76
16 - Montérégie												
1994	1	0	11	6	13	11	4	2	2	0	0	51
1995	0	0	7	9	10	7	4	7	2	0	0	47
1996	0	1	8	6	4	9	7	11	2	0	0	48
1997	0	1	15	11	12	7	8	8	4	0	0	66
1998	0	0	6	14	10	4	6	7	0	1	0	48
1999	0	0	10	18	9	8	7	11	3	0	0	66
2000	0	0	10	10	6	9	6	4	2	1	0	48
2001	0	0	6	11	9	11	10	12	2	0	0	62
2002	0	0	10	29	16	9	8	19	3	2	0	96
2003	0	0	9	20	12	10	17	13	6	4	0	91
2004	0	0	10	16	11	6	5	17	3	0	0	68
2005	0	0	11	24	12	9	14	18	4	2	0	94
2006	0	1	24	23	21	14	13	22	10	4	0	133
2007	0	1	29	33	18	19	11	15	7	2	0	135
2008	0	2	32	55	27	20	16	17	8	4	0	181
2009	0	0	26	51	33	22	9	8	8	1	0	158

Tableau 12 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1994	0	0	17	23	9	3	1	1	1	0	0	57
1995	0	0	10	7	1	1	2	1	0	0	0	23
1996	0	0	2	5	4	2	4	0	0	0	0	17
1997	0	1	4	7	5	3	1	1	1	0	0	23
1998	0	1	3	4	3	0	1	0	1	0	0	13
1999	0	0	2	5	0	2	0	0	0	0	0	9
2000	0	1	11	11	0	0	0	1	0	0	0	24
2001	0	0	6	7	4	1	0	0	0	0	0	18
2002	1	1	16	20	6	2	1	0	0	0	0	47
2003	0	1	17	11	5	3	4	3	0	0	0	44
2004	0	1	3	6	2	1	3	0	0	0	0	16
2005	0	1	4	8	7	2	5	0	0	0	0	27
2006	0	0	9	16	12	7	7	9	1	0	0	61
2007	0	0	10	15	12	2	9	8	4	0	0	60
2008	0	1	41	53	34	27	16	15	4	0	0	191
2009	0	4	40	52	29	21	9	19	1	1	0	176
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1994	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	0	10
1995	0	1	3	3	1	1	0	0	0	0	0	9
1996	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	5
1997	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	6
1998	1	0	0	6	1	1	0	1	0	0	0	10
1999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
2001	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
2002	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2003	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6
2004	0	0	12	0	0	0	0	1	0	0	0	13
2005	0	0	7	3	1	1	0	0	0	0	0	12
2006	0	1	7	8	2	1	0	0	1	0	0	20
2007	0	0	7	3	0	1	0	0	0	0	0	11
2008	0	0	11	13	3	1	1	0	0	0	0	29
2009	0	0	10	7	6	2	3	0	0	0	0	28

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Ensemble du Québec*												
1994	1	4	79	78	26	18	6	8	4	1	0	230
1995	1	7	60	49	23	10	11	5	0	0	0	171
1996	0	3	47	43	22	14	8	4	1	0	0	145
1997	0	8	56	41	12	9	4	4	4	0	0	139
1998	0	4	41	42	14	4	2	2	3	1	0	114
1999	0	4	61	44	9	6	7	4	0	1	0	137
2000	0	4	48	38	17	7	2	6	3	1	0	127
2001	1	3	64	43	22	12	5	9	3	0	0	163
2002	1	2	73	70	24	13	10	7	3	0	0	204
2003	1	5	70	64	19	17	15	9	6	1	0	207
2004	1	2	52	42	20	12	8	5	5	1	0	148
2005	0	3	56	58	23	12	9	4	1	0	0	166
2006	2	6	112	124	48	27	10	12	4	4	0	364
2007	0	6	163	114	55	36	20	18	4	2	0	420
2008	0	8	198	215	74	49	23	17	9	0	0	595
2009	0	10	224	221	102	48	21	22	6	3	0	658
Ensemble du Québec hors Montréal												
1994	1	2	41	42	17	8	4	3	2	0	0	123
1995	0	2	21	23	11	6	4	5	0	0	0	73
1996	0	2	13	17	13	4	3	2	1	0	0	56
1997	0	5	25	23	9	5	3	1	1	0	0	73
1998	0	1	21	32	8	1	0	2	2	1	0	68
1999	0	3	26	20	4	4	3	3	0	0	0	63
2000	0	4	21	16	6	2	1	4	0	1	0	55
2001	0	2	26	19	7	8	0	3	0	0	0	65
2002	1	2	40	42	15	4	7	3	2	0	0	116
2003	1	4	50	33	14	9	10	5	1	1	0	128
2004	0	2	29	17	10	8	4	3	5	1	0	79
2005	0	3	27	31	14	5	6	2	1	0	0	89
2006	0	5	63	52	26	13	6	7	3	3	0	179
2007	0	2	77	51	21	17	8	9	2	1	0	188
2008	0	6	114	119	40	38	16	7	5	0	0	345
2009	0	4	136	130	51	33	14	13	5	0	0	386

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1994	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
1995	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2007	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2008	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3
2009	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1994	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
1999	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
2003	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	4
2004	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
2005	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	4
2009	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1994	0	0	1	4	0	1	1	0	0	0	0	7
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	4
1997	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3
1998	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6
1999	0	0	12	5	1	0	0	1	0	0	0	19
2000	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	3	2	1	2	1	0	0	0	0	9
2003	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	6
2004	0	0	0	1	2	1	0	0	3	0	0	7
2005	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	6
2006	0	1	2	1	2	2	1	0	1	1	0	11
2007	0	0	6	10	3	2	1	1	0	1	0	24
2008	0	0	10	11	2	4	0	1	1	0	0	29
2009	0	0	2	12	1	3	2	1	0	0	0	21
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1994	0	1	0	6	3	0	1	0	0	0	0	11
1995	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1996	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1997	0	2	0	4	1	0	1	0	0	0	0	8
1998	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2000	0	0	1	3	1	0	0	1	0	0	0	6
2001	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2002	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4
2003	0	0	2	1	2	0	2	0	0	0	0	7
2004	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4
2005	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	6
2006	0	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	8
2007	0	0	1	3	1	0	0	0	1	0	0	6
2008	0	0	1	4	1	0	1	0	0	0	0	7
2009	0	0	2	3	4	0	0	2	1	0	0	12

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1994	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4
1995	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2001	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	4
2002	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5
2003	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	5
2004	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	4
2005	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
2006	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2007	0	1	1	0	3	0	0	1	0	0	0	6
2008	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4
2009	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4
06 - Montréal-Centre												
1994	0	2	38	36	9	10	2	5	2	1	0	107
1995	1	5	39	26	12	4	7	0	0	0	0	98
1996	0	1	34	26	9	10	5	2	0	0	0	89
1997	0	3	31	18	3	4	1	3	3	0	0	66
1998	0	3	20	10	6	3	2	0	1	0	0	46
1999	0	1	35	24	5	2	4	1	0	1	0	74
2000	0	0	27	22	11	5	1	2	3	0	0	72
2001	1	1	38	24	15	4	5	6	3	0	0	98
2002	0	0	33	28	9	9	3	4	1	0	0	88
2003	0	1	20	31	5	8	5	4	5	0	0	79
2004	1	0	23	25	10	4	4	2	0	0	0	69
2005	0	0	29	27	9	7	3	2	0	0	0	77
2006	2	1	49	72	22	14	4	5	1	1	0	185
2007	0	4	86	63	34	19	12	9	2	1	0	232
2008	0	2	84	96	34	11	7	10	4	0	0	250
2009	0	6	88	91	51	15	7	9	1	3	0	272

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1994	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	5
1995	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4
1996	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	5
1997	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
1998	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	7
1999	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	6
2000	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
2001	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	4
2002	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	7
2003	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	7
2004	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	6
2005	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	7
2006	0	0	1	7	4	1	1	0	0	1	0	15
2007	0	0	6	2	1	1	0	0	1	0	0	11
2008	0	0	8	18	6	0	0	0	0	0	0	32
2009	0	0	25	22	10	4	1	4	0	0	0	66
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1994	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1995	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	8
1996	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	6
1997	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
1998	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	5
1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	6
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	1	3	2	0	0	0	1	0	0	0	7
2004	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
2007	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2008	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
2009	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	7

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1994	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
1995	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1996	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
1997	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4
1998	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	4
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
2008	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4
2009	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5
10 - Nord-du-Québec												
1994	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2003	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1994	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Chaudière-Appalaches												
1994	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1997	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3
2003	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2005	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2006	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2007	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	6
2008	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
2009	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	5

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1994	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	4
1995	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	5
1996	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1997	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5
1998	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
1999	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
2000	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	4
2001	0	0	2	5	1	1	0	0	0	0	0	9
2002	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
2003	1	0	7	4	2	0	0	0	0	0	0	14
2004	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3
2005	0	2	6	2	0	0	1	0	1	0	0	12
2006	0	1	12	5	2	0	0	0	0	0	0	20
2007	0	0	15	6	3	2	0	2	0	0	0	28
2008	0	0	18	13	3	3	1	0	1	0	0	39
2009	0	0	23	14	1	2	0	1	2	0	0	43
14 - Lanaudière												
1994	0	0	3	1	2	0	0	0	1	0	0	7
1995	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
1996	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	6
1997	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1999	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4
2000	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
2001	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
2002	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2003	0	2	1	2	0	0	1	1	1	0	0	8
2004	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	5
2005	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
2006	0	1	6	6	2	1	0	2	0	0	0	18
2007	0	0	6	1	3	3	2	2	0	0	0	17
2008	0	3	9	3	1	5	0	0	2	0	0	23
2009	0	1	11	15	2	2	4	1	0	0	0	36

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1994	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
1995	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	7
1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
1998	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5
1999	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	6
2000	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2001	0	2	5	1	0	1	0	0	0	0	0	9
2002	0	0	9	3	2	0	1	0	0	0	0	15
2003	0	0	2	6	0	2	1	0	0	0	0	11
2004	0	0	3	1	1	1	1	0	0	0	0	7
2005	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	4
2006	0	0	7	3	3	0	0	1	1	0	0	15
2007	0	0	7	4	0	2	0	0	0	0	0	13
2008	0	0	5	6	1	1	0	0	0	0	0	13
2009	0	0	22	10	2	5	1	2	0	0	0	42
16 - Montérégie												
1994	1	0	8	3	2	1	0	0	0	0	0	16
1995	0	0	4	0	3	2	2	0	0	0	0	11
1996	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	6
1997	0	1	12	5	1	0	0	0	0	0	0	19
1998	0	0	3	5	4	0	0	0	0	1	0	13
1999	0	0	6	5	1	3	0	1	0	0	0	16
2000	0	0	5	2	2	0	0	1	0	1	0	11
2001	0	0	6	2	4	1	0	3	0	0	0	16
2002	0	0	4	12	5	1	3	2	0	0	0	27
2003	0	0	6	6	3	3	2	2	0	1	0	23
2004	0	0	3	8	1	2	1	0	0	0	0	15
2005	0	0	7	7	4	0	2	0	0	0	0	20
2006	0	1	18	7	7	3	3	0	0	1	0	41
2007	0	1	20	15	2	3	1	2	0	0	0	44
2008	0	1	24	27	7	7	4	2	0	0	0	72
2009	0	0	15	14	8	4	1	1	2	0	0	45

Tableau 13 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1994	0	0	13	15	4	2	1	0	0	0	0	37
1995	0	0	7	6	1	1	1	0	0	0	0	17
1996	0	0	2	5	3	2	3	0	0	0	0	15
1997	0	1	4	4	4	2	1	0	1	0	0	17
1998	0	1	3	4	2	0	0	0	1	0	0	11
1999	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
2000	0	1	7	6	0	0	0	1	0	0	0	15
2001	0	0	4	3	2	1	0	0	0	0	0	10
2002	1	1	13	10	3	1	1	0	0	0	0	30
2003	0	1	15	5	4	1	4	1	0	0	0	31
2004	0	1	3	1	1	1	1	0	0	0	0	8
2005	0	1	0	5	4	1	2	0	0	0	0	13
2006	0	0	7	11	5	3	0	3	0	0	0	29
2007	0	0	5	6	4	1	3	1	0	0	0	20
2008	0	1	26	22	13	14	6	4	1	0	0	87
2009	0	3	21	22	15	11	4	1	0	0	0	77
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1994	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	0	10
1995	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	7
1996	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
1997	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
1998	0	0	0	5	1	1	0	1	0	0	0	8
1999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2002	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2003	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2004	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	10
2005	0	0	6	3	0	1	0	0	0	0	0	10
2006	0	1	3	6	1	1	0	0	0	0	0	12
2007	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	8
2008	0	0	7	10	2	1	1	0	0	0	0	21
2009	0	0	6	5	4	1	0	0	0	0	0	16

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Ensemble du Québec*												
1994	0	0	32	85	144	120	54	57	16	1	0	516
1995	1	0	16	78	84	101	51	59	14	6	0	430
1996	0	0	17	55	61	57	56	44	20	4	0	324
1997	0	0	27	62	79	79	70	60	19	2	0	410
1998	1	0	13	61	70	79	68	53	15	2	0	374
1999	0	0	29	89	100	81	86	70	21	6	0	485
2000	0	0	38	92	103	88	115	84	15	3	0	541
2001	0	0	34	122	111	103	127	138	17	10	0	664
2002	0	0	51	158	113	103	110	104	21	11	0	672
2003	0	1	38	137	111	107	115	90	50	15	0	673
2004	0	0	35	148	120	93	101	132	39	7	0	678
2005	0	1	44	158	141	94	91	145	42	12	0	730
2006	0	1	68	183	168	115	111	159	64	14	0	908
2007	0	0	97	210	182	127	101	189	57	17	0	988
2008	0	4	87	274	231	140	91	163	51	14	0	1 056
2009	0	1	108	307	240	166	120	200	58	16	0	1 222
Ensemble du Québec hors Montréal												
1994	0	0	15	31	55	39	17	24	8	1	0	190
1995	1	0	10	27	26	32	16	19	3	3	0	139
1996	0	0	12	16	21	21	18	18	8	2	0	116
1997	0	0	13	21	28	22	18	20	10	0	0	132
1998	1	0	6	27	18	16	25	23	2	0	0	118
1999	0	0	15	34	32	26	29	31	11	2	0	180
2000	0	0	13	37	31	27	29	25	10	3	0	175
2001	0	0	15	45	25	26	32	40	7	7	0	198
2002	0	0	22	72	32	32	31	39	10	3	0	241
2003	0	1	21	64	28	28	40	37	24	7	0	250
2004	0	0	19	55	30	15	27	38	12	2	0	198
2005	0	1	25	53	55	25	34	37	21	7	0	258
2006	0	1	31	83	65	35	35	65	28	10	0	354
2007	0	0	43	95	74	43	34	63	23	7	0	382
2008	0	4	67	137	94	56	39	55	25	7	0	484
2009	0	1	66	154	102	61	40	62	21	7	0	514

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1994	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4
1995	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	2	0	0	0	1	2	1	0	0	6
1998	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5
1999	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	5
2000	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	4
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
2003	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2004	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
2006	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
2007	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2009	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	5
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1994	0	0	0	2	1	4	1	0	0	0	0	8
1995	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	5
1996	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	0	6
1997	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4
1998	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	5
1999	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	4
2000	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5
2001	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	4
2002	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
2003	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0	6
2004	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4
2005	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	6
2007	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	6
2008	0	0	3	7	3	2	0	2	1	0	0	18
2009	0	0	1	2	2	1	2	1	1	0	0	10

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1994	0	0	0	6	19	8	3	10	2	0	0	48
1995	0	0	0	4	5	9	2	4	1	1	0	26
1996	0	0	1	2	3	3	3	0	0	0	0	12
1997	0	0	1	2	5	6	4	5	0	0	0	23
1998	0	0	2	4	3	2	8	4	0	0	0	23
1999	0	0	6	8	7	6	8	5	3	1	0	44
2000	0	0	2	11	9	8	5	4	1	2	0	42
2001	0	0	4	7	7	3	10	7	2	1	0	41
2002	0	0	2	6	3	5	6	4	2	1	0	29
2003	0	0	4	13	5	5	9	5	4	0	0	45
2004	0	0	0	7	5	1	7	3	2	1	0	26
2005	0	0	2	4	11	2	11	4	4	3	0	41
2006	0	0	2	12	11	6	3	8	2	3	0	47
2007	0	0	3	16	12	7	7	12	2	1	0	60
2008	0	0	9	17	13	7	6	7	5	2	0	66
2009	0	0	5	16	10	3	6	7	3	0	0	50
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1994	0	0	0	1	0	4	1	2	0	0	0	8
1995	0	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	6
1996	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
1997	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	5
1998	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	6
1999	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	4
2000	0	0	1	3	1	1	3	6	1	0	0	16
2001	0	0	3	1	1	1	0	1	2	0	0	9
2002	0	0	0	3	1	5	2	1	0	0	0	12
2003	0	0	0	5	3	0	1	2	0	0	0	11
2004	0	0	1	2	3	0	0	2	0	0	0	8
2005	0	1	1	1	4	2	1	4	0	0	0	14
2006	0	0	6	4	2	1	3	5	3	0	0	24
2007	0	0	4	4	3	2	0	5	3	0	0	21
2008	0	1	3	8	6	3	1	2	0	0	0	24
2009	0	0	2	4	6	6	4	4	3	1	0	30

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1994	0	0	0	2	2	2	1	1	0	0	0	8
1995	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	4
1996	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
1997	0	0	3	0	1	0	0	0	3	0	0	7
1998	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	5
2000	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	5
2001	0	0	1	2	0	4	4	3	0	4	0	18
2002	0	0	1	4	1	3	1	1	0	0	0	11
2003	0	0	1	1	1	2	4	1	3	0	0	13
2004	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	5
2005	0	0	0	4	2	0	1	0	1	0	0	8
2006	0	0	0	3	1	1	2	2	0	1	0	10
2007	0	0	2	1	1	0	0	1	1	1	0	7
2008	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	8
2009	0	0	0	2	3	2	1	1	0	0	0	9
06 - Montréal-Centre												
1994	0	0	17	54	89	81	37	33	8	0	0	326
1995	0	0	6	51	58	69	35	40	11	3	0	291
1996	0	0	5	39	40	36	38	26	12	2	0	208
1997	0	0	14	41	51	57	52	40	9	2	0	278
1998	0	0	7	34	52	63	43	30	13	2	0	256
1999	0	0	14	55	68	55	57	39	10	4	0	305
2000	0	0	25	55	72	61	86	59	5	0	0	366
2001	0	0	19	77	86	77	95	98	10	3	0	466
2002	0	0	29	86	81	71	79	65	11	8	0	431
2003	0	0	17	73	83	79	75	53	26	8	0	423
2004	0	0	16	93	90	78	74	94	27	5	0	480
2005	0	0	19	105	86	69	57	108	21	5	0	472
2006	0	0	37	100	103	80	76	94	36	4	0	554
2007	0	0	54	115	108	84	67	126	34	10	0	606
2008	0	0	20	137	137	84	52	108	26	7	0	572
2009	0	0	42	153	138	105	80	138	37	9	0	708

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1994	0	0	1	4	2	1	0	0	0	0	0	8
1995	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	5
1996	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	4
1997	0	0	2	3	2	0	2	0	0	0	0	9
1998	0	0	0	3	1	0	1	0	1	0	0	6
1999	0	0	2	1	5	2	4	2	1	0	0	17
2000	0	0	0	1	7	2	1	5	2	0	0	18
2001	0	0	2	7	2	2	1	2	0	1	0	17
2002	0	0	3	7	2	2	3	2	0	0	0	19
2003	0	1	2	4	2	4	1	6	5	0	0	25
2004	0	0	2	9	2	6	7	9	2	0	0	37
2005	0	0	3	6	8	1	4	2	4	0	0	28
2006	0	0	1	8	4	1	1	0	2	1	0	18
2007	0	0	4	6	6	3	2	3	1	0	0	25
2008	0	0	0	5	3	8	5	3	2	0	0	26
2009	0	0	3	11	10	5	2	6	2	1	0	40
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1994	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3
1995	0	0	0	3	1	1	3	0	0	0	0	8
1996	0	0	0	2	0	2	2	0	1	1	0	8
1997	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	4
1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2005	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
2006	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	7
2007	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	5
2008	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	4
2009	0	0	3	6	3	1	0	2	1	0	0	16

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1994	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3
1995	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	5
1996	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	6
1997	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
2001	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2004	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2008	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Nord-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
2003	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
1996	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
2008	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2009	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
12 - Chaudière-Appalaches												
1994	0	0	1	2	1	1	3	2	1	0	0	11
1995	0	0	2	1	2	0	0	0	0	1	0	7
1996	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3
1997	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
1998	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4
1999	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	5
2000	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	6
2001	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4
2002	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	5
2003	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	6
2004	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	5
2005	0	0	0	2	1	0	0	1	2	1	0	7
2006	0	0	1	2	2	0	0	3	2	0	0	10
2007	0	0	0	3	4	2	1	0	0	0	0	10
2008	0	0	2	3	3	1	0	3	1	0	0	13
2009	0	0	2	3	2	3	1	1	0	2	0	14

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1994	0	0	2	2	3	4	2	3	0	0	0	16
1995	0	0	0	4	2	3	2	1	0	0	0	12
1996	0	0	2	1	5	2	0	3	0	0	0	13
1997	0	0	0	2	1	3	2	0	0	0	0	8
1998	0	0	0	2	1	3	4	2	1	0	0	13
1999	0	0	0	1	4	3	2	3	3	0	0	16
2000	0	0	0	3	1	2	4	3	0	0	0	13
2001	0	0	1	2	1	0	4	2	1	0	0	11
2002	0	0	3	11	2	4	7	4	2	0	0	33
2003	0	0	2	6	1	1	3	6	1	1	0	21
2004	0	0	3	5	4	2	1	2	1	0	0	18
2005	0	0	5	11	7	4	1	2	3	0	0	33
2006	0	0	4	10	8	2	1	4	2	0	0	31
2007	0	0	4	14	9	10	4	9	0	2	0	52
2008	0	0	4	15	12	5	3	2	0	0	0	41
2009	0	0	3	13	10	4	1	7	2	1	0	41
14 - Lanaudière												
1994	0	0	0	0	6	1	1	1	1	0	0	10
1995	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	4
1996	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3
1997	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	2	2	1	0	2	0	0	0	7
1999	0	0	0	3	3	1	2	2	0	0	0	11
2000	0	0	0	0	3	3	2	0	1	0	0	9
2001	0	0	0	2	4	2	1	10	0	0	0	19
2002	0	0	2	6	2	1	2	2	1	0	0	16
2003	0	0	2	4	0	4	2	0	1	1	0	14
2004	0	0	1	1	1	1	2	3	1	0	0	10
2005	0	0	2	2	4	2	1	4	1	1	0	17
2006	0	1	1	6	7	2	2	7	0	0	0	26
2007	0	0	3	10	6	0	1	7	1	0	0	28
2008	0	2	9	10	3	2	1	3	0	0	0	30
2009	0	0	8	14	5	4	4	3	2	0	0	40

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1994	0	0	2	0	1	0	1	2	1	1	0	8
1995	0	0	0	1	3	1	2	0	0	0	0	7
1996	0	0	0	3	2	0	1	0	1	0	0	7
1997	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	5
1998	0	0	1	2	1	1	1	2	0	0	0	8
1999	0	0	0	3	4	4	1	1	1	0	0	14
2000	0	0	0	2	2	0	3	0	2	1	0	10
2001	0	0	1	7	1	2	2	2	0	1	0	16
2002	0	0	2	4	5	2	2	4	0	0	0	19
2003	0	0	1	3	1	2	3	2	3	2	0	17
2004	0	0	1	9	1	0	4	0	1	1	0	17
2005	0	0	3	2	3	3	0	2	1	0	0	14
2006	0	0	4	8	7	6	3	7	2	1	0	39
2007	0	0	6	7	6	0	1	4	3	1	0	28
2008	0	0	8	7	6	0	0	4	2	0	0	27
2009	0	0	5	13	7	2	3	4	0	0	0	34
16 - Montérégie												
1994	0	0	3	3	11	10	4	2	2	0	0	35
1995	0	0	3	9	7	5	2	7	2	0	0	36
1996	0	0	5	5	3	9	7	11	2	0	0	42
1997	0	0	3	6	11	7	8	8	4	0	0	47
1998	0	0	3	8	6	4	6	7	0	0	0	34
1999	0	0	4	13	8	5	7	10	3	0	0	50
2000	0	0	5	8	4	9	6	3	1	0	0	36
2001	0	0	0	9	5	10	10	9	2	0	0	46
2002	0	0	6	17	11	8	5	17	3	2	0	69
2003	0	0	3	14	9	7	15	11	6	3	0	68
2004	0	0	7	8	10	4	4	17	3	0	0	53
2005	0	0	4	17	8	9	12	18	4	2	0	74
2006	0	0	6	16	14	11	10	22	10	3	0	92
2007	0	0	9	18	16	16	10	13	7	2	0	91
2008	0	1	8	28	20	13	12	15	8	4	0	109
2009	0	0	11	37	25	18	8	7	6	1	0	113

Tableau 14 Nombre de cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1994	0	0	4	8	5	1	0	1	1	0	0	20
1995	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0	6
1996	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1997	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	6
1998	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	5
2000	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	9
2001	0	0	2	4	2	0	0	0	0	0	0	8
2002	0	0	3	10	3	1	0	0	0	0	0	17
2003	0	0	2	6	1	2	0	2	0	0	0	13
2004	0	0	0	5	1	0	2	0	0	0	0	8
2005	0	0	4	3	3	1	3	0	0	0	0	14
2006	0	0	2	5	7	4	7	6	1	0	0	32
2007	0	0	5	9	8	1	6	7	4	0	0	40
2008	0	0	15	31	21	13	10	11	3	0	0	104
2009	0	1	19	30	14	10	5	18	1	1	0	99
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
1998	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2004	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2005	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
2006	0	0	4	2	1	0	0	0	1	0	0	8
2007	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
2008	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	8
2009	0	0	4	2	2	1	3	0	0	0	0	12

Source des numérateurs : Registre MAD0, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Ensemble du Québec*											
1994	0,2	0,4	22,9	34,9	31,3	21,7	9,3	5,9	2,7	0,2	10,5
1995	0,4	0,8	15,4	27,1	21,1	17,4	9,5	5,7	1,8	0,5	8,4
1996	0,0	0,3	12,8	21,0	16,6	11,4	10,2	4,2	2,6	0,3	6,6
1997	0,0	0,9	16,7	21,8	18,8	14,6	11,4	5,5	2,8	0,3	7,6
1998	0,2	0,4	10,9	21,7	17,7	14,6	10,7	4,6	2,1	0,2	6,8
1999	0,0	0,4	18,6	26,8	23,2	16,1	14,3	6,2	2,3	0,6	8,5
2000	0,0	0,4	18,0	25,7	25,6	18,4	18,2	7,4	2,1	0,3	9,2
2001	0,3	0,3	21,0	32,2	28,1	23,1	21,3	11,8	2,1	0,8	11,2
2002	0,3	0,2	26,9	44,4	28,3	23,7	19,9	8,8	2,5	0,8	11,8
2003	0,3	0,7	23,6	39,3	26,2	25,6	22,5	7,8	5,5	1,2	11,8
2004	0,3	0,2	19,0	37,2	27,5	21,6	19,7	10,7	4,2	0,6	11,0
2005	0,0	0,4	21,5	43,2	31,8	21,8	19,0	11,6	4,0	0,8	11,9
2006	0,5	0,8	37,7	61,8	40,9	29,0	23,4	13,4	6,3	1,2	16,7
2007	0,0	0,7	52,9	66,2	44,6	32,5	24,0	16,4	5,4	1,2	18,3
2008	0,0	1,4	56,7	100,7	57,1	36,8	22,6	14,6	5,2	0,9	21,3
2009	0,0	1,3	65,7	109,1	64,2	40,6	28,1	18,3	5,5	1,2	24,1
Ensemble du Québec hors Montréal											
1994	0,3	0,3	14,4	21,7	18,9	9,6	4,2	3,2	1,8	0,1	5,8
1995	0,3	0,3	7,9	14,9	10,3	7,9	4,0	2,8	0,5	0,4	3,9
1996	0,0	0,3	6,3	9,7	9,8	5,4	4,2	2,3	1,5	0,2	3,2
1997	0,0	0,7	9,6	12,6	11,0	6,1	4,2	2,3	1,7	0,0	3,7
1998	0,3	0,1	6,9	16,9	7,9	4,1	5,0	2,7	0,6	0,1	3,4
1999	0,0	0,4	10,7	14,9	11,1	7,7	6,5	3,7	1,6	0,2	4,4
2000	0,0	0,5	9,0	14,5	11,4	7,8	6,2	3,2	1,5	0,4	4,2
2001	0,0	0,3	11,1	17,4	9,9	9,5	6,8	4,5	0,9	0,7	4,7
2002	0,4	0,3	17,2	30,8	14,2	10,4	8,4	4,3	1,6	0,3	6,4
2003	0,4	0,7	19,9	26,5	12,4	10,8	11,6	4,3	3,2	0,8	6,8
2004	0,0	0,3	13,4	19,5	11,5	6,8	7,6	4,1	2,1	0,3	4,9
2005	0,0	0,6	14,3	23,1	19,3	8,8	10,3	3,9	2,6	0,7	6,1
2006	0,0	0,9	25,0	37,8	25,0	13,9	10,9	7,3	3,6	1,2	9,3
2007	0,0	0,3	30,8	41,5	25,9	16,9	11,4	7,4	2,8	0,7	9,8
2008	0,0	1,5	45,5	73,0	36,3	25,8	15,1	6,5	3,3	0,6	14,1
2009	0,0	0,8	50,7	80,5	41,4	25,1	14,9	8,1	2,8	0,6	15,2

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1994	0,0	0,0	6,1	8,4	8,1	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
1995	0,0	0,0	0,0	16,2	8,7	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	5,5	5,7	4,2	0,0	2,9
1998	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	7,4	5,7	5,6	0,0	0,0	2,4
1999	0,0	0,0	6,4	0,0	9,4	0,0	5,9	2,8	0,0	2,5	2,4
2000	0,0	0,0	6,7	7,3	0,0	0,0	6,1	0,0	3,6	0,0	1,9
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,5
2002	0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	9,3	0,0	5,6	3,3	0,0	3,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2004	0,0	4,5	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,5
2006	0,0	0,0	7,7	16,6	8,7	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	2,5
2007	0,0	0,0	15,6	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
2008	0,0	0,0	8,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,0
2009	0,0	0,0	8,1	8,6	26,9	18,0	0,0	3,4	0,0	0,0	4,0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1994	0,0	0,0	0,0	28,9	11,0	15,3	3,6	0,0	0,0	0,0	4,1
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,8	0,0	0,0	2,1
1996	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	4,3	0,0	6,4	3,2	0,0	2,1
1997	0,0	0,0	0,0	5,0	6,6	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	1,4
1998	0,0	0,0	0,0	23,9	0,0	0,0	7,6	4,1	0,0	0,0	3,1
1999	0,0	0,0	4,2	4,7	0,0	0,0	3,9	4,0	0,0	0,0	1,7
2000	0,0	0,0	0,0	4,7	6,5	6,0	4,1	2,0	0,0	0,0	1,8
2001	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	6,4	0,0	3,9	0,0	0,0	1,4
2002	0,0	0,0	4,9	9,8	6,3	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	2,1
2003	0,0	0,0	0,0	19,9	12,4	7,0	5,2	1,9	2,5	0,0	3,6
2004	0,0	0,0	10,7	15,3	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
2005	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2006	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	6,8	0,0	2,1	2,3	0,0	3,3
2007	0,0	0,0	0,0	17,5	6,0	6,5	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2
2008	0,0	0,0	16,4	53,6	18,1	19,1	7,2	4,6	2,2	0,0	8,1
2009	0,0	0,0	5,6	24,4	24,2	6,3	14,5	2,4	2,1	0,0	5,2

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1994	0,0	0,0	2,4	21,3	38,6	15,8	6,8	9,7	2,9	0,0	8,6
1995	0,0	0,0	0,0	8,7	10,6	16,2	3,5	4,8	1,4	0,9	4,2
1996	0,0	0,0	2,3	8,8	8,8	5,6	5,2	0,0	1,3	0,0	2,5
1997	0,0	0,0	2,3	4,4	13,5	13,6	7,0	5,6	0,0	0,0	4,0
1998	0,0	0,0	11,7	15,6	6,9	4,1	14,2	3,7	0,0	0,0	4,5
1999	0,0	0,0	43,2	28,5	18,4	13,2	14,4	5,4	3,5	0,9	9,7
2000	0,0	0,0	12,5	23,3	21,0	18,5	9,2	3,6	1,1	1,7	6,9
2001	0,0	0,0	10,4	14,2	16,4	7,1	19,1	6,3	2,2	0,8	6,3
2002	0,0	0,0	13,3	16,2	9,0	17,0	13,9	3,6	2,1	0,8	5,8
2003	0,0	0,0	18,7	28,8	15,3	12,3	18,9	4,4	4,1	0,0	7,7
2004	0,0	0,0	0,0	16,7	14,7	4,9	15,5	2,7	5,0	0,7	5,0
2005	0,0	0,0	5,4	10,5	24,6	9,8	25,7	5,4	3,9	2,2	7,1
2006	0,0	1,5	10,5	27,7	26,0	19,6	9,6	7,3	2,9	2,8	8,7
2007	0,0	0,0	23,1	57,9	29,0	21,2	19,6	12,1	1,9	1,3	12,5
2008	0,0	0,0	47,6	63,9	29,0	25,0	14,8	7,7	5,6	1,3	14,0
2009	0,0	0,0	17,4	64,9	21,5	13,1	19,7	7,9	2,8	0,0	10,4
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1994	0,0	1,6	0,0	25,3	9,9	9,9	4,7	2,7	0,0	0,0	4,0
1995	0,0	0,0	2,8	7,1	7,0	5,1	0,0	1,3	0,0	0,0	1,7
1996	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	5,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,8
1997	0,0	3,3	2,8	16,4	7,5	5,7	2,4	0,0	0,0	0,0	2,7
1998	0,0	0,0	0,0	12,7	7,6	3,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,7
1999	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	3,2	2,5	1,2	0,0	0,0	1,2
2000	0,0	0,0	6,0	18,4	7,7	3,4	7,6	8,5	1,5	0,0	4,6
2001	0,0	0,0	15,5	6,1	3,8	3,6	0,0	1,2	3,0	0,0	2,5
2002	0,0	0,0	3,2	12,2	11,1	18,8	5,6	1,2	0,0	0,0	3,3
2003	0,0	0,0	6,6	18,5	18,0	0,0	9,0	2,4	0,0	0,0	3,7
2004	0,0	0,0	6,7	15,6	10,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,5
2005	0,0	1,8	13,5	9,6	13,4	11,7	3,4	4,9	0,0	0,0	4,1
2006	0,0	0,0	33,1	23,2	6,6	7,6	10,7	6,2	4,0	0,0	6,6
2007	0,0	0,0	16,2	23,7	13,2	7,5	0,0	6,4	5,1	0,0	5,5
2008	0,0	2,0	12,8	41,4	23,1	10,8	7,6	2,7	0,0	0,0	6,3
2009	0,0	0,0	12,8	24,4	33,3	20,7	15,3	8,3	4,9	0,8	8,5

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1994	0,0	0,0	0,0	16,3	15,7	17,2	4,2	2,4	0,0	0,0	4,3
1995	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	4,4	0,0	4,7	0,0	2,1	2,5
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	6,5	0,0	1,1
1997	0,0	0,0	14,3	5,1	5,6	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	2,8
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,7
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,2	4,2	6,5	0,0	0,0	2,1
2000	0,0	2,7	10,0	0,0	5,7	0,0	8,6	4,3	0,0	0,0	2,8
2001	0,0	0,0	15,4	14,3	0,0	27,6	17,7	6,4	0,0	7,4	7,6
2002	0,0	0,0	15,5	33,1	5,5	17,2	4,6	2,1	0,0	0,0	5,5
2003	0,0	0,0	15,6	9,5	10,6	17,6	19,3	2,1	7,2	0,0	6,1
2004	0,0	0,0	10,5	14,2	10,3	5,9	0,0	0,0	0,0	1,7	3,0
2005	0,0	0,0	5,3	19,0	15,1	0,0	5,3	0,0	2,3	0,0	3,3
2006	0,0	0,0	0,0	23,9	5,0	5,8	10,9	4,2	0,0	1,6	4,0
2007	0,0	3,0	15,2	4,9	19,8	0,0	0,0	4,3	2,2	1,5	4,3
2008	0,0	0,0	0,0	10,0	14,7	16,2	5,8	2,2	2,1	1,5	3,9
2009	0,0	0,0	5,0	20,3	19,4	10,5	5,8	2,3	0,0	0,0	4,2
06 - Montréal-Centre											
1994	0,0	1,1	55,7	67,7	60,7	58,7	26,0	14,9	5,3	0,3	24,4
1995	0,9	2,7	44,4	58,0	46,2	45,5	27,6	15,4	5,8	0,9	21,9
1996	0,0	0,5	38,5	50,4	32,5	28,5	29,9	10,7	6,2	0,6	17,0
1997	0,0	1,6	44,0	46,5	36,4	38,4	35,2	16,2	6,0	0,9	19,5
1998	0,0	1,6	26,0	34,8	40,0	43,0	29,4	11,2	6,9	0,6	17,2
1999	0,0	0,5	48,3	58,8	50,8	38,1	39,6	14,6	4,8	1,4	21,0
2000	0,0	0,0	51,2	54,3	57,2	45,1	56,1	21,9	4,2	0,0	24,1
2001	1,0	0,5	57,1	69,4	67,9	56,6	65,5	36,6	5,9	0,8	30,7
2002	0,0	0,0	61,9	78,8	58,3	55,5	53,7	24,0	5,8	2,2	28,0
2003	0,0	0,5	36,9	72,1	56,0	60,2	53,8	19,7	13,5	2,2	27,0
2004	1,0	0,0	38,8	82,5	62,7	56,3	53,7	33,1	11,6	1,4	29,3
2005	0,0	0,0	47,7	94,3	59,6	52,6	42,9	37,9	8,8	1,4	29,6
2006	2,1	0,5	85,2	122,3	76,1	65,7	57,0	34,3	15,8	1,3	39,5
2007	0,0	2,1	136,2	129,0	86,2	70,1	57,5	47,1	14,8	2,9	44,6
2008	0,0	1,1	98,9	172,5	103,6	63,6	42,5	41,4	12,2	1,8	43,5
2009	0,0	3,3	121,9	185,5	116,0	78,3	62,7	52,0	15,4	3,1	51,8

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1994	0,0	2,4	20,3	19,5	7,7	3,2	0,0	2,1	0,0	0,0	4,2
1995	0,0	0,0	10,2	4,9	8,2	9,8	3,3	0,0	0,0	0,0	2,9
1996	0,0	0,0	5,0	10,0	8,7	6,7	3,2	0,0	3,2	0,0	2,9
1997	0,0	0,0	10,0	30,2	9,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	4,1
1998	0,0	0,0	19,7	20,1	4,6	0,0	3,2	1,9	5,6	0,0	4,1
1999	0,0	0,0	9,7	30,3	23,6	7,8	13,0	5,5	2,7	0,0	7,3
2000	0,0	0,0	0,0	15,0	38,2	8,3	6,6	10,7	5,1	0,0	7,2
2001	0,0	0,0	18,8	39,1	9,5	12,7	3,3	3,5	0,0	2,2	6,5
2002	0,0	0,0	32,7	48,1	9,4	8,6	10,3	3,4	0,0	0,0	7,9
2003	0,0	2,2	37,1	28,3	9,2	17,3	3,5	9,9	11,3	0,0	9,9
2004	0,0	0,0	18,2	46,0	13,7	25,8	29,7	14,6	6,5	0,0	12,8
2005	0,0	0,0	22,0	45,7	40,7	4,3	15,5	3,2	8,3	0,0	10,3
2006	0,0	0,0	8,5	68,3	35,8	8,7	8,0	0,0	4,0	3,6	9,6
2007	0,0	0,0	40,8	36,4	30,9	17,3	8,1	4,8	3,9	0,0	10,3
2008	0,0	0,0	32,0	104,0	39,2	34,1	20,5	4,9	3,8	0,0	16,4
2009	0,0	0,0	111,7	146,0	86,0	37,9	12,3	16,6	3,7	1,6	29,7
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1994	0,0	0,0	16,2	10,2	8,5	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
1995	0,0	0,0	16,1	50,4	27,3	21,1	20,3	0,0	0,0	0,0	10,3
1996	0,0	0,0	16,1	29,7	19,1	22,0	13,4	0,0	6,6	4,8	9,0
1997	0,0	0,0	0,0	19,6	9,8	15,4	0,0	0,0	12,6	0,0	4,5
1998	0,0	0,0	25,0	9,6	10,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
1999	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	18,0	42,6	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,7
2003	0,0	4,9	49,1	32,6	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	6,9
2004	0,0	0,0	10,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	2,1
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
2006	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	11,8	32,7	0,0	13,8	3,8	6,2
2007	0,0	0,0	0,0	22,9	11,5	0,0	11,2	4,0	4,5	0,0	4,1
2008	0,0	0,0	9,6	22,9	23,4	0,0	11,5	0,0	4,4	0,0	4,8
2009	0,0	0,0	58,5	101,4	46,8	11,4	0,0	8,7	4,2	0,0	15,9

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1994	0,0	0,0	23,7	14,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
1995	0,0	0,0	0,0	28,1	25,0	0,0	10,2	12,0	0,0	0,0	6,7
1996	0,0	0,0	47,2	13,9	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
1997	0,0	6,9	12,2	27,1	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
1998	0,0	0,0	12,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	13,3	0,0	0,0	7,7	0,0	3,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	1,0
2003	0,0	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
2004	0,0	0,0	0,0	16,2	35,3	16,1	0,0	11,2	0,0	0,0	6,2
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	30,4	36,7	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	5,2
2008	0,0	9,1	45,0	0,0	0,0	0,0	16,3	12,1	0,0	0,0	7,3
2009	0,0	0,0	30,7	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
10 - Nord-du-Québec											
1994	0,0	0,0	120,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	263,4	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6
2003	0,0	0,0	83,6	89,9	0,0	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1994	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
1995	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
1996	0,0	0,0	12,8	15,6	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	1,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	1,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	1,1
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	2,1
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
2009	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
12 - Chaudière-Appalaches											
1994	0,0	0,0	6,8	12,7	8,0	6,1	11,7	3,4	2,7	0,0	4,2
1995	0,0	0,0	6,6	4,2	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,8
1996	0,0	0,0	0,0	8,3	4,3	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	1,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,1	0,0	0,0	0,8
1998	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	7,1	0,0	1,6	0,0	0,0	1,0
1999	0,0	0,0	3,4	3,7	0,0	3,8	3,0	1,5	0,0	0,0	1,3
2000	0,0	0,0	0,0	7,3	8,7	0,0	3,1	1,5	0,0	0,0	1,5
2001	0,0	0,0	3,6	7,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2002	0,0	0,0	3,7	7,3	4,3	0,0	6,6	1,5	1,8	0,0	2,0
2003	0,0	0,0	0,0	7,3	8,3	4,2	3,5	1,5	0,0	0,0	1,8
2004	0,0	0,0	0,0	7,5	8,0	0,0	0,0	1,5	1,7	0,0	1,5
2005	0,0	0,0	0,0	15,4	3,9	0,0	0,0	1,5	3,3	1,3	2,3
2006	0,0	0,0	7,8	8,0	7,7	0,0	0,0	4,6	3,3	0,0	2,8
2007	0,0	0,0	7,7	16,1	15,6	20,3	4,1	0,0	0,0	0,0	4,0
2008	0,0	0,0	15,3	20,5	11,8	4,0	0,0	4,8	1,6	0,0	4,2
2009	0,0	0,0	15,4	20,8	7,9	11,6	8,3	1,6	0,0	2,2	4,7

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1994	0,0	0,0	13,8	9,4	16,2	12,8	6,6	10,1	0,0	0,0	6,0
1995	0,0	0,0	4,6	28,7	17,0	9,8	6,5	2,0	0,0	0,0	5,1
1996	0,0	0,0	22,6	4,8	22,1	6,8	0,0	5,8	0,0	0,0	4,8
1997	0,0	0,0	13,5	19,1	4,6	10,6	6,3	0,0	0,0	0,0	3,9
1998	0,0	0,0	9,0	18,7	4,7	11,2	12,6	3,7	2,4	0,0	5,0
1999	0,0	0,0	0,0	4,6	23,7	11,8	9,5	5,4	7,1	0,0	5,3
2000	0,0	0,0	0,0	18,0	14,2	12,2	12,7	5,2	0,0	0,0	4,9
2001	0,0	0,0	14,0	30,7	9,4	4,1	13,0	3,4	2,3	0,0	5,7
2002	0,0	0,0	13,9	57,1	13,9	16,6	26,5	6,6	4,4	0,0	10,4
2003	5,4	0,0	41,1	43,6	13,6	4,2	10,2	9,6	2,2	1,5	9,7
2004	0,0	0,0	17,9	21,7	22,3	8,5	3,5	3,1	4,2	0,0	5,8
2005	0,0	4,3	47,2	56,4	30,9	17,0	7,2	3,1	8,3	0,0	12,2
2006	0,0	2,2	66,1	64,8	43,7	8,5	3,6	6,2	4,0	0,0	13,7
2007	0,0	0,0	74,5	86,8	50,9	50,2	14,7	16,9	0,0	2,7	21,2
2008	0,0	0,0	83,3	120,6	62,3	32,4	14,9	3,1	1,9	0,0	20,8
2009	0,0	0,0	96,0	114,3	45,3	23,6	3,8	12,4	7,4	1,3	21,5
14 - Lanaudière											
1994	0,0	0,0	11,8	5,1	32,1	2,7	2,7	1,7	5,4	0,0	4,6
1995	3,5	1,8	7,7	5,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	1,9
1996	0,0	0,0	0,0	9,9	17,7	0,0	2,6	3,2	0,0	0,0	2,4
1997	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1998	0,0	0,0	0,0	13,7	9,4	3,3	0,0	3,0	0,0	0,0	2,1
1999	0,0	1,7	3,7	13,5	14,3	7,0	7,8	2,9	0,0	0,0	3,8
2000	0,0	0,0	0,0	4,5	14,2	15,0	5,3	0,0	2,0	0,0	2,8
2001	0,0	0,0	3,8	13,1	19,1	11,6	2,8	14,0	0,0	0,0	5,6
2002	0,0	0,0	15,0	29,8	9,4	4,0	5,8	2,7	1,8	0,0	4,7
2003	0,0	3,4	11,2	25,0	0,0	16,3	9,1	1,3	3,5	1,5	5,4
2004	0,0	0,0	14,6	4,1	4,3	8,1	6,3	5,2	1,7	0,0	3,6
2005	0,0	0,0	6,9	20,3	16,3	7,9	3,3	5,1	1,6	1,4	4,7
2006	0,0	3,5	22,7	48,9	35,1	11,3	6,8	11,4	0,0	0,0	10,1
2007	0,0	0,0	27,8	44,3	34,4	11,0	10,2	11,5	1,5	0,0	10,2
2008	0,0	9,3	53,5	51,0	15,0	24,6	3,4	3,9	2,9	0,0	11,7
2009	0,0	1,9	56,0	109,2	25,9	20,1	27,2	5,3	2,8	0,0	16,5

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1994	0,0	0,0	14,2	0,0	3,3	0,0	2,5	3,1	4,7	1,7	2,6
1995	0,0	0,0	3,5	12,6	13,7	4,8	7,2	1,5	0,0	0,0	3,2
1996	0,0	0,0	0,0	12,6	10,6	0,0	2,3	0,0	2,1	0,0	1,8
1997	0,0	0,0	6,7	4,0	7,3	5,1	2,3	0,0	0,0	0,0	1,8
1998	0,0	0,0	10,0	19,4	3,8	2,7	2,2	2,7	0,0	0,0	2,9
1999	0,0	1,5	13,4	11,4	15,1	11,3	4,4	1,3	1,8	0,0	4,4
2000	0,0	3,0	6,7	7,4	7,5	0,0	6,7	0,0	3,4	1,4	3,0
2001	0,0	2,9	20,2	28,8	3,8	9,1	4,6	2,4	0,0	1,4	5,3
2002	0,0	0,0	36,8	24,7	25,8	6,2	7,0	4,6	0,0	0,0	7,1
2003	0,0	0,0	9,9	31,6	3,6	12,6	9,7	2,2	4,5	2,5	5,7
2004	0,0	0,0	13,0	34,8	6,9	3,2	12,6	0,0	1,4	1,2	4,8
2005	0,0	0,0	12,3	14,0	10,2	9,4	2,6	2,1	1,4	0,0	3,5
2006	0,0	0,0	31,7	38,9	33,3	18,6	8,1	8,5	4,0	1,1	10,4
2007	0,0	0,0	35,3	38,7	19,9	6,1	2,8	4,3	3,9	1,0	7,8
2008	0,0	0,0	33,9	44,4	23,0	3,0	0,0	4,3	2,5	0,0	7,5
2009	0,0	0,0	69,2	75,6	29,1	20,4	11,2	6,6	0,0	0,0	14,0
16 - Montérégie											
1994	1,1	0,0	12,0	7,6	14,5	9,4	3,4	1,0	1,5	0,0	4,0
1995	0,0	0,0	7,6	11,6	11,8	6,1	3,4	3,4	1,4	0,0	3,7
1996	0,0	0,6	8,6	7,7	4,9	8,2	5,9	5,3	1,4	0,0	3,7
1997	0,0	0,6	16,2	13,7	15,3	6,7	6,7	3,8	2,6	0,0	5,1
1998	0,0	0,0	6,6	17,0	13,0	4,0	5,0	3,2	0,0	0,5	3,7
1999	0,0	0,0	11,1	21,4	11,9	8,5	5,9	5,0	1,8	0,0	5,1
2000	0,0	0,0	11,3	11,7	8,0	10,1	5,1	1,8	1,2	0,5	3,7
2001	0,0	0,0	6,9	12,8	11,9	12,7	8,8	5,3	1,1	0,0	4,7
2002	0,0	0,0	11,6	33,7	20,7	10,7	7,3	8,3	1,6	0,9	7,3
2003	0,0	0,0	10,6	23,2	15,1	12,0	16,2	5,5	3,2	1,8	6,8
2004	0,0	0,0	11,7	18,5	13,3	7,2	4,9	7,2	1,6	0,0	5,0
2005	0,0	0,0	12,4	28,2	14,2	10,7	14,4	7,5	2,0	0,8	6,9
2006	0,0	0,6	26,0	27,5	24,4	16,4	13,6	9,2	4,9	1,6	9,6
2007	0,0	0,6	30,1	40,0	20,8	21,7	11,7	6,3	3,4	0,8	9,7
2008	0,0	1,2	32,2	66,6	30,9	22,2	17,3	7,3	3,8	1,4	12,8
2009	0,0	0,0	26,0	60,7	37,7	23,8	9,7	3,5	3,7	0,3	11,1

Tableau 15 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1994	0,0	0,0	2 210,7	3 050,4	1 077,8	449,1	201,6	134,0	237,5	0,0	675,3
1995	0,0	0,0	1 280,4	913,8	120,5	143,5	386,8	127,4	0,0	0,0	265,3
1996	0,0	0,0	246,3	595,2	476,8	275,5	716,8	0,0	0,0	0,0	192,7
1997	0,0	43,5	491,4	800,0	578,0	389,6	171,2	125,6	227,3	0,0	249,4
1998	0,0	43,0	338,2	489,6	343,2	0,0	160,5	0,0	220,3	0,0	138,3
1999	0,0	0,0	214,6	613,5	0,0	243,6	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5
2000	0,0	40,5	1 141,1	1 351,4	0,0	0,0	0,0	114,8	0,0	0,0	242,1
2001	0,0	0,0	619,2	894,0	460,8	121,5	0,0	0,0	0,0	0,0	183,3
2002	73,9	40,2	1 516,6	2 541,3	692,8	240,1	138,5	0,0	0,0	0,0	465,6
2003	0,0	40,0	1 628,4	1 236,0	600,2	355,9	554,0	294,1	0,0	0,0	426,8
2004	0,0	39,6	273,7	643,1	241,8	121,1	409,3	0,0	0,0	0,0	151,4
2005	0,0	38,9	352,4	829,9	837,3	237,5	666,7	0,0	0,0	0,0	249,9
2006	0,0	0,0	784,7	1 647,8	1 357,5	837,3	925,9	786,7	129,9	0,0	557,0
2007	0,0	0,0	824,4	1 469,1	1 444,0	231,2	1 196,8	656,3	534,0	0,0	537,8
2008	0,0	39,7	3 277,4	5 155,6	3 798,9	3 176,5	2 094,2	1 190,5	516,1	0,0	1 683,7
2009	0,0	155,1	3 262,6	4 901,0	3 138,5	2 530,1	1 162,8	1 485,5	125,0	161,6	1 525,9
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1994	0,0	0,0	339,8	413,9	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,5
1995	0,0	42,9	262,5	235,5	92,0	112,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8
1996	0,0	0,0	0,0	243,1	0,0	0,0	136,2	0,0	0,0	0,0	43,3
1997	0,0	0,0	268,1	161,7	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,2
1998	64,6	0,0	0,0	507,6	86,5	98,1	0,0	94,0	0,0	0,0	84,5
1999	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
2000	0,0	0,0	91,4	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	0,0	0,0	16,4
2001	0,0	0,0	0,0	86,6	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
2002	0,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
2003	0,0	0,0	336,1	174,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5
2004	0,0	0,0	997,5	0,0	0,0	0,0	0,0	66,9	0,0	0,0	94,1
2005	0,0	0,0	562,7	253,6	83,1	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
2006	0,0	32,8	545,6	656,8	163,9	80,3	0,0	0,0	104,3	0,0	139,5
2007	0,0	0,0	522,4	250,6	0,0	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2
2008	0,0	0,0	786,8	1 083,3	253,2	79,9	91,1	0,0	0,0	0,0	193,7
2009	0,0	0,0	700,3	580,0	499,2	160,3	259,3	0,0	0,0	0,0	182,9

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 10 juin 2009.

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Ensemble du Québec*											
1994	0,4	0,9	33,2	33,8	9,7	5,6	1,9	1,5	1,1	0,2	6,3
1995	0,4	1,6	24,9	21,2	9,1	3,2	3,4	0,9	0,0	0,0	4,7
1996	0,0	0,7	19,3	18,6	9,0	4,6	2,4	0,7	0,2	0,0	3,9
1997	0,0	1,8	23,1	17,6	5,1	3,1	1,2	0,7	0,9	0,0	3,8
1998	0,0	0,9	17,1	17,7	6,0	1,4	0,6	0,3	0,7	0,1	3,1
1999	0,0	0,9	25,7	18,2	3,9	2,3	2,2	0,7	0,0	0,1	3,7
2000	0,0	0,9	20,7	15,4	7,4	2,8	0,6	1,0	0,6	0,1	3,4
2001	0,5	0,7	28,2	17,1	9,5	4,9	1,6	1,4	0,6	0,0	4,3
2002	0,6	0,4	32,5	27,9	10,2	5,4	3,4	1,1	0,6	0,0	5,4
2003	0,6	1,1	31,4	25,6	7,9	7,2	5,3	1,4	1,2	0,1	5,5
2004	0,6	0,4	23,3	16,9	8,1	5,1	3,0	0,8	0,9	0,1	3,9
2005	0,0	0,7	24,6	23,6	9,1	5,1	3,5	0,6	0,2	0,0	4,3
2006	1,1	1,4	47,9	51,2	18,5	11,4	4,0	1,9	0,7	0,5	9,4
2007	0,0	1,4	67,9	47,7	21,1	14,8	8,1	2,9	0,7	0,2	10,8
2008	0,0	2,0	80,7	90,6	28,3	19,5	9,4	2,8	1,5	0,0	15,2
2009	0,0	2,5	90,9	93,1	39,1	18,5	8,6	3,7	1,0	0,3	16,7
Ensemble du Québec hors Montréal											
1994	0,6	0,6	21,8	25,9	9,0	3,3	1,6	0,7	0,7	0,0	4,5
1995	0,0	0,6	11,0	14,1	6,2	2,5	1,6	1,2	0,0	0,0	2,7
1996	0,0	0,6	6,7	10,4	7,6	1,7	1,2	0,5	0,3	0,0	2,0
1997	0,0	1,4	13,1	13,7	5,5	2,3	1,2	0,2	0,3	0,0	2,6
1998	0,0	0,3	11,1	18,6	5,0	0,5	0,0	0,4	0,6	0,2	2,5
1999	0,0	0,8	14,0	11,5	2,5	2,1	1,2	0,6	0,0	0,0	2,3
2000	0,0	1,1	11,6	9,2	3,8	1,1	0,4	0,8	0,0	0,2	2,0
2001	0,0	0,6	14,6	10,8	4,4	4,5	0,0	0,6	0,0	0,0	2,3
2002	0,7	0,6	22,8	23,7	9,4	2,3	3,1	0,6	0,5	0,0	4,1
2003	0,8	1,1	28,9	18,6	8,5	5,4	4,7	1,0	0,3	0,2	4,5
2004	0,0	0,6	16,7	9,6	5,9	4,8	2,0	0,6	1,2	0,2	2,8
2005	0,0	0,9	15,2	17,8	8,1	3,0	3,1	0,4	0,2	0,0	3,1
2006	0,0	1,5	34,2	30,4	14,7	7,7	3,2	1,4	0,7	0,5	6,2
2007	0,0	0,6	40,6	30,2	11,8	9,8	4,4	1,9	0,5	0,2	6,4
2008	0,0	1,9	58,9	70,3	22,4	21,3	8,9	1,5	1,1	0,0	11,7
2009	0,0	1,3	70,2	75,9	28,5	17,9	7,9	2,8	1,1	0,0	13,0

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1994	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
1995	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	2,9
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2006	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2007	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2008	0,0	0,0	16,4	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
2009	0,0	0,0	16,8	17,9	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1994	0,0	0,0	0,0	36,8	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,7
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
1999	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	10,2	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	2,1
2003	0,0	0,0	0,0	31,7	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
2004	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
2005	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2006	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	14,2	0,0	0,0	4,6	0,0	2,2
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	25,4	0,0	13,2	14,7	0,0	0,0	0,0	2,9
2009	0,0	0,0	0,0	25,8	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1994	0,0	0,0	4,8	17,4	0,0	3,6	3,4	0,0	0,0	0,0	2,1
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,3
1996	0,0	0,0	0,0	8,9	4,6	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	1,2
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,9
1998	0,0	0,0	14,3	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
1999	0,0	0,0	58,6	22,3	4,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	5,7
2000	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	16,2	8,2	4,7	10,2	4,1	0,0	0,0	0,0	2,7
2003	0,0	0,0	16,3	4,2	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
2004	0,0	0,0	0,0	4,2	8,8	5,2	0,0	0,0	5,8	0,0	2,1
2005	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	10,4	0,0	3,6	0,0	0,0	1,8
2006	0,0	3,1	10,6	4,3	8,3	10,4	5,0	0,0	1,9	1,2	3,2
2007	0,0	0,0	31,1	44,9	12,1	10,0	5,1	1,9	0,0	1,2	7,0
2008	0,0	0,0	50,7	50,6	8,0	19,1	0,0	1,9	1,8	0,0	8,4
2009	0,0	0,0	10,0	56,1	4,0	13,7	10,3	2,0	0,0	0,0	6,0
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1994	0,0	3,2	0,0	45,2	20,3	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	4,5
1995	0,0	0,0	5,7	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
1996	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
1997	0,0	6,7	0,0	27,2	7,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	3,3
1998	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
1999	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
2000	0,0	0,0	6,1	19,3	8,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5
2001	0,0	0,0	12,7	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
2002	0,0	0,0	6,6	6,5	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
2003	0,0	0,0	13,5	6,5	15,1	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	2,9
2004	0,0	0,0	6,9	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
2005	0,0	0,0	20,9	13,5	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
2006	0,0	0,0	27,4	20,9	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
2007	0,0	0,0	6,7	21,2	7,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,4
2008	0,0	0,0	6,7	28,7	7,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	2,8
2009	0,0	0,0	13,4	21,7	28,1	0,0	0,0	5,6	2,5	0,0	4,8

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1994	0,0	0,0	0,0	11,1	10,8	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
1995	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	2,1
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2000	0,0	5,6	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
2001	0,0	0,0	21,2	9,9	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
2002	0,0	0,0	21,4	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
2003	0,0	0,0	21,3	9,9	11,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
2004	0,0	0,0	21,4	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,7
2005	0,0	0,0	10,7	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
2006	0,0	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
2007	0,0	6,1	10,3	0,0	30,6	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	3,9
2008	0,0	0,0	0,0	10,2	10,1	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
2009	0,0	0,0	10,3	20,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
06 - Montréal-Centre											
1994	0,0	2,2	76,4	52,6	11,5	12,8	2,7	3,8	2,0	0,5	11,5
1995	1,9	5,6	77,6	38,3	15,8	5,1	9,3	0,0	0,0	0,0	10,5
1996	0,0	1,1	67,7	39,0	12,2	13,0	6,6	1,5	0,0	0,0	9,5
1997	0,0	3,3	61,2	27,6	4,2	5,3	1,3	2,2	2,9	0,0	7,1
1998	0,0	3,3	38,8	15,4	8,4	4,1	2,7	0,0	0,9	0,0	4,9
1999	0,0	1,1	68,0	35,5	7,1	2,8	5,4	0,7	0,0	0,5	7,9
2000	0,0	0,0	53,6	30,9	15,3	7,1	1,3	1,4	2,7	0,0	7,6
2001	2,1	1,0	77,0	32,3	20,6	5,8	6,8	4,2	2,6	0,0	10,3
2002	0,0	0,0	66,7	37,9	11,9	12,9	4,1	2,8	0,8	0,0	9,2
2003	0,0	1,0	40,1	42,6	6,5	11,5	7,1	2,8	4,2	0,0	8,2
2004	2,1	0,0	46,3	34,6	12,7	5,7	5,8	1,4	0,0	0,0	7,2
2005	0,0	0,0	58,5	37,5	11,3	10,1	4,5	1,4	0,0	0,0	8,0
2006	4,3	1,1	98,8	100,5	26,9	20,4	6,0	3,6	0,8	0,5	19,3
2007	0,0	4,4	170,3	90,0	41,3	26,8	18,1	6,5	1,6	0,5	24,1
2008	0,0	2,2	162,5	141,0	41,1	15,1	10,6	7,3	3,2	0,0	25,9
2009	0,0	6,7	167,3	137,7	62,3	20,0	10,6	6,6	0,8	1,3	28,1

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1994	0,0	4,8	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	3,2
1995	0,0	0,0	20,8	10,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
1996	0,0	0,0	10,3	20,2	8,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
1997	0,0	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
1998	0,0	0,0	40,4	10,1	0,0	0,0	0,0	3,8	5,7	0,0	4,4
1999	0,0	0,0	0,0	50,8	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,8
2000	0,0	0,0	0,0	20,2	9,6	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	2,5
2001	0,0	0,0	19,4	9,9	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
2002	0,0	0,0	38,5	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
2003	0,0	0,0	57,5	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
2004	0,0	0,0	18,7	9,5	9,1	0,0	7,4	0,0	4,3	0,0	3,5
2005	0,0	0,0	18,1	37,7	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
2006	0,0	0,0	8,7	65,6	35,6	8,8	7,9	0,0	0,0	3,3	8,6
2007	0,0	0,0	50,0	18,8	8,9	8,7	0,0	0,0	3,9	0,0	6,3
2008	0,0	0,0	65,6	167,8	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
2009	0,0	0,0	203,8	199,5	87,3	33,6	8,3	13,3	0,0	0,0	36,7
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1994	0,0	0,0	16,5	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
1995	0,0	0,0	32,7	42,3	37,1	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
1996	0,0	0,0	33,0	20,7	38,8	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
1997	0,0	0,0	0,0	20,4	19,9	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
1998	0,0	0,0	52,0	19,7	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
1999	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	37,5	64,9	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	10,1	61,0	44,9	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	9,7
2004	0,0	0,0	20,4	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
2006	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	2,8
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
2008	0,0	0,0	19,6	0,0	24,5	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	4,2
2009	0,0	0,0	60,7	69,9	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1994	0,0	0,0	24,5	29,5	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
1995	0,0	0,0	0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
1996	0,0	0,0	48,8	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
1997	0,0	14,0	0,0	56,8	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
1998	0,0	0,0	26,4	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	34,6	36,4	33,0	0,0	11,5	0,0	0,0	8,4
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	30,9	39,2	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	6,4
2008	0,0	18,7	61,2	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	8,6
2009	0,0	0,0	63,2	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
10 - Nord-du-Québec											
1994	0,0	0,0	255,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	365,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1
2003	0,0	0,0	179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1994	0,0	0,0	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	2,1
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Chaudière-Appalaches											
1994	0,0	0,0	7,0	9,0	8,2	6,1	6,0	0,0	0,0	0,0	2,6
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	7,7	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	1,5
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2005	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2006	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2007	0,0	0,0	15,8	8,5	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
2008	0,0	0,0	15,8	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
2009	0,0	0,0	16,0	17,5	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	2,5

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1994	0,0	0,0	9,4	0,0	8,3	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	2,4
1995	0,0	0,0	9,4	20,1	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
1996	0,0	0,0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
1997	0,0	0,0	27,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
1998	0,0	0,0	18,7	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	1,1
2000	0,0	0,0	0,0	9,3	19,4	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
2001	0,0	0,0	19,2	45,2	9,6	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
2002	0,0	0,0	0,0	18,1	9,5	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	2,2
2003	11,2	0,0	65,5	36,3	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
2004	0,0	0,0	9,1	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	1,6
2005	0,0	8,7	52,5	18,0	0,0	0,0	7,2	0,0	4,0	0,0	6,4
2006	0,0	4,4	100,8	44,9	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
2007	0,0	0,0	119,0	54,1	25,8	16,7	0,0	6,2	0,0	0,0	14,6
2008	0,0	0,0	137,6	114,6	25,5	24,2	7,5	0,0	3,8	0,0	20,0
2009	0,0	0,0	171,7	121,0	8,4	15,5	0,0	3,1	7,3	0,0	21,7
14 - Lanaudière											
1994	0,0	0,0	24,7	10,5	15,6	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	3,8
1995	0,0	3,7	8,1	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
1996	0,0	0,0	0,0	10,3	25,8	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	3,2
1997	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1998	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1999	0,0	3,5	7,9	0,0	0,0	6,9	5,2	0,0	0,0	0,0	2,0
2000	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2001	0,0	0,0	7,9	9,4	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
2002	0,0	0,0	15,7	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
2003	0,0	6,9	7,8	17,9	0,0	0,0	6,0	2,7	3,5	0,0	4,0
2004	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	8,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,4
2005	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
2006	0,0	3,6	40,0	52,1	15,7	7,6	0,0	5,1	0,0	0,0	8,3
2007	0,0	0,0	38,6	8,4	23,2	22,2	13,7	5,1	0,0	0,0	7,7
2008	0,0	11,4	55,7	24,4	7,6	35,4	0,0	0,0	5,9	0,0	10,2
2009	0,0	3,9	67,3	116,8	15,1	13,5	27,5	2,7	0,0	0,0	15,7

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1994	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	1,4
1995	0,0	0,0	7,2	17,2	6,8	4,7	4,8	3,0	0,0	0,0	3,2
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1997	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
1998	0,0	0,0	13,8	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
1999	0,0	3,1	27,6	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	2,6
2000	0,0	6,1	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
2001	0,0	6,0	34,9	7,5	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
2002	0,0	0,0	62,8	22,0	14,9	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	6,2
2003	0,0	0,0	13,8	43,4	0,0	12,5	4,8	0,0	0,0	0,0	4,5
2004	0,0	0,0	20,2	7,2	7,0	6,3	5,1	0,0	0,0	0,0	2,8
2005	0,0	0,0	6,3	14,6	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	1,6
2006	0,0	0,0	41,3	22,3	20,2	0,0	0,0	2,1	2,7	0,0	5,8
2007	0,0	0,0	39,0	29,6	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
2008	0,0	0,0	26,8	42,8	6,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
2009	0,0	0,0	115,6	68,3	13,2	29,2	5,6	4,4	0,0	0,0	15,4
16 - Montérégie											
1994	2,2	0,0	18,0	7,9	4,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
1995	0,0	0,0	8,9	0,0	7,1	3,5	3,4	0,0	0,0	0,0	1,7
1996	0,0	1,2	6,7	2,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
1997	0,0	1,2	26,9	13,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
1998	0,0	0,0	6,8	12,7	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0
1999	0,0	0,0	13,8	12,4	2,7	6,4	0,0	0,9	0,0	0,0	2,4
2000	0,0	0,0	11,7	4,9	5,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	1,7
2001	0,0	0,0	14,3	4,9	10,9	2,3	0,0	2,6	0,0	0,0	2,4
2002	0,0	0,0	9,6	29,2	13,3	2,4	5,5	1,7	0,0	0,0	4,0
2003	0,0	0,0	14,6	14,6	7,7	7,3	3,8	1,7	0,0	0,8	3,4
2004	0,0	0,0	7,2	19,4	2,5	4,9	2,0	0,0	0,0	0,0	2,2
2005	0,0	0,0	16,2	17,3	9,7	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	2,9
2006	0,0	1,2	40,0	17,5	16,6	7,1	6,3	0,0	0,0	0,7	5,9
2007	0,0	1,2	42,5	37,9	4,8	7,0	2,2	1,7	0,0	0,0	6,3
2008	0,0	1,3	49,6	67,7	16,6	15,8	8,7	1,7	0,0	0,0	10,1
2009	0,0	0,0	31,0	34,3	18,8	8,8	2,2	0,9	1,8	0,0	6,3

Tableau 16 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1994	0,0	0,0	3 561,6	4 021,4	978,0	623,1	452,5	0,0	0,0	0,0	912,0
1995	0,0	0,0	1 837,3	1 583,1	248,1	296,7	436,7	0,0	0,0	0,0	409,3
1996	0,0	0,0	505,1	1 219,5	737,1	552,5	1 158,3	0,0	0,0	0,0	350,8
1997	0,0	90,9	1 036,3	936,8	932,4	537,6	359,7	0,0	454,5	0,0	379,2
1998	0,0	89,5	705,9	990,1	451,5	0,0	0,0	0,0	440,5	0,0	242,7
1999	0,0	0,0	437,6	505,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,1
2000	0,0	84,2	1 461,4	1 546,4	0,0	0,0	0,0	246,3	0,0	0,0	313,6
2001	0,0	0,0	842,1	777,2	475,1	263,2	0,0	0,0	0,0	0,0	210,8
2002	156,0	83,1	2 471,5	2 584,0	710,9	249,4	295,9	0,0	0,0	0,0	614,0
2003	0,0	83,5	2 935,4	1 144,2	987,7	239,2	1 212,1	205,3	0,0	0,0	620,2
2004	0,0	81,4	574,7	214,6	243,9	248,8	290,7	0,0	0,0	0,0	155,2
2005	0,0	79,7	0,0	1 008,1	970,9	241,0	569,8	0,0	0,0	0,0	246,6
2006	0,0	0,0	1 289,1	2 325,6	1 154,7	738,9	0,0	532,9	0,0	0,0	544,6
2007	0,0	0,0	891,3	1 176,5	930,2	241,0	826,4	168,4	0,0	0,0	369,1
2008	0,0	82,3	4 377,1	4 313,7	2 850,9	3 357,3	1 591,5	660,1	265,3	0,0	1 576,9
2009	0,0	239,0	3 589,7	4 296,9	3 164,6	2 682,9	1 072,4	160,5	0,0	0,0	1 372,1
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1994	0,0	0,0	694,4	843,2	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,1
1995	0,0	86,0	365,6	465,8	201,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,4
1996	0,0	0,0	0,0	480,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5
1997	0,0	0,0	546,4	164,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6
1998	0,0	0,0	0,0	868,1	174,8	203,3	0,0	189,8	0,0	0,0	137,2
1999	0,0	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
2000	0,0	0,0	185,5	0,0	0,0	0,0	0,0	173,9	0,0	0,0	33,2
2001	0,0	0,0	0,0	173,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
2002	0,0	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
2003	0,0	0,0	332,8	170,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
2004	0,0	0,0	1 520,3	0,0	0,0	0,0	0,0	132,6	0,0	0,0	146,3
2005	0,0	0,0	991,7	499,2	0,0	160,5	0,0	0,0	0,0	0,0	144,4
2006	0,0	68,0	483,9	982,0	165,3	159,7	0,0	0,0	0,0	0,0	171,9
2007	0,0	0,0	939,0	322,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,2
2008	0,0	0,0	1 049,5	1 644,7	323,6	166,7	182,8	0,0	0,0	0,0	285,2
2009	0,0	0,0	863,3	841,8	651,5	161,6	0,0	0,0	0,0	0,0	212,5

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Ensemble du Québec*											
1994	0,0	0,0	12,8	35,5	52,2	36,3	16,6	10,5	4,4	0,2	14,6
1995	0,4	0,0	6,3	32,7	32,0	30,9	15,5	10,6	3,7	1,2	12,1
1996	0,0	0,0	6,6	22,9	24,0	18,0	16,9	7,7	5,1	0,8	9,1
1997	0,0	0,0	10,5	25,4	31,9	25,8	21,1	10,4	4,6	0,4	11,4
1998	0,5	0,0	5,1	24,6	28,9	27,3	20,6	9,0	3,5	0,4	10,4
1999	0,0	0,0	11,6	35,0	41,8	29,4	26,2	11,7	4,7	1,1	13,4
2000	0,0	0,0	15,5	35,3	43,0	33,4	35,3	13,8	3,2	0,6	14,9
2001	0,0	0,0	14,1	46,1	45,7	40,1	40,0	22,2	3,6	1,8	18,2
2002	0,0	0,0	21,5	59,6	45,5	40,8	35,8	16,5	4,3	1,9	18,3
2003	0,0	0,2	16,2	52,0	43,6	42,7	39,0	14,1	9,9	2,5	18,2
2004	0,0	0,0	14,9	56,4	46,1	37,3	35,7	20,4	7,5	1,1	18,2
2005	0,0	0,2	18,5	60,9	53,2	37,6	33,5	22,3	7,9	1,9	19,5
2006	0,0	0,2	27,9	71,5	62,5	45,7	41,9	24,6	11,8	2,1	24,0
2007	0,0	0,0	38,6	83,8	67,0	49,4	38,8	29,6	10,3	2,5	26,0
2008	0,0	0,9	33,8	110,4	84,8	53,0	35,2	26,0	9,0	2,0	27,5
2009	0,0	0,2	41,8	123,9	88,3	61,3	46,5	32,5	10,0	2,2	31,6
Ensemble du Québec hors Montréal											
1994	0,0	0,0	7,5	17,8	28,5	15,8	6,8	5,7	2,9	0,3	7,1
1995	0,5	0,0	4,9	15,5	14,2	13,2	6,4	4,4	1,0	0,8	5,2
1996	0,0	0,0	5,9	9,1	11,9	9,0	7,1	4,1	2,7	0,6	4,3
1997	0,0	0,0	6,4	11,7	16,3	9,9	7,1	4,4	3,2	0,0	4,9
1998	0,6	0,0	3,0	14,7	10,7	7,6	10,0	5,0	0,6	0,0	4,3
1999	0,0	0,0	7,5	18,2	19,2	13,2	11,7	6,7	3,2	0,5	6,6
2000	0,0	0,0	6,7	19,5	18,7	14,4	11,8	5,3	2,8	0,7	6,4
2001	0,0	0,0	7,9	23,4	15,0	14,3	13,5	8,3	1,9	1,7	7,2
2002	0,0	0,0	11,8	37,3	18,8	18,1	13,6	8,0	2,6	0,7	8,7
2003	0,0	0,3	11,4	33,3	16,1	16,1	18,5	7,5	6,1	1,6	9,0
2004	0,0	0,0	10,3	28,7	16,7	8,6	13,1	7,6	3,0	0,4	7,0
2005	0,0	0,3	13,4	28,0	29,9	14,3	17,3	7,4	5,0	1,4	9,1
2006	0,0	0,3	16,1	44,6	34,8	19,7	18,3	13,0	6,6	2,0	12,4
2007	0,0	0,0	21,6	52,0	39,1	23,7	18,2	12,9	5,3	1,3	13,2
2008	0,0	1,2	32,8	75,6	49,4	30,1	21,0	11,5	5,6	1,3	16,6
2009	0,0	0,3	32,2	84,7	53,4	31,9	21,6	13,2	4,6	1,2	17,5

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1994	0,0	0,0	0,0	16,1	15,9	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	11,1	11,2	8,4	0,0	5,8
1998	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	14,8	11,6	11,0	0,0	0,0	4,9
1999	0,0	0,0	12,6	0,0	18,2	0,0	11,9	5,5	0,0	5,8	4,9
2000	0,0	0,0	13,1	13,9	0,0	0,0	12,2	0,0	7,2	0,0	3,9
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	1,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	5,5	6,7	0,0	3,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2004	0,0	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	2,0
2006	0,0	0,0	0,0	31,9	16,7	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	4,0
2007	0,0	0,0	15,2	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	1,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	17,5	0,0	6,8	0,0	0,0	5,0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1994	0,0	0,0	0,0	21,8	10,9	30,3	7,0	0,0	0,0	0,0	5,5
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	12,9	0,0	0,0	3,4
1996	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	8,5	0,0	12,6	6,5	0,0	4,1
1997	0,0	0,0	0,0	9,5	12,7	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	2,8
1998	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	15,1	7,9	0,0	0,0	3,5
1999	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8	0,0	0,0	2,8
2000	0,0	0,0	0,0	8,8	12,5	11,7	8,0	3,9	0,0	0,0	3,5
2001	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	12,3	0,0	7,7	0,0	0,0	2,8
2002	0,0	0,0	0,0	9,2	12,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	2,1
2003	0,0	0,0	0,0	9,4	23,5	0,0	10,3	3,8	4,9	0,0	4,3
2004	0,0	0,0	10,3	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
2005	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2006	0,0	0,0	0,0	53,1	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,4
2007	0,0	0,0	0,0	32,9	11,3	12,6	0,0	4,3	0,0	0,0	4,4
2008	0,0	0,0	32,0	78,6	34,1	24,6	0,0	9,2	4,2	0,0	13,2
2009	0,0	0,0	10,9	23,2	22,7	12,1	28,2	4,8	4,2	0,0	7,4

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1994	0,0	0,0	0,0	24,9	74,3	27,5	10,3	19,9	6,0	0,0	15,4
1995	0,0	0,0	0,0	17,0	20,5	31,5	6,9	7,8	2,9	2,3	8,3
1996	0,0	0,0	4,6	8,6	12,7	10,8	10,4	0,0	0,0	0,0	3,8
1997	0,0	0,0	4,6	8,7	21,6	22,6	13,9	9,4	0,0	0,0	7,3
1998	0,0	0,0	9,2	17,5	13,2	8,0	28,0	7,5	0,0	0,0	7,3
1999	0,0	0,0	28,4	34,5	31,0	25,4	28,2	9,2	7,2	2,1	14,0
2000	0,0	0,0	9,8	45,7	40,4	35,6	17,9	7,3	2,3	4,1	13,3
2001	0,0	0,0	20,6	28,1	31,3	13,6	37,3	12,7	4,4	2,0	12,9
2002	0,0	0,0	10,5	24,0	13,0	23,3	23,4	7,2	4,3	1,9	9,1
2003	0,0	0,0	21,1	52,9	21,0	23,5	36,9	8,9	8,5	0,0	14,0
2004	0,0	0,0	0,0	28,8	20,2	4,7	30,3	5,3	4,2	1,8	8,0
2005	0,0	0,0	10,6	16,5	43,4	9,3	50,0	7,1	8,1	5,1	12,6
2006	0,0	0,0	10,5	50,3	42,2	27,8	14,0	14,5	4,0	4,9	14,4
2007	0,0	0,0	15,2	70,7	44,7	31,4	33,0	22,2	3,9	1,6	18,2
2008	0,0	0,0	44,6	77,1	48,5	30,3	28,3	13,3	9,6	3,0	19,9
2009	0,0	0,0	24,7	73,5	37,9	12,5	28,2	13,6	5,7	0,0	14,9
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1994	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	19,7	4,6	5,4	0,0	0,0	3,4
1995	0,0	0,0	0,0	6,8	13,5	10,1	0,0	2,6	0,0	0,0	2,5
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	4,7	0,0	0,0	0,0	1,3
1997	0,0	0,0	5,3	6,4	7,2	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
1998	0,0	0,0	0,0	12,3	14,7	5,9	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5
1999	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,3	4,9	2,4	0,0	0,0	1,7
2000	0,0	0,0	5,8	17,5	7,3	6,7	15,1	14,5	3,1	0,0	6,7
2001	0,0	0,0	18,1	5,8	7,3	7,0	0,0	2,4	6,0	0,0	3,8
2002	0,0	0,0	0,0	17,3	7,1	36,2	11,1	2,4	0,0	0,0	5,0
2003	0,0	0,0	0,0	29,3	20,6	0,0	5,9	4,8	0,0	0,0	4,6
2004	0,0	0,0	6,5	12,0	19,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	3,3
2005	0,0	3,6	6,5	6,2	25,6	15,0	6,6	9,7	0,0	0,0	5,8
2006	0,0	0,0	38,4	25,4	12,6	7,4	20,7	12,3	7,9	0,0	10,0
2007	0,0	0,0	24,9	26,0	18,7	14,5	0,0	12,7	7,7	0,0	8,7
2008	0,0	3,9	18,4	53,2	37,6	20,8	7,3	5,3	0,0	0,0	9,9
2009	0,0	0,0	12,3	26,8	38,2	39,9	29,4	10,9	7,4	1,8	12,3

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1994	0,0	0,0	0,0	21,4	20,1	17,2	8,5	4,7	0,0	0,0	5,8
1995	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	4,8	2,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	13,1	0,0	2,1
1997	0,0	0,0	27,9	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	5,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	1,4
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	8,4	13,0	0,0	0,0	3,5
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	17,0	8,5	0,0	0,0	3,5
2001	0,0	0,0	10,0	18,2	0,0	42,6	35,0	12,6	0,0	17,2	12,5
2002	0,0	0,0	10,0	36,4	10,7	33,3	9,0	4,2	0,0	0,0	7,6
2003	0,0	0,0	10,1	9,2	10,1	22,6	37,7	4,1	14,4	0,0	8,9
2004	0,0	0,0	0,0	27,6	9,9	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
2005	0,0	0,0	0,0	37,0	19,3	0,0	10,3	0,0	4,5	0,0	5,4
2006	0,0	0,0	0,0	28,0	9,6	11,3	21,0	8,4	0,0	3,5	6,7
2007	0,0	0,0	19,8	9,5	9,6	0,0	0,0	4,3	4,4	3,4	4,7
2008	0,0	0,0	0,0	9,8	19,1	10,5	11,2	4,4	4,3	3,3	5,3
2009	0,0	0,0	0,0	19,9	28,3	20,5	11,2	4,5	0,0	0,0	5,9
06 - Montréal-Centre											
1994	0,0	0,0	33,5	81,9	106,9	96,6	49,1	26,8	8,9	0,0	37,8
1995	0,0	0,0	11,7	78,7	72,6	81,6	45,6	31,8	12,2	2,1	33,7
1996	0,0	0,0	9,8	60,6	51,8	42,6	48,6	20,4	13,2	1,4	24,1
1997	0,0	0,0	27,1	64,3	66,8	68,2	66,1	31,0	9,6	1,4	32,1
1998	0,0	0,0	13,4	52,9	70,5	78,6	54,9	22,9	13,5	1,4	29,5
1999	0,0	0,0	26,9	82,2	93,1	70,3	71,6	29,1	10,1	2,8	34,9
2000	0,0	0,0	48,8	78,1	98,0	79,8	106,6	43,1	4,9	0,0	41,3
2001	0,0	0,0	37,7	106,2	113,4	102,2	117,6	69,6	9,6	2,1	52,0
2002	0,0	0,0	57,3	119,2	103,1	93,3	98,5	45,4	10,3	5,4	47,6
2003	0,0	0,0	33,6	102,0	103,7	103,4	95,8	36,5	23,8	5,4	46,4
2004	0,0	0,0	31,5	131,4	111,4	102,8	96,7	64,0	24,3	3,3	52,6
2005	0,0	0,0	37,2	149,7	105,9	92,1	76,2	73,1	18,5	3,3	51,7
2006	0,0	0,0	72,1	143,2	125,0	107,6	103,1	63,4	31,3	2,6	60,5
2007	0,0	0,0	103,3	169,1	131,2	110,5	91,9	85,2	29,2	6,3	65,9
2008	0,0	0,0	37,4	204,4	166,5	107,7	71,4	73,2	21,9	4,3	61,7
2009	0,0	0,0	77,8	231,9	170,2	131,9	110,2	93,9	30,8	5,5	76,0

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1994	0,0	0,0	9,9	38,6	15,7	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	19,7	6,6	0,0	0,0	0,0	3,3
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	6,7	6,6	0,0	6,2	0,0	2,6
1997	0,0	0,0	19,3	30,0	18,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	5,8
1998	0,0	0,0	0,0	30,1	9,2	0,0	6,6	0,0	5,6	0,0	3,8
1999	0,0	0,0	18,9	10,1	47,2	15,8	26,4	7,4	5,3	0,0	10,8
2000	0,0	0,0	0,0	9,9	66,5	16,7	6,6	18,1	10,2	0,0	11,4
2001	0,0	0,0	18,3	67,7	18,9	17,0	6,8	7,1	0,0	4,8	10,6
2002	0,0	0,0	27,3	65,9	18,8	17,2	20,7	6,9	0,0	0,0	11,7
2003	0,0	4,4	18,0	36,9	18,4	34,4	7,1	20,1	22,8	0,0	15,2
2004	0,0	0,0	17,7	80,6	18,3	51,4	52,3	29,5	8,7	0,0	22,1
2005	0,0	0,0	25,6	53,3	72,6	8,5	31,2	6,4	16,7	0,0	16,5
2006	0,0	0,0	8,3	70,8	35,9	8,6	8,0	0,0	8,1	3,9	10,5
2007	0,0	0,0	32,0	52,9	52,5	25,8	16,4	9,7	3,9	0,0	14,4
2008	0,0	0,0	0,0	43,9	25,9	68,4	40,8	9,9	7,6	0,0	14,8
2009	0,0	0,0	23,4	95,0	84,8	42,3	16,2	20,1	7,4	3,4	22,6
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1994	0,0	0,0	15,9	0,0	16,8	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
1995	0,0	0,0	0,0	57,8	17,9	13,8	39,0	0,0	0,0	0,0	10,1
1996	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	28,6	26,0	0,0	12,9	10,4	10,1
1997	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	15,0	0,0	0,0	24,4	0,0	5,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	1,3
2003	0,0	0,0	38,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	1,4
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	43,2	0,0	26,7	8,1	9,6
2007	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	22,0	7,9	8,6	0,0	6,8
2008	0,0	0,0	0,0	43,4	22,4	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	5,5
2009	0,0	0,0	56,5	130,9	66,4	22,7	0,0	17,1	8,3	0,0	21,8

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1994	0,0	0,0	23,0	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3	0,0	19,9	22,8	0,0	0,0	9,3
1996	0,0	0,0	45,6	26,6	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
1997	0,0	0,0	23,4	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	14,6	0,0	3,9
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	2,0
2003	0,0	0,0	0,0	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	4,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	30,0	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
2008	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0	6,1
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - Nord-du-Québec											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	168,9	171,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
2003	0,0	0,0	0,0	174,8	0,0	169,8	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	185,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
1996	0,0	0,0	24,7	30,1	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	2,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	0,0	0,0	0,0	2,1
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	42,2	0,0	38,8	0,0	0,0	0,0	4,3
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
2009	0,0	0,0	0,0	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
12 - Chaudière-Appalaches											
1994	0,0	0,0	6,6	16,2	7,7	6,0	17,3	6,6	5,4	0,0	5,7
1995	0,0	0,0	12,8	7,9	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,6
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	3,1	0,0	3,7	1,6
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	1,0
1998	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	13,9	0,0	3,1	0,0	0,0	2,1
1999	0,0	0,0	6,5	7,1	0,0	7,3	5,9	3,0	0,0	0,0	2,6
2000	0,0	0,0	0,0	13,8	16,8	0,0	6,0	3,0	0,0	0,0	3,1
2001	0,0	0,0	6,9	13,7	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
2002	0,0	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	12,8	3,0	0,0	0,0	2,5
2003	0,0	0,0	0,0	13,8	15,8	0,0	6,8	3,0	0,0	0,0	3,0
2004	0,0	0,0	0,0	14,1	7,7	0,0	0,0	3,0	3,4	0,0	2,5
2005	0,0	0,0	0,0	14,6	7,4	0,0	0,0	3,0	6,6	2,9	3,5
2006	0,0	0,0	7,6	14,9	14,8	0,0	0,0	9,0	6,5	0,0	5,0
2007	0,0	0,0	0,0	23,0	30,0	15,6	7,9	0,0	0,0	0,0	5,0
2008	0,0	0,0	14,7	23,4	22,6	7,6	0,0	9,4	3,1	0,0	6,4
2009	0,0	0,0	14,9	23,8	15,1	22,4	8,0	3,2	0,0	4,8	6,9

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1994	0,0	0,0	18,0	17,8	23,8	25,4	13,4	12,3	0,0	0,0	9,8
1995	0,0	0,0	0,0	36,4	16,7	19,5	13,1	4,0	0,0	0,0	7,3
1996	0,0	0,0	17,6	9,3	43,7	13,5	0,0	11,9	0,0	0,0	7,9
1997	0,0	0,0	0,0	18,5	9,0	21,1	12,6	0,0	0,0	0,0	4,8
1998	0,0	0,0	0,0	18,1	9,2	22,3	25,1	7,6	5,0	0,0	7,8
1999	0,0	0,0	0,0	8,9	37,1	23,6	12,6	11,0	14,8	0,0	9,5
2000	0,0	0,0	0,0	26,1	9,2	16,3	25,3	10,7	0,0	0,0	7,7
2001	0,0	0,0	9,1	17,0	9,2	0,0	25,8	6,9	4,7	0,0	6,4
2002	0,0	0,0	26,9	93,8	18,1	33,0	46,2	13,4	9,1	0,0	18,9
2003	0,0	0,0	17,9	50,4	8,9	8,4	20,4	19,4	4,5	3,5	11,9
2004	0,0	0,0	26,3	42,0	35,2	16,8	7,0	6,3	4,4	0,0	10,1
2005	0,0	0,0	42,1	92,2	61,2	33,7	7,2	6,2	12,7	0,0	18,2
2006	0,0	0,0	32,5	83,2	69,4	17,0	7,3	12,2	8,3	0,0	16,9
2007	0,0	0,0	31,1	117,1	75,3	83,7	29,4	27,5	0,0	6,1	27,9
2008	0,0	0,0	30,0	126,3	97,4	40,8	22,4	6,1	0,0	0,0	21,7
2009	0,0	0,0	21,9	107,8	80,7	31,9	7,5	21,6	7,5	2,8	21,3
14 - Lanaudière											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	5,5	5,4	3,3	5,3	0,0	5,4
1995	6,9	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	2,1
1996	0,0	0,0	0,0	9,5	9,1	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	1,6
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1998	0,0	0,0	0,0	17,6	19,0	6,6	0,0	6,0	0,0	0,0	3,6
1999	0,0	0,0	0,0	25,6	28,7	7,1	10,4	5,9	0,0	0,0	5,6
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	22,8	10,6	0,0	3,9	0,0	4,5
2001	0,0	0,0	0,0	16,4	37,8	15,8	5,5	27,9	0,0	0,0	9,5
2002	0,0	0,0	14,4	47,5	18,6	8,2	11,6	5,4	3,6	0,0	8,0
2003	0,0	0,0	14,4	31,2	0,0	33,0	12,1	0,0	3,5	3,2	6,9
2004	0,0	0,0	7,0	7,7	8,4	8,3	12,7	7,8	3,4	0,0	4,8
2005	0,0	0,0	13,4	15,4	31,9	15,8	6,7	10,1	3,3	2,9	8,0
2006	0,0	3,5	6,3	46,0	54,2	15,0	13,5	17,6	0,0	0,0	12,0
2007	0,0	0,0	17,9	77,2	45,3	0,0	6,8	17,8	3,0	0,0	12,6
2008	0,0	7,3	51,5	75,6	22,3	13,9	6,7	7,7	0,0	0,0	13,3
2009	0,0	0,0	45,5	102,0	36,3	26,7	26,8	7,9	5,6	0,0	17,3

Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1994	0,0	0,0	13,7	0,0	6,6	0,0	4,9	6,0	4,6	3,8	3,8
1995	0,0	0,0	0,0	8,2	20,7	4,8	9,5	0,0	0,0	0,0	3,2
1996	0,0	0,0	0,0	24,2	14,2	0,0	4,6	0,0	4,1	0,0	3,2
1997	0,0	0,0	0,0	7,8	14,8	5,1	4,5	0,0	0,0	0,0	2,2
1998	0,0	0,0	6,5	15,0	7,6	5,4	4,5	5,3	0,0	0,0	3,5
1999	0,0	0,0	0,0	21,8	30,3	22,8	4,5	2,5	3,5	0,0	6,1
2000	0,0	0,0	0,0	14,2	15,0	0,0	13,5	0,0	6,7	3,1	4,3
2001	0,0	0,0	6,5	48,4	7,5	12,2	9,1	4,8	0,0	3,0	6,8
2002	0,0	0,0	12,9	27,3	36,5	12,5	9,3	9,3	0,0	0,0	7,9
2003	0,0	0,0	6,4	20,4	7,1	12,6	14,5	4,5	9,0	5,4	6,9
2004	0,0	0,0	6,3	60,2	6,9	0,0	20,0	0,0	2,9	2,5	6,8
2005	0,0	0,0	18,1	13,4	20,1	18,6	0,0	4,3	2,8	0,0	5,5
2006	0,0	0,0	22,5	54,1	46,3	36,9	16,3	14,7	5,4	2,3	15,1
2007	0,0	0,0	31,8	46,9	39,5	0,0	5,6	8,5	7,7	2,2	10,6
2008	0,0	0,0	40,7	45,8	38,8	0,0	0,0	8,6	5,0	0,0	10,1
2009	0,0	0,0	25,0	82,3	44,6	11,6	16,7	8,8	0,0	0,0	12,5
16 - Montérégie											
1994	0,0	0,0	6,4	7,4	24,5	17,2	6,9	2,0	3,0	0,0	5,5
1995	0,0	0,0	6,3	22,3	16,4	8,7	3,4	6,8	2,9	0,0	5,7
1996	0,0	0,0	10,4	12,4	7,3	16,4	11,8	10,6	2,7	0,0	6,6
1997	0,0	0,0	6,3	14,4	27,7	13,4	13,4	7,6	5,2	0,0	7,4
1998	0,0	0,0	6,3	18,7	15,4	8,1	10,1	6,5	0,0	0,0	5,3
1999	0,0	0,0	8,5	29,7	20,8	10,7	11,9	9,2	3,6	0,0	7,8
2000	0,0	0,0	10,9	18,0	10,4	20,2	10,3	2,7	1,2	0,0	5,6
2001	0,0	0,0	0,0	20,0	12,9	23,0	17,6	8,0	2,3	0,0	7,1
2002	0,0	0,0	13,5	37,7	27,7	18,9	9,1	14,9	3,3	2,1	10,5
2003	0,0	0,0	6,8	31,1	22,0	16,7	28,5	9,5	6,5	3,0	10,3
2004	0,0	0,0	15,9	17,7	23,7	9,5	7,9	14,4	3,2	0,0	7,9
2005	0,0	0,0	8,8	38,2	18,5	21,2	24,5	15,1	4,1	1,8	10,9
2006	0,0	0,0	12,7	36,8	31,9	25,4	20,8	18,4	10,1	2,6	13,4
2007	0,0	0,0	18,2	41,9	35,9	36,1	21,2	11,0	6,9	1,6	13,1
2008	0,0	1,2	15,7	65,5	44,5	28,5	25,6	12,9	7,8	3,1	15,6
2009	0,0	0,0	21,4	85,6	55,4	38,5	17,1	6,1	5,7	0,8	15,9


Tableau 17 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés d'infection gonococcique, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1994	0,0	0,0	990,1	2 099,7	1 173,7	288,2	0,0	260,4	469,5	0,0	456,2
1995	0,0	0,0	750,0	258,4	0,0	0,0	347,2	242,7	0,0	0,0	132,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	231,5	0,0	334,4	0,0	0,0	0,0	44,0
1997	0,0	0,0	0,0	669,6	229,4	251,3	0,0	242,1	0,0	0,0	126,6
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	0,0	304,9	0,0	0,0	0,0	41,1
1999	0,0	0,0	0,0	716,0	0,0	472,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,4
2000	0,0	0,0	824,7	1 173,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,4
2001	0,0	0,0	404,9	1 007,6	447,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,6
2002	0,0	0,0	567,1	2 500,0	675,7	231,5	0,0	0,0	0,0	0,0	326,4
2003	0,0	0,0	375,2	1 324,5	233,6	470,6	0,0	375,2	0,0	0,0	244,8
2004	0,0	0,0	0,0	1 070,7	239,8	0,0	514,1	0,0	0,0	0,0	147,7
2005	0,0	0,0	651,5	641,0	707,5	234,2	751,9	0,0	0,0	0,0	253,1
2006	0,0	0,0	331,1	1 004,0	1 552,1	930,2	1 711,5	1 032,7	256,4	0,0	568,7
2007	0,0	0,0	766,9	1 761,3	1 995,0	222,2	1 542,4	1 120,0	1 033,6	0,0	697,2
2008	0,0	0,0	2 283,1	5 984,6	4 783,6	3 002,3	2 584,0	1 682,0	753,8	0,0	1 784,8
2009	0,0	75,5	2 964,1	5 464,5	3 111,1	2 381,0	1 246,9	2 743,9	245,7	306,7	1 671,7
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	167,8	0,0	0,0	216,9	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7	0,0	0,0	0,0	17,1
1997	0,0	0,0	0,0	159,0	176,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5
1998	124,8	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	339,6	179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1
2004	0,0	0,0	491,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0
2005	0,0	0,0	156,5	0,0	167,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8
2006	0,0	0,0	603,3	329,5	162,6	0,0	0,0	0,0	207,0	0,0	108,8
2007	0,0	0,0	142,7	173,3	0,0	158,2	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3
2008	0,0	0,0	547,2	506,8	176,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,1
2009	0,0	0,0	545,7	326,3	340,1	159,0	500,8	0,0	0,0	0,0	154,2


Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Figure 59 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, province de Québec*, 1994 à 2009

Chez les femmes




Chez les hommes




* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.
 Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.
 Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 60 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Bas-Saint-Laurent, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 61 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 62 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Québec, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 63 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Mauricie et Centre-du-Québec, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 64 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Estrie, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 65 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Montréal, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 66 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Outaouais, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 67 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Abitibi-Témiscamingue, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 68 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Côte-Nord, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 69 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Nord-du-Québec, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 70 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 71 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Chaudière-Appalaches, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 72 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Laval, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 73 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Lanaudière, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 74 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Laurentides, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 75 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Montérégie, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 76 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Nunavik, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 77 Taux d'incidence brut des cas déclarés d'infection gonococcique, selon le groupe d'âge, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes



Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Tableau 18 Nombre de cas déclarés et proportion (%) d'infection à gonococcique selon le site de la maladie* chez les hommes, province de Québec, 1994 à 2009**


Site maladie†	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	1994-2009
Urètre	419 / 473 88,6%	377 / 404 93,3%	262 / 296 88,5%	317 / 377 84,1%	310 / 351 88,3%	403 / 455 88,6%	417 / 483 86,3%	537 / 623 86,2%	549 / 625 87,8%	517 / 621 83,3%	514 / 622 82,6%	543 / 663 81,9%	655 / 788 83,1%	763 / 879 86,8%	843 / 970 86,9%	912 / 1 106 82,5%	8338 / 9 736 85,6%
Rectum	37 / 473 7,8%	10 / 404 2,5%	18 / 296 6,1%	31 / 377 8,2%	25 / 351 7,1%	32 / 455 7,0%	34 / 483 7,0%	47 / 623 7,5%	39 / 625 6,2%	54 / 621 8,7%	53 / 622 8,5%	65 / 663 9,8%	80 / 788 10,2%	72 / 879 8,2%	76 / 970 7,8%	106 / 1 106 9,6%	779 / 9 736 8,0%
Pharynx	8 / 473 1,7%	12 / 404 3,0%	15 / 296 5,1%	26 / 377 6,9%	13 / 351 3,7%	18 / 455 4,0%	30 / 483 6,2%	34 / 623 5,5%	33 / 625 5,3%	41 / 621 6,6%	48 / 622 7,7%	38 / 663 5,7%	47 / 788 6,0%	38 / 879 4,3%	40 / 970 4,1%	60 / 1 106 5,4%	501 / 9 736 5,1%
Prostate	0 / 473 0,0%	0 / 404 0,0%	0 / 296 0,0%	0 / 377 0,0%	1 / 351 0,3%	0 / 455 0,0%	0 / 483 0,0%	0 / 623 0,0%	0 / 625 0,0%	0 / 621 0,0%	0 / 622 0,0%	0 / 663 0,0%	0 / 788 0,0%	0 / 879 0,0%	0 / 970 0,0%	0 / 1 106 0,0%	1 / 9 736 0,0%
Articulation	1 / 473 0,2%	0 / 404 0,0%	1 / 296 0,3%	0 / 377 0,0%	0 / 351 0,0%	0 / 455 0,0%	1 / 483 0,2%	1 / 623 0,2%	0 / 625 0,0%	0 / 621 0,0%	1 / 622 0,2%	0 / 663 0,0%	1 / 788 0,1%	0 / 879 0,0%	1 / 970 0,1%	0 / 1 106 0,0%	7 / 9 736 0,1%
Œil	0 / 473 0,0%	0 / 404 0,0%	0 / 296 0,0%	0 / 377 0,0%	0 / 351 0,0%	0 / 455 0,0%	0 / 483 0,0%	0 / 623 0,0%	0 / 625 0,0%	0 / 621 0,0%	1 / 622 0,2%	1 / 663 0,2%	0 / 788 0,0%	3 / 879 0,3%	1 / 970 0,1%	3 / 1 106 0,3%	9 / 9 736 0,1%
Autre	6 / 473 1,3%	3 / 404 0,7%	0 / 296 0,0%	2 / 377 0,5%	1 / 351 0,3%	0 / 455 0,0%	1 / 483 0,2%	1 / 623 0,2%	3 / 625 0,5%	4 / 621 0,6%	3 / 622 0,5%	14 / 663 2,1%	4 / 788 0,5%	2 / 879 0,2%	6 / 970 0,6%	17 / 1 106 1,5%	67 / 9 736 0,7%

* Les dénominateurs n'incluent pas les sites de maladie non répondus (vides).

** Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Figure 78 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, province de Québec*, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	4	5	1	4	1	1	2	0	0	5	13	8	6	7	8	17
Hommes	14	5	10	5	2	3	5	16	47	148	227	249	372	241	370	353
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Total	18	10	11	9	3	4	7	16	47	153	241	257	378	248	379	371


¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 79 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Bas-Saint-Laurent, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	1	0	1
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	2	0	1

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 80 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	0	0	0	1
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	0	0	0	1

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 81 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Québec, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0
Hommes	8	1	1	0	0	0	0	0	0	3	46	17	11	10	26	39
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	8	1	2	1	0	1	0	0	0	3	48	18	12	11	27	39

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 82 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2
Hommes	0	0	0	1	1	0	0	1	0	5	4	1	6	6	6	5
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	1	2	0	0	1	0	6	4	1	6	7	7	7

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 83 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Estrie, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Hommes	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	5	0	3	0	0	9
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	5	0	3	0	0	10

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 84 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Montréal, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	2	4	0	2	0	0	2	0	0	2	7	2	4	4	3	9
Hommes	5	4	6	2	1	2	5	12	36	113	118	178	288	169	265	217
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	7	8	6	4	1	2	7	12	36	115	126	180	292	173	268	227

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 85 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Outaouais, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	3	2	11	2	6	5
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	3	2	11	2	6	5

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 86 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 87 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Côte-Nord, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 88 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Nord-du-Québec, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 89 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 90 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Chaudière-Appalaches, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	5	1	2	4	7
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	5	2	2	4	7

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 91 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Laval, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Hommes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	6	4	5	4	7
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	6	4	5	4	9

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 92 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Lanaudière, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Hommes	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	6	4	9	8	12	12
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	6	5	9	8	12	14

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 93 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Laurentides, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Hommes	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	5	9	3	10	13
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Total	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	6	6	9	3	12	13

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 94 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Montérégie, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés


	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	2	1
Hommes	0	0	1	0	0	0	0	1	3	12	17	26	29	34	37	29
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	0	1	0	0	0	0	1	3	14	19	28	29	34	39	30

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 95 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Nunavik, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 96 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le sexe, Terres-Cries-de-la-Baie-James, 1994 à 2009



Nombre de cas déclarés

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Ensemble du Québec*												
1994	0	0	1	1	2	4	1	3	1	5	0	18
1995	0	0	0	5	1	1	1	1	0	1	0	10
1996	0	0	1	0	2	1	2	3	1	1	0	11
1997	0	0	0	1	1	1	0	4	1	1	0	9
1998	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
1999	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	4
2000	0	0	0	0	1	1	2	2	0	1	0	7
2001	0	0	0	0	2	2	3	6	2	1	0	16
2002	0	0	0	0	2	10	15	17	3	0	0	47
2003	0	0	0	5	12	28	29	62	15	2	0	153
2004	0	0	0	5	22	22	42	82	56	10	0	241
2005	0	0	2	13	20	29	39	112	33	9	0	257
2006	0	0	3	25	29	44	62	146	54	15	0	378
2007	0	0	5	13	21	24	39	95	41	9	0	248
2008	0	0	5	29	39	33	50	148	57	17	0	379
2009	0	0	9	36	38	53	37	121	63	14	0	371
Ensemble du Québec hors Montréal												
1994	0	0	0	0	2	2	1	2	1	3	0	11
1995	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
1996	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	5
1997	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	5
1998	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
2002	0	0	0	0	0	2	4	4	1	0	0	11
2003	0	0	0	1	5	7	6	15	3	1	0	38
2004	0	0	0	1	11	7	19	33	36	8	0	115
2005	0	0	1	6	4	7	6	29	19	5	0	77
2006	0	0	3	5	3	9	14	29	20	3	0	86
2007	0	0	3	8	4	7	10	32	7	3	0	75
2008	0	0	4	10	13	5	12	33	27	6	0	111
2009	0	0	5	20	13	18	8	45	26	9	0	144

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0	7
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
2005	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	5
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1994	0	0	0	0	2	1	0	2	1	2	0	8
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
2004	0	0	0	0	4	3	6	12	17	6	0	48
2005	0	0	0	2	1	1	1	5	4	4	0	18
2006	0	0	0	1	0	0	4	6	0	1	0	12
2007	0	0	0	4	0	0	1	5	1	0	0	11
2008	0	0	0	3	4	0	1	6	10	3	0	27
2009	0	0	0	3	2	6	4	16	8	0	0	39
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	6
2004	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	4
2005	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	6
2007	0	0	2	0	0	2	2	1	0	0	0	7
2008	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0	7
2009	0	0	0	1	0	1	0	2	3	0	0	7

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	4
2004	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	5
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	2	1	2	1	0	1	2	1	0	10
06 - Montréal-Centre												
1994	0	0	1	1	0	2	0	1	0	2	0	7
1995	0	0	0	4	1	1	1	0	0	1	0	8
1996	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	6
1997	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	4
1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2000	0	0	0	0	1	1	2	2	0	1	0	7
2001	0	0	0	0	2	2	2	5	1	0	0	12
2002	0	0	0	0	2	8	11	13	2	0	0	36
2003	0	0	0	4	7	21	23	47	12	1	0	115
2004	0	0	0	4	11	15	23	49	20	2	0	126
2005	0	0	1	7	16	22	33	83	14	4	0	180
2006	0	0	0	20	26	35	48	117	34	12	0	292
2007	0	0	2	5	17	17	29	63	34	6	0	173
2008	0	0	1	19	26	28	38	115	30	11	0	268
2009	0	0	4	16	25	35	29	76	37	5	0	227

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	5
2003	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	5
2004	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
2005	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
2006	0	0	0	1	1	0	1	3	5	0	0	11
2007	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
2008	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	6
2009	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	5
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Nord-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	5
12 - Chaudière-Appalaches												
1994	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	0	9
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	5
2006	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2008	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4
2009	0	0	0	2	2	0	0	1	0	2	0	7

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2005	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0	0	6
2006	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4
2007	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	5
2008	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4
2009	0	0	0	1	2	1	0	3	1	1	0	9
14 - Lanaudière												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	6
2005	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	5
2006	0	0	1	1	0	1	2	3	1	0	0	9
2007	0	0	1	0	2	0	0	3	1	1	0	8
2008	0	0	1	2	2	0	1	3	3	0	0	12
2009	0	0	1	4	0	1	3	4	1	0	0	14

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1994	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0	0	6
2005	0	0	1	0	1	0	1	2	1	0	0	6
2006	0	0	0	0	2	1	0	3	2	1	0	9
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
2008	0	0	0	0	0	1	0	7	3	0	0	12
2009	0	0	1	5	0	0	0	0	5	2	0	13
16 - Montérégie												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
2003	0	0	0	1	2	3	2	5	1	0	0	14
2004	0	0	0	1	5	1	2	5	4	1	0	19
2005	0	0	0	2	2	4	2	13	5	0	0	28
2006	0	0	2	1	0	7	3	8	7	1	0	29
2007	0	0	0	2	2	4	5	16	4	1	0	34
2008	0	0	3	4	6	2	7	8	8	1	0	39
2009	0	0	1	1	3	2	1	15	4	3	0	30

Tableau 19 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 10 juin 2009.

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Ensemble du Québec*												
1994	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	4
1995	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	5
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4
1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	5
2004	0	0	0	2	4	2	1	0	3	1	0	13
2005	0	0	1	0	2	1	0	3	0	1	0	8
2006	0	0	0	2	0	1	2	1	0	0	0	6
2007	0	0	0	2	1	2	0	0	2	0	0	7
2008	0	0	1	0	0	1	2	2	2	0	0	8
2009	0	0	0	5	1	2	0	7	1	1	0	17
Ensemble du Québec hors Montréal												
1994	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
1995	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3
2004	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	6
2005	0	0	1	0	2	0	0	3	0	0	0	6
2006	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
2007	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
2008	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	0	5
2009	0	0	0	2	1	0	0	3	1	1	0	8

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2007	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
06 - Montréal-Centre												
1994	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1995	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	4
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
2004	0	0	0	1	3	1	0	0	1	1	0	7
2005	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2006	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	4
2007	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	4
2008	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
2009	0	0	0	3	0	2	0	4	0	0	0	9

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Nord-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Chaudière-Appalaches												
1994	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
14 - Lanaudière												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Montérégie												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
2004	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
2005	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
2009	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Tableau 20 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Ensemble du Québec*												
1994	0	0	0	0	2	4	0	3	1	4	0	14
1995	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	5
1996	0	0	1	0	2	1	2	2	1	1	0	10
1997	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	5
1998	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
2000	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	5
2001	0	0	0	0	2	2	3	6	2	1	0	16
2002	0	0	0	0	2	10	15	17	3	0	0	47
2003	0	0	0	5	11	27	27	61	15	2	0	148
2004	0	0	0	3	18	20	41	82	53	9	0	227
2005	0	0	1	13	18	28	39	109	33	8	0	249
2006	0	0	3	23	29	43	60	145	54	15	0	372
2007	0	0	5	11	20	22	39	95	39	9	0	241
2008	0	0	4	29	39	32	48	146	55	17	0	370
2009	0	0	9	31	37	51	37	114	61	13	0	353
Ensemble du Québec hors Montréal												
1994	0	0	0	0	2	2	0	2	1	2	0	9
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4
1997	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
2002	0	0	0	0	0	2	4	4	1	0	0	11
2003	0	0	0	1	4	7	5	14	3	1	0	35
2004	0	0	0	0	10	6	18	33	34	8	0	109
2005	0	0	0	6	2	7	6	26	19	5	0	71
2006	0	0	3	4	3	9	13	29	20	3	0	84
2007	0	0	3	6	4	6	10	32	7	3	0	72
2008	0	0	3	10	13	4	12	31	26	6	0	105
2009	0	0	5	18	12	18	8	42	25	8	0	136

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	5
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
2005	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1994	0	0	0	0	2	1	0	2	1	2	0	8
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
2004	0	0	0	0	4	2	6	12	16	6	0	46
2005	0	0	0	2	0	1	1	5	4	4	0	17
2006	0	0	0	0	0	0	4	6	0	1	0	11
2007	0	0	0	3	0	0	1	5	1	0	0	10
2008	0	0	0	3	4	0	1	5	10	3	0	26
2009	0	0	0	3	2	6	4	16	8	0	0	39
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	5
2004	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	4
2005	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	6
2007	0	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	6
2008	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	6
2009	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	5

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	4
2004	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	5
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	2	1	2	1	0	1	2	0	0	9
06 - Montréal-Centre												
1994	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	5
1995	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	4
1996	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	6
1997	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2000	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	5
2001	0	0	0	0	2	2	2	5	1	0	0	12
2002	0	0	0	0	2	8	11	13	2	0	0	36
2003	0	0	0	4	7	20	22	47	12	1	0	113
2004	0	0	0	3	8	14	23	49	19	1	0	118
2005	0	0	1	7	16	21	33	83	14	3	0	178
2006	0	0	0	19	26	34	47	116	34	12	0	288
2007	0	0	2	5	16	16	29	63	32	6	0	169
2008	0	0	1	19	26	28	36	115	29	11	0	265
2009	0	0	4	13	25	33	29	72	36	5	0	217

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	5
2003	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	5
2004	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
2005	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
2006	0	0	0	1	1	0	1	3	5	0	0	11
2007	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
2008	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	6
2009	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	5
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Nord-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	5
12 - Chaudière-Appalaches												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	0	9
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	5
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2008	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4
2009	0	0	0	2	2	0	0	1	0	2	0	7

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2005	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0	0	6
2006	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4
2007	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	5
2008	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4
2009	0	0	0	0	1	1	0	3	1	1	0	7
14 - Lanaudière												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	6
2005	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	4
2006	0	0	1	1	0	1	2	3	1	0	0	9
2007	0	0	1	0	2	0	0	3	1	1	0	8
2008	0	0	1	2	2	0	1	3	3	0	0	12
2009	0	0	1	3	0	1	3	3	1	0	0	12

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1994	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0	0	6
2005	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	5
2006	0	0	0	0	2	1	0	3	2	1	0	9
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
2008	0	0	0	0	0	1	0	6	3	0	0	10
2009	0	0	1	5	0	0	0	0	5	2	0	13
16 - Montérégie												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
2003	0	0	0	1	1	3	1	5	1	0	0	12
2004	0	0	0	0	4	1	2	5	4	1	0	17
2005	0	0	0	2	1	4	2	12	5	0	0	26
2006	0	0	2	1	0	7	3	8	7	1	0	29
2007	0	0	0	2	2	4	5	16	4	1	0	34
2008	0	0	2	4	6	2	7	8	7	1	0	37
2009	0	0	1	1	3	2	1	14	4	3	0	29

Tableau 21 Nombre de cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Ensemble du Québec*											
1994	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,1	0,4	0,3
1995	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
1996	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2
1997	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,5	0,5	0,2	0,1	0,2
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,5	1,3	0,3	0,0	0,6
2003	0,0	0,0	0,0	1,0	2,4	5,7	5,0	4,9	1,5	0,1	2,0
2004	0,0	0,0	0,0	1,0	4,3	4,5	7,6	6,4	5,3	0,7	3,2
2005	0,0	0,0	0,4	2,6	3,9	6,0	7,3	8,7	3,1	0,6	3,4
2006	0,0	0,0	0,6	5,0	5,5	9,0	12,0	11,4	4,9	1,0	5,0
2007	0,0	0,0	1,0	2,7	3,9	4,8	7,7	7,5	3,6	0,6	3,2
2008	0,0	0,0	1,0	6,0	7,3	6,4	9,9	12,0	5,0	1,1	4,9
2009	0,0	0,0	1,8	7,4	7,1	10,0	7,4	10,0	5,4	0,9	4,7
Ensemble du Québec hors Montréal											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
1995	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1
1997	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	0,4	0,1	0,0	0,2
2003	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,0	1,4	1,5	0,4	0,1	0,7
2004	0,0	0,0	0,0	0,3	3,2	2,1	4,7	3,3	4,4	0,8	2,0
2005	0,0	0,0	0,3	1,7	1,1	2,0	1,5	2,9	2,3	0,5	1,3
2006	0,0	0,0	0,8	1,4	0,8	2,6	3,7	2,9	2,3	0,3	1,5
2007	0,0	0,0	0,8	2,3	1,1	2,0	2,7	3,3	0,8	0,3	1,3
2008	0,0	0,0	1,0	2,9	3,5	1,4	3,3	3,5	3,0	0,5	1,9
2009	0,0	0,0	1,3	5,7	3,5	4,8	2,2	4,8	2,8	0,7	2,4

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,2	0,0	1,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	5,7	12,5	0,0	3,5
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,4
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,4	0,0	1,1
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	2,3	0,0	1,8
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	1,8	0,0	1,9	1,5	1,9	1,2
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,2
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,2
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,1	0,0	1,0	0,0	0,5
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	7,4	13,3	10,6	17,1	4,5	7,2
2005	0,0	0,0	0,0	4,2	2,0	2,5	2,3	4,5	3,9	2,9	2,7
2006	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	9,6	5,5	0,0	0,7	1,8
2007	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	2,5	4,7	1,0	0,0	1,6
2008	0,0	0,0	0,0	6,8	7,7	0,0	2,5	5,8	9,3	2,0	4,0
2009	0,0	0,0	0,0	7,0	3,9	13,1	9,9	15,8	7,4	0,0	5,7
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,4
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,2
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	3,9	3,0	2,4	0,0	0,0	1,2
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	4,1	0,0	0,8
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,2
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	5,0	1,3	0,0	1,2
2007	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	7,5	7,4	1,3	0,0	0,0	1,4
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,6	7,6	4,0	0,0	0,0	1,4
2009	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,4	0,0	2,8	3,7	0,0	1,4

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,3
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	4,8	4,2	0,0	0,0	1,4
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	6,2	2,3	0,0	1,7
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	1,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	10,0	5,1	9,7	5,3	0,0	2,3	4,2	1,4	3,3
06 - Montréal-Centre											
1994	0,0	0,0	1,0	0,7	0,0	1,2	0,0	0,4	0,0	0,6	0,4
1995	0,0	0,0	0,0	3,0	0,6	0,6	0,7	0,0	0,0	0,3	0,4
1996	0,0	0,0	1,0	0,0	0,7	0,0	1,3	0,8	0,0	0,0	0,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0	0,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,3	0,7	0,0	0,3	0,4
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	1,3	1,8	0,5	0,0	0,6
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,5	7,2	4,5	0,9	0,0	1,9
2003	0,0	0,0	0,0	2,8	4,5	14,4	15,5	16,3	5,2	0,3	6,1
2004	0,0	0,0	0,0	2,8	6,9	10,3	15,8	16,9	8,6	0,5	6,7
2005	0,0	0,0	1,0	4,9	9,9	15,2	23,2	28,6	5,9	1,1	9,6
2006	0,0	0,0	0,0	14,1	15,8	24,5	34,2	40,5	14,2	3,2	15,6
2007	0,0	0,0	1,9	3,6	10,3	11,6	20,8	22,0	14,0	1,6	9,2
2008	0,0	0,0	1,0	14,1	15,8	18,5	27,4	40,3	12,2	2,9	14,2
2009	0,0	0,0	3,8	12,1	15,3	22,6	20,9	26,9	15,0	1,3	11,9

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,3
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	10,3	1,7	0,0	0,0	1,5
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	3,5	5,0	0,0	0,0	1,5
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,2	0,0	0,0	0,9
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	1,6	0,0	0,0	0,6
2006	0,0	0,0	0,0	4,6	4,5	0,0	4,0	4,8	10,0	0,0	3,2
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,6
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,1	3,3	3,8	0,0	1,7
2009	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	1,7	3,7	0,0	1,4
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,6
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,7

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	1,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - Nord-du-Québec											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	12,8
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	1,1
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	1,1
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	42,1	0,0	6,7	0,0	0,0	5,3
12 - Chaudière-Appalaches											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,3
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,5
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	7,4	3,0	5,2	1,4	2,3
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,0	1,3	1,3
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	1,6	0,0	0,5
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	1,6	0,0	0,0	0,5
2008	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	2,3	1,0
2009	0,0	0,0	0,0	8,3	7,9	0,0	0,0	1,6	0,0	2,2	1,7

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,3
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	1,6	0,0	0,0	0,6
2005	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,2	0,0	1,5	6,2	0,0	1,6
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,0	0,0	1,1
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	2,0	0,0	1,3
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	1,9	0,0	1,0
2009	0,0	0,0	0,0	4,2	8,2	3,9	0,0	4,7	1,9	1,3	2,3
14 - Lanaudière											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,0	0,5
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,2
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	1,4
2005	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	3,3	1,3	3,3	0,0	1,2
2006	0,0	0,0	3,2	4,1	0,0	3,8	6,8	3,8	1,6	0,0	2,1
2007	0,0	0,0	3,1	0,0	7,6	0,0	0,0	3,8	1,5	1,2	1,8
2008	0,0	0,0	3,0	7,8	7,5	0,0	3,4	3,9	4,4	0,0	2,7
2009	0,0	0,0	2,9	15,1	0,0	3,4	10,2	5,3	1,4	0,0	3,0

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,2
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,2	0,0	1,1	4,3	0,0	1,2
2005	0,0	0,0	3,1	0,0	3,4	0,0	2,6	2,1	1,4	0,0	1,2
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	3,1	0,0	3,2	2,7	1,1	1,7
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,0	0,6
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	7,6	3,7	0,0	2,2
2009	0,0	0,0	2,6	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	1,9	2,4
16 - Montérégie											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	0,5	0,0	0,2
2003	0,0	0,0	0,0	1,2	2,5	3,6	1,9	2,1	0,5	0,0	1,0
2004	0,0	0,0	0,0	1,2	6,1	1,2	2,0	2,1	2,1	0,4	1,4
2005	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	4,8	2,1	5,4	2,5	0,0	2,0
2006	0,0	0,0	2,2	1,2	0,0	8,2	3,1	3,3	3,5	0,4	2,1
2007	0,0	0,0	0,0	2,4	2,3	4,6	5,3	6,8	1,9	0,4	2,4
2008	0,0	0,0	3,0	4,8	6,9	2,2	7,6	3,4	3,8	0,4	2,8
2009	0,0	0,0	1,0	1,2	3,4	2,2	1,1	6,5	1,9	1,0	2,1

Tableau 22 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,9	0,0	0,0	9,5
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Ensemble du Québec*											
1994	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1
1995	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,2	0,0	0,0	0,1
2004	0,0	0,0	0,0	0,8	1,6	0,8	0,4	0,0	0,6	0,1	0,3
2005	0,0	0,0	0,4	0,0	0,8	0,4	0,0	0,5	0,0	0,1	0,2
2006	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,4	0,8	0,2	0,0	0,0	0,2
2007	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2
2008	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,8	0,3	0,3	0,0	0,2
2009	0,0	0,0	0,0	2,1	0,4	0,8	0,0	1,2	0,2	0,1	0,4
Ensemble du Québec hors Montréal											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,1
1995	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,1
2004	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,5	0,0	0,5	0,0	0,2
2005	0,0	0,0	0,6	0,0	1,2	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2
2006	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1
2007	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2008	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2
2009	0,0	0,0	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	0,7	0,2	0,1	0,3

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	6,3	0,0	2,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,7
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,3
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	1,9	0,0	0,6
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2006	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2007	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,3
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,4
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,5	0,0	0,8

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,6
06 - Montréal-Centre											
1994	0,0	0,0	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
1995	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,4
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,2
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,2
2004	0,0	0,0	0,0	1,4	3,8	1,4	0,0	0,0	0,8	0,5	0,7
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2
2006	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,5	1,5	0,7	0,0	0,0	0,4
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,4
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,8	0,0	0,3
2009	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	2,7	0,0	2,9	0,0	0,0	0,9

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - Nord-du-Québec											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Chaudière-Appalaches											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,5
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	8,6	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
14 - Lanaudière											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,5
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,9

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,4
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 - Montérégie											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,3
2004	0,0	0,0	0,0	2,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,3
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,3
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,1

Tableau 23 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
Ensemble du Québec*											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	0,0	0,6	0,3	0,8	0,4
1995	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1
1996	0,0	0,0	0,4	0,0	0,8	0,3	0,6	0,4	0,3	0,2	0,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,2	0,0	0,2	0,1
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,9	1,0	0,4	0,2	0,4
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,0	4,9	2,7	0,6	0,0	1,3
2003	0,0	0,0	0,0	1,9	4,3	10,8	9,2	9,5	3,0	0,3	4,0
2004	0,0	0,0	0,0	1,1	6,9	8,0	14,5	12,7	10,3	1,5	6,1
2005	0,0	0,0	0,4	5,0	6,8	11,2	14,3	16,8	6,2	1,3	6,6
2006	0,0	0,0	1,2	9,0	10,8	17,1	22,6	22,4	10,0	2,3	9,8
2007	0,0	0,0	2,0	4,4	7,4	8,6	15,0	14,9	7,0	1,3	6,3
2008	0,0	0,0	1,6	11,7	14,3	12,1	18,6	23,3	9,7	2,4	9,6
2009	0,0	0,0	3,5	12,5	13,6	18,8	14,3	18,5	10,5	1,8	9,1
Ensemble du Québec hors Montréal											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8	0,0	0,5	0,4	0,6	0,3
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1
1997	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,3	0,2	0,1
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,8	0,8	0,3	0,0	0,4
2003	0,0	0,0	0,0	0,5	2,3	4,0	2,3	2,8	0,8	0,2	1,3
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	3,5	8,7	6,6	8,4	1,7	3,9
2005	0,0	0,0	0,0	3,2	1,1	4,0	3,0	5,2	4,6	1,0	2,5
2006	0,0	0,0	1,6	2,2	1,6	5,1	6,8	5,8	4,7	0,6	2,9
2007	0,0	0,0	1,5	3,3	2,1	3,3	5,3	6,5	1,6	0,6	2,5
2008	0,0	0,0	1,5	5,5	6,8	2,1	6,5	6,5	5,8	1,1	3,6
2009	0,0	0,0	2,4	9,9	6,3	9,4	4,3	9,0	5,5	1,4	4,6

¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
01 - Bas-Saint-Laurent											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	6,4	0,0	2,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	18,6	0,0	5,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,7
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	4,7	0,0	2,2
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	4,6	0,0	2,9
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
03 - Québec											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	3,4	0,0	4,0	3,0	4,7	2,6
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,3
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,1	0,0	2,1	0,0	0,9
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	9,3	25,9	21,3	33,2	10,6	14,2
2005	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	4,7	4,5	8,9	8,1	6,8	5,2
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	10,9	0,0	1,6	3,4
2007	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	4,7	9,2	2,0	0,0	3,0
2008	0,0	0,0	0,0	13,6	14,9	0,0	4,7	9,5	19,3	4,5	7,8
2009	0,0	0,0	0,0	13,8	7,6	25,0	18,8	31,1	15,2	0,0	11,6
04 - Mauricie et Centre-du-Québec											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,4
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,4
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,4
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	7,5	5,9	2,4	0,0	0,0	2,1
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	8,2	0,0	1,7
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,4
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	9,9	2,6	0,0	2,5
2007	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	7,2	14,2	2,5	0,0	0,0	2,5
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	14,6	7,9	0,0	0,0	2,5
2009	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	2,7	4,9	0,0	2,0

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
05 - Estrie											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,7
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	9,4	8,3	0,0	0,0	2,7
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	12,4	4,6	0,0	3,4
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	2,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	19,5	10,0	18,9	10,2	0,0	4,5	8,5	0,0	5,9
06 - Montréal-Centre											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,8	0,0	1,4	0,6
1995	0,0	0,0	0,0	1,5	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5
1996	0,0	0,0	2,0	0,0	1,3	0,0	2,6	1,6	0,0	0,0	0,7
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	0,0	0,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,2
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,5	0,7	0,0	0,7	0,6
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,7	2,5	3,6	1,0	0,0	1,3
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	10,5	13,7	9,1	1,9	0,0	4,0
2003	0,0	0,0	0,0	5,6	8,7	26,2	28,1	32,4	11,0	0,7	12,4
2004	0,0	0,0	0,0	4,2	9,9	18,5	30,1	33,4	17,1	0,7	12,9
2005	0,0	0,0	2,0	10,0	19,7	28,0	44,1	56,2	12,3	2,0	19,5
2006	0,0	0,0	0,0	27,2	31,5	45,7	63,8	78,2	29,5	7,8	31,5
2007	0,0	0,0	3,8	7,4	19,4	21,1	39,8	42,6	27,4	3,8	18,4
2008	0,0	0,0	1,9	28,4	31,6	35,9	49,4	77,9	24,5	6,8	28,6
2009	0,0	0,0	7,4	19,7	30,8	41,4	39,9	49,0	29,9	3,0	23,3

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
07 - Outaouais											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,6
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	20,7	3,4	0,0	0,0	3,1
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	7,1	10,0	0,0	0,0	3,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	6,5	0,0	0,0	1,8
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	3,2	0,0	0,0	1,2
2006	0,0	0,0	0,0	8,9	9,0	0,0	8,0	9,6	20,2	0,0	6,4
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	8,2	0,0	0,0	0,0	1,2
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,2	6,6	7,6	0,0	3,4
2009	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	3,3	7,4	0,0	2,8
08 - Abitibi-Témiscamingue											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	1,3
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	1,4

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
09 - Côte-Nord											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	2,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - Nord-du-Québec											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,9	0,0	0,0	24,1
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	2,1
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	2,1
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	82,8	0,0	13,5	0,0	0,0	10,7
12 - Chaudière-Appalaches											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	3,0	0,0	0,0	1,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	14,2	5,9	10,2	3,0	4,6
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	10,0	2,9	2,5
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,5
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	3,0	0,0	0,0	1,0
2008	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	5,1	2,0
2009	0,0	0,0	0,0	15,9	15,1	0,0	0,0	3,2	0,0	4,8	3,5

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
13 - Laval											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,6
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,6
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	3,1	0,0	0,0	1,1
2005	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	8,4	0,0	3,1	12,7	0,0	3,3
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	8,3	0,0	2,2
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	4,0	0,0	2,7
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	3,9	0,0	2,1
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,0	0,0	9,3	3,8	2,8	3,6
14 - Lanaudière											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,3	1,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,5
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	31,7	0,0	0,0	0,0	2,9
2005	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	6,7	0,0	6,5	0,0	1,9
2006	0,0	0,0	6,3	7,7	0,0	7,5	13,5	7,6	3,1	0,0	4,1
2007	0,0	0,0	6,0	0,0	15,1	0,0	0,0	7,6	3,0	2,6	3,6
2008	0,0	0,0	5,7	15,1	14,9	0,0	6,7	7,7	8,8	0,0	5,3
2009	0,0	0,0	5,7	21,9	0,0	6,7	20,1	7,9	2,8	0,0	5,2

Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
15 - Laurentides											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,4
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,3	0,0	2,2	8,7	0,0	2,4
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	5,2	4,3	2,8	0,0	2,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	6,2	0,0	6,3	5,4	2,3	3,5
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,2	1,1
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	12,9	7,5	0,0	3,7
2009	0,0	0,0	5,0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	3,9	4,8
16 - Montérégie											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,9	1,1	0,0	0,5
2003	0,0	0,0	0,0	2,2	2,4	7,1	1,9	4,3	1,1	0,0	1,8
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	2,4	4,0	4,2	4,2	0,9	2,5
2005	0,0	0,0	0,0	4,5	2,3	9,4	4,1	10,0	5,2	0,0	3,8
2006	0,0	0,0	4,2	2,3	0,0	16,1	6,2	6,7	7,1	0,9	4,2
2007	0,0	0,0	0,0	4,7	4,5	9,0	10,6	13,5	4,0	0,8	4,9
2008	0,0	0,0	3,9	9,4	13,3	4,4	14,9	6,9	6,8	0,8	5,3
2009	0,0	0,0	1,9	2,3	6,6	4,3	2,1	12,2	3,8	2,3	4,1


Tableau 24 Taux d'incidence brut (taux par 100 000) des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Total
17 - Nunavik											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,5	0,0	0,0	18,5
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James											
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9


Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Figure 97 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, selon le groupe d'âge, province de Québec*, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes



¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.


Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 98 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, selon le groupe d'âge, Québec, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 99 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, selon le groupe d'âge, Montréal, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes




¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.


Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Figure 100 Taux d'incidence brut des cas déclarés de syphilis infectieuse¹, selon le groupe d'âge, Montérégie, 1994 à 2009

Chez les femmes



Chez les hommes



¹ Syphilis primaire, secondaire et latente moins d'un an.

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Source des dénominateurs : MSSS (janvier 2010) selon les données du SDI (1994-2006) et de l'ISQ (2006-2009).

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Ensemble du Québec*												
1994	0	0	2	2	12	5	5	14	7	28	0	75
1995	0	0	1	6	7	5	3	10	12	16	0	61
1996	0	0	0	2	7	8	5	9	2	16	0	50
1997	0	0	0	1	2	4	5	3	5	19	0	40
1998	0	0	0	1	5	2	3	6	2	19	0	39
1999	0	0	0	2	2	0	2	6	4	10	0	26
2000	0	0	0	5	0	1	5	3	1	9	0	24
2001	0	0	0	0	3	5	4	8	3	13	0	36
2002	0	0	0	0	5	7	7	11	7	15	0	52
2003	1	0	1	5	6	17	12	23	22	30	0	117
2004	0	0	1	3	11	3	6	20	18	30	0	92
2005	0	0	1	2	6	6	7	15	18	34	0	89
2006	0	0	0	3	7	10	13	24	18	36	0	111
2007	0	0	0	4	10	16	11	19	17	24	0	101
2008	0	0	3	7	11	16	19	38	37	41	0	173
2009	0	0	1	4	10	12	20	21	14	52	0	134
Ensemble du Québec hors Montréal												
1994	0	0	0	0	2	1	1	7	4	11	0	26
1995	0	0	1	0	2	1	1	3	2	7	0	17
1996	0	0	0	0	2	0	2	2	0	10	0	16
1997	0	0	0	1	1	2	2	1	1	10	0	18
1998	0	0	0	0	0	0	2	2	1	10	0	15
1999	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	0	9
2000	0	0	0	2	0	0	2	1	0	4	0	9
2001	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	5
2002	0	0	0	0	1	0	2	3	1	6	0	13
2003	1	0	0	4	1	2	1	5	6	8	0	28
2004	0	0	1	1	3	0	2	10	10	16	0	43
2005	0	0	1	2	2	3	5	9	11	27	0	60
2006	0	0	0	0	2	5	5	11	12	25	0	60
2007	0	0	0	0	6	3	7	10	12	19	0	57
2008	0	0	2	2	4	6	4	12	20	22	0	72
2009	0	0	0	1	5	9	7	8	11	38	0	79

¹ Syphilis latente plus d'un an, cardio-vasculaire, nerveuse (symptomatique et asymptomatique) et symptomatique tardive.

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
1997	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
1998	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	8
2005	0	0	1	0	1	0	1	3	1	5	0	12
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	5
2007	0	0	0	0	1	0	1	0	3	4	0	9
2008	0	0	0	1	3	2	0	2	2	4	0	14
2009	0	0	0	0	0	2	1	1	0	6	0	10
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	4
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2004	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	4
2005	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	5
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	5
2009	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	4

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2002	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
2009	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
06 - Montréal-Centre												
1994	0	0	2	2	10	4	4	7	3	17	0	49
1995	0	0	0	6	5	4	2	7	10	9	0	44
1996	0	0	0	2	5	8	3	7	2	6	0	34
1997	0	0	0	0	1	2	3	2	4	9	0	22
1998	0	0	0	1	5	2	1	4	1	9	0	24
1999	0	0	0	2	1	0	1	5	1	7	0	17
2000	0	0	0	3	0	1	3	2	1	5	0	15
2001	0	0	0	0	3	3	4	7	3	11	0	31
2002	0	0	0	0	4	7	5	8	6	9	0	39
2003	0	0	1	1	5	15	11	18	16	22	0	89
2004	0	0	0	2	8	3	4	10	8	14	0	49
2005	0	0	0	0	4	3	2	6	7	7	0	29
2006	0	0	0	3	5	5	8	13	6	11	0	51
2007	0	0	0	4	4	13	4	9	5	5	0	44
2008	0	0	1	5	7	10	15	26	17	19	0	101
2009	0	0	1	3	5	3	13	13	3	14	0	55

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	4
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1999	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	5
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2005	0	0	0	1	0	0	2	1	2	1	0	7
2006	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	6
2007	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	0	9
2008	0	0	0	0	1	2	1	2	1	1	0	8
2009	0	0	0	0	3	1	0	1	3	7	0	15
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10 - Nord-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1993 à 2008 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2008	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Chaudière-Appalaches												
1994	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	4
2006	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1994	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	0	6
1995	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	6
1999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	5
2003	1	0	0	1	1	1	0	1	2	1	0	8
2004	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	0	6
2005	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	0	10
2006	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	0	8
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
2008	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	0	9
2009	0	0	0	0	1	1	1	2	1	3	0	9
14 - Lanaudière												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4
2008	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	5
2009	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5	0	8

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1994	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	0	6
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2007	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	5
2008	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Montérégie												
1994	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4
1995	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4	0	7
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	5
1997	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
2000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2001	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
2002	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
2003	0	0	0	1	0	1	0	3	0	3	0	8
2004	0	0	0	0	1	0	0	3	2	6	0	12
2005	0	0	0	1	0	1	1	3	4	9	0	19
2006	0	0	0	0	1	1	3	5	4	9	0	23
2007	0	0	0	0	4	2	5	3	3	7	0	24
2008	0	0	0	0	0	0	1	4	7	11	0	23
2009	0	0	0	0	0	4	4	3	5	13	0	29

Tableau 25 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹ selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source des numérateurs : Registre MADQ, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Ensemble du Québec*												
1994	0	0	1	0	4	3	2	1	1	20	0	32
1995	0	0	1	6	4	2	1	3	6	10	0	34
1996	0	0	0	2	4	3	2	2	0	11	0	24
1997	0	0	0	1	1	2	2	0	4	9	0	19
1998	0	0	0	0	3	1	2	1	0	12	0	20
1999	0	0	0	1	1	0	1	0	0	4	0	7
2000	0	0	0	4	0	1	1	0	0	3	0	9
2001	0	0	0	0	1	2	3	2	1	8	0	17
2002	0	0	0	0	3	5	0	2	0	10	0	20
2003	1	0	0	4	4	2	2	4	4	13	0	34
2004	0	0	0	1	1	1	2	9	3	16	0	33
2005	0	0	1	1	0	3	3	1	7	14	0	30
2006	0	0	0	2	5	4	5	6	4	16	0	42
2007	0	0	0	2	7	6	3	6	5	13	0	42
2008	0	0	2	5	6	5	8	8	8	15	0	57
2009	0	0	1	4	5	5	9	7	0	18	0	49
Ensemble du Québec hors Montréal												
1994	0	0	0	0	1	1	0	1	0	9	0	12
1995	0	0	1	0	2	0	0	2	1	3	0	9
1996	0	0	0	0	1	0	1	1	0	6	0	9
1997	0	0	0	1	1	1	0	0	1	4	0	8
1998	0	0	0	0	0	0	2	0	0	8	0	10
1999	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
2000	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	4
2001	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2002	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	4
2003	1	0	0	3	1	1	0	0	0	3	0	9
2004	0	0	0	0	1	0	1	3	1	10	0	16
2005	0	0	1	1	0	2	3	1	6	14	0	28
2006	0	0	0	0	2	2	3	3	4	12	0	26
2007	0	0	0	0	3	1	2	3	3	10	0	22
2008	0	0	1	2	3	2	1	2	4	9	0	24
2009	0	0	0	1	3	4	3	2	0	13	0	26

¹ Syphilis latente plus d'un an, cardio-vasculaire, nerveuse (symptomatique et asymptomatique) et symptomatique tardive.

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2005	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	5
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
2008	0	0	0	1	2	0	0	1	0	2	0	6
2009	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2009	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
06 - Montréal-Centre												
1994	0	0	1	0	3	2	2	0	1	11	0	20
1995	0	0	0	6	2	2	1	1	5	7	0	25
1996	0	0	0	2	3	3	1	1	0	5	0	15
1997	0	0	0	0	0	1	2	0	3	5	0	11
1998	0	0	0	0	3	1	0	1	0	4	0	10
1999	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	5
2000	0	0	0	2	0	1	1	0	0	1	0	5
2001	0	0	0	0	1	1	3	2	1	7	0	15
2002	0	0	0	0	2	5	0	2	0	7	0	16
2003	0	0	0	1	3	1	2	4	4	10	0	25
2004	0	0	0	1	0	1	1	6	2	6	0	17
2005	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
2006	0	0	0	2	3	2	2	3	0	4	0	16
2007	0	0	0	2	4	5	1	3	2	3	0	20
2008	0	0	1	3	3	3	7	6	4	6	0	33
2009	0	0	1	3	2	1	6	5	0	5	0	23

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1999	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	4
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2008	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3
2009	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	4
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10 - Nord-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Chaudière-Appalaches												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2006	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1994	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
2005	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	0	7
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
2008	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
14 - Lanaudière												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2008	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
2009	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	4

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Montérégie												
1994	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
1995	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
1997	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2003	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3
2004	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	0	6
2005	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	0	9
2006	0	0	0	0	1	0	3	2	2	4	0	12
2007	0	0	0	0	3	1	2	1	0	4	0	11
2008	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	9
2009	0	0	0	0	0	1	2	0	0	5	0	8

Tableau 26 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les femmes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source des numérateurs : Registre MADO, LSPQ, 20 mai 2010.

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
Ensemble du Québec*												
1994	0	0	1	2	8	2	3	13	6	8	0	43
1995	0	0	0	0	3	3	2	7	6	6	0	27
1996	0	0	0	0	3	5	3	7	2	5	0	26
1997	0	0	0	0	1	2	3	3	1	10	0	21
1998	0	0	0	1	2	1	1	5	2	7	0	19
1999	0	0	0	1	1	0	1	6	4	6	0	19
2000	0	0	0	1	0	0	4	3	1	6	0	15
2001	0	0	0	0	2	3	1	6	2	5	0	19
2002	0	0	0	0	2	2	7	9	7	5	0	32
2003	0	0	1	1	2	15	10	19	18	17	0	83
2004	0	0	1	2	10	2	4	11	15	14	0	59
2005	0	0	0	1	6	3	4	14	11	20	0	59
2006	0	0	0	1	2	6	8	18	14	20	0	69
2007	0	0	0	2	3	10	8	13	12	11	0	59
2008	0	0	1	2	5	11	11	30	29	26	0	115
2009	0	0	0	0	5	7	11	14	14	34	0	85
Ensemble du Québec hors Montréal												
1994	0	0	0	0	1	0	1	6	4	2	0	14
1995	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	0	8
1996	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	0	7
1997	0	0	0	0	0	1	2	1	0	6	0	10
1998	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	5
1999	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	7
2000	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	5
2001	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
2002	0	0	0	0	0	0	2	3	1	3	0	9
2003	0	0	0	1	0	1	1	5	6	5	0	19
2004	0	0	1	1	2	0	1	7	9	6	0	27
2005	0	0	0	1	2	1	2	8	5	13	0	32
2006	0	0	0	0	0	3	2	8	8	13	0	34
2007	0	0	0	0	3	2	5	7	9	9	0	35
2008	0	0	1	0	1	4	3	10	16	13	0	48
2009	0	0	0	0	2	5	4	6	11	25	0	53

¹ Syphilis latente plus d'un an, cardio-vasculaire, nerveuse (symptomatique et asymptomatique) et symptomatique tardive.

* Les données pour la province de Québec n'incluent pas les cas dont la région est inconnue ou hors Québec.

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
01 - Bas-Saint-Laurent												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
02 - Saguenay—Lac-Saint-Jean												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
03 - Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	6
2005	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	0	7
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	5
2007	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	6
2008	0	0	0	0	1	2	0	1	2	2	0	8
2009	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	0	8
04 - Mauricie et Centre-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2004	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
2005	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	4
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
05 - Estrie												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Montréal-Centre												
1994	0	0	1	2	7	2	2	7	2	6	0	29
1995	0	0	0	0	3	2	1	6	5	2	0	19
1996	0	0	0	0	2	5	2	6	2	1	0	19
1997	0	0	0	0	1	1	1	2	1	4	0	11
1998	0	0	0	1	2	1	1	3	1	5	0	14
1999	0	0	0	1	1	0	0	5	1	4	0	12
2000	0	0	0	1	0	0	2	2	1	4	0	10
2001	0	0	0	0	2	2	1	5	2	4	0	16
2002	0	0	0	0	2	2	5	6	6	2	0	23
2003	0	0	1	0	2	14	9	14	12	12	0	64
2004	0	0	0	1	8	2	3	4	6	8	0	32
2005	0	0	0	0	4	2	2	6	6	7	0	27
2006	0	0	0	1	2	3	6	10	6	7	0	35
2007	0	0	0	2	0	8	3	6	3	2	0	24
2008	0	0	0	2	4	7	8	20	13	13	0	67
2009	0	0	0	0	3	2	7	8	3	9	0	32

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
07 - Outaouais												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
2006	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	6
2007	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	0	8
2008	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	5
2009	0	0	0	0	1	1	0	1	3	5	0	11
08 - Abitibi-Témiscamingue												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
09 - Côte-Nord												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Nord-du-Québec												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
11 - Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Chaudière-Appalaches												
1994	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
2005	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
13 - Laval												
1994	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
1995	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
2003	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	0	6
2004	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	4
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
2006	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	5
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2008	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0	8
2009	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	6
14 - Lanaudière												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
2009	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
15 - Laurentides												
1994	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4
2008	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Montérégie												
1994	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
1995	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	5
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
2000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2003	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5
2004	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	6
2005	0	0	0	1	0	0	1	3	2	3	0	10
2006	0	0	0	0	0	1	0	3	2	5	0	11
2007	0	0	0	0	1	1	3	2	3	3	0	13
2008	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	14
2009	0	0	0	0	0	3	2	3	5	8	0	21

Tableau 27 Nombre de cas déclarés de syphilis non infectieuse¹, chez les hommes, selon le territoire et le groupe d'âge, 1994 à 2009 (suite)

Territoire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 +	Inconnu	Total
17 - Nunavik												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James												
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source des numérateurs : Registre MAD0, LSPQ, 20 mai 2010.

www.inspq.qc.ca

Québec 

- Institut national de santé publique
- Ministère de la Santé et des Services sociaux