

Tableau pour le transfert interrégions, interétablissements ou interinstallations de soins aigus et test COVID-19¹

Discuté au CINQ le 9 juin 2020, mis à jour le 3 septembre 2020

Situation de l'usager hospitalisé ²	Transfert froid vers chaud ³	Transfert chaud vers froid ³
A) USAGER SANS RISQUE <ul style="list-style-type: none"> • PCR COVID-19 négatif testé à l'admission • Pas de symptômes • Pas de contact à risque 	<ul style="list-style-type: none"> • Admission en zone froide • Surveillance des symptômes • Pas d'isolement préventif 	<ul style="list-style-type: none"> • Admission en zone froide ou zone tiède selon épidémiologie³ • Surveillance des symptômes • Pas d'isolement préventif
B) USAGER RÉTABLI^{4, 5} AYANT FAIT UNE MALADIE LÉGÈRE OU MODÉRÉE <ul style="list-style-type: none"> • > 10 jours suivant le début des symptômes (> 28 jours si immunosupprimé⁷) • Résolution de symptômes aigus (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles) depuis 24 heures et pas de fièvre depuis 48 heures (sans prise d'antipyrétique) 	<ul style="list-style-type: none"> • Admission en zone froide • Pas d'isolement 	<ul style="list-style-type: none"> • Admission en zone froide • Pas d'isolement
C) USAGER RÉTABLI^{4, 6} AYANT FAIT UNE MALADIE SÉVÈRE (c.-à-d. admis ou ayant été admis aux soins intensifs en lien avec la COVID-19) <ul style="list-style-type: none"> • > 21 jours suivant le début des symptômes (> 28 jours si immunosupprimé⁷) • Résolution de symptômes aigus (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles) depuis 24 heures et pas de fièvre depuis 48 heures (sans prise d'antipyrétique) 	<ul style="list-style-type: none"> • Admission en zone froide • Pas d'isolement 	<ul style="list-style-type: none"> • Admission en zone froide • Pas d'isolement
D) USAGER SYMPTOMATIQUE AVEC TEST NÉGATIF <ul style="list-style-type: none"> • PCR COVID-19 négatif au moment des symptômes compatibles avec COVID-19 • Pas de contact à risque (pas un contact étroit, pas un contact domiciliaire...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Admission en zone tiède • Surveillance des symptômes • Isolement • Répéter test 48 heures après (si négatif, référer à usager sans risque) 	<ul style="list-style-type: none"> • Admission en zone tiède • Surveillance des symptômes • Isolement • Répéter test 48 heures après (si négatif, référer à usager sans risque)
E) USAGER SYMPTOMATIQUE AVEC TEST NÉGATIF À L'ADMISSION <ul style="list-style-type: none"> • PCR COVID-19 négatif testé à l'admission ou 48 heures avant admission • Nouveaux symptômes compatibles avec COVID-19 et sans test de suivi 	<ul style="list-style-type: none"> • Refaire le test avant le transfert • Si transfert urgent : admission en zone tiède avec isolement en attendant les résultats du test 	<ul style="list-style-type: none"> • Refaire le test avant le transfert • Si transfert urgent : admission en zone tiède avec isolement en attendant les résultats du test
F) USAGER AVEC CONTACT À RISQUE <ul style="list-style-type: none"> • Pas de symptômes • Contact à risque (contact étroit lors d'éclosion, contact domiciliaire...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Admission en zone froide ou zone tiède selon modalités locales³ • Compléter isolement préventif ad 14 jours post dernier contact 	<ul style="list-style-type: none"> • Admission en zone froide ou zone tiède selon modalités locales³ • Compléter isolement préventif ad 14 jours post dernier contact
G) USAGER NON RÉTABLI AVEC UNE MALADIE LÉGÈRE OU MODÉRÉE <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 10 jours suivant le début des symptômes ou date du test si asymptomatique (≤ 28 jours si immunosupprimé⁷) 	<ul style="list-style-type: none"> • Admission en zone chaude • Isolement jusqu'à rétablissement 	<ul style="list-style-type: none"> • Admission en zone chaude • Isolement jusqu'à rétablissement
H) USAGER NON RÉTABLI AVEC UNE MALADIE SÉVÈRE (c.-à-d. admis ou ayant été admis aux soins intensifs en lien avec la COVID-19) <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 21 jours suivant le début des symptômes ou date du test si asymptomatique (≤ 28 jours si immunosupprimé⁷) 	<ul style="list-style-type: none"> • Admission en zone chaude • Isolement jusqu'à rétablissement 	<ul style="list-style-type: none"> • Admission en zone chaude • Isolement jusqu'à rétablissement

Notes explicatives

1. Le PCR COVID-19 :
 - 1.1. Installation d'origine : le test fait à l'installation d'origine à l'admission n'a pas besoin d'être répété par l'installation d'origine avant le transfert (sauf pour usager symptomatique avec test négatif à l'admission) vers l'installation receveur.
 - 1.2. Installation receveur : le test à l'admission n'est pas requis si le cas est évalué « froid » (voir note 3). Si le cas est évalué « tiède » ou « chaud », refaire le test 48 heures après l'admission selon les modalités locales.
2. Il faut prendre en considération un séjour hospitalier si celui-ci a été d'une durée de plus de 24 heures. Si moins de 24 heures, aucune mesure à prendre.
3. L'évaluation de l'épidémiologie locale au niveau de la région, de l'établissement, de l'installation ou de l'unité de soins doit être fait en collaboration avec l'équipe de PCI afin de déterminer le « chaud » ou « froid ». Une adaptation locale de la grille est possible selon cette évaluation. La notion de « chaud » réfère soit à une région, un établissement, une installation ou une unité de soins avec transmission communautaire active ou éclosion dans le milieu de soins (ou l'unité de soins). Alors que « froid » réfère à pas de transmission communautaire active ni éclosion en cours dans le milieu de soins (ou l'unité de soins).
4. L'usager rétabli est celui ayant eu la COVID-19 il y a 3 mois et moins. Si plus de 3 mois se sont écoulés depuis l'épisode de la COVID-19, ne plus le considérer comme un usager rétabli et référer aux autres situations de l'usager du tableau.
5. Il n'est pas requis d'effectuer ou de tenir compte des résultats de PCR de contrôle pour lever les mesures d'isolement chez les usagers ayant fait une maladie légère ou modérée qui rencontrent les critères cliniques ci-haut.
6. Il n'est pas requis d'effectuer ou de tenir compte des résultats de PCR de contrôle pour lever les mesures d'isolement chez les usagers ayant fait une maladie sévère qui rencontrent les critères cliniques ci-haut.
7. Pour l'immunosuppression, référer à la définition de l'INESSS disponible au https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_Immunosuppression.pdf
Il n'est pas requis d'effectuer ou de tenir compte des résultats de PCR de contrôle pour lever les mesures d'isolement après 28 jours chez les usagers qui rencontrent les critères cliniques ci-haut. Par contre, les mesures d'isolement pourraient être cessées chez un usager pour lequel on aurait obtenu 2 résultats de PCR négatifs entre le jour 21 et 28.