INSPQ INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Utilisation des immunoglobulines non spécifiques intraveineuses et sous-cutanées au Québec 2023-2024

Données par établissement

SURVEILLANCE ET VIGIE

JUILLET 2026

ANNEXE

Québec

AUTRICES ET AUTEUR

Sandie Briand, conseillère scientifique spécialisée
Direction des risques biologiques
Institut national de santé publique du Québec

Marianne Dubé, assistante de recherche professionnelle
Direction du développement des individus et des communautés
Institut national de santé publique du Québec

Pierre-Aurèle Morin, hématologue, chef du service de médecine transfusionnelle
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

SOUS LA COORDINATION DE

Anne Kimpton, chef d'unité scientifique
Direction des risques biologiques

COLLABORATION

Karl Forest-Bérard, conseiller scientifique
Secrétariat général

RÉVISION

Mélissa Perron, conseillère en soins infirmiers
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Valérie Arsenault, hématologue
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Jenny Malapi Ger, gestionnaire principale de produits stables, Héma-Québec

Les personnes qui ont révisé ce document ont été conviées à apporter des commentaires sur la version préfinale, et en conséquence, n'en ont pas révisé ni endossé le contenu final.

Les autrices, l'auteur, le collaborateur, les membres du comité scientifique ainsi les personnes qui ont révisé le document ont dûment rempli leurs déclarations d'intérêts et aucune situation à risque de conflits d'intérêts réels, apparents ou potentiels n'a été relevée.

FINANCEMENT

Ce rapport a été réalisé grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux.

MISE EN PAGE

Linda Cléroux, agente administrative
Direction des risques biologiques

REMERCIEMENTS

Nos remerciements s'adressent d'abord aux chargées et chargés de sécurité transfusionnelle qui assurent l'encadrement de l'utilisation des produits sanguins dans leur établissement. Nous remercions également les cliniciennes, cliniciens et les hématologues responsables des banques de sang qui rapportent les indications pour lesquelles les immunoglobulines sont administrées et assurent la validité des données, ainsi que les technologistes médicaux des banques de sang qui saisissent l'information dans le système informatique. Enfin, nous remercions Mme Geneviève Sarrazin, conseillère en biovigilance, au ministère de la Santé et des Services sociaux.

POUR CITER CES DONNÉES

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). 2026. Utilisation des immunoglobulines non spécifiques intraveineuses et sous-cutanées au Québec, 2023-2024 – Données par établissement. Disponible à : https://www.inspq.qc.ca/biovigilance.

Les reproductions à des fins d'étude privée ou de recherche sont autorisées en vertu de l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur. Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation du gouvernement du Québec qui détient les droits exclusifs de propriété intellectuelle sur ce document. Cette autorisation peut être obtenue en écrivant un courriel à : droits.dauteur.inspq@inspq.qc.ca.

Les données contenues dans le document peuvent être citées, à condition d'en mentionner la source.

Dépôt légal – 3e trimestre 2026
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN : 978-2-555-04822-5 (PDF)
DOI : https://doi.org/10.64490/NBLE2992

© Gouvernement du Québec (2026

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES I

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES III

CONTEXTE 1

OBJECTIFS 1

MÉTHODES 1

RÉSULTATS 1

R01 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT 2

R02 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 5

R03 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE 8

R03 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL 11

R03 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL 17

R04 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC 20

R05 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE 24

R06-1 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE L'OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 29

R06-2 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 33

R06-3 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 37

R06-4 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 40

R06-5 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 43

R06 CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) 46

R06 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINTE-JUSTINE 49

R06 CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 53

R06 INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL 59

R07 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS 62

R08 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 66

R09 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD 69

R10 CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CRSSS) DE LA BAIE JAMES 72

R11-1 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE 75

R11-2 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES ÎLES 78

R12 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 81

R13 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LAVAL 85

R14 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE 88

R15 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES 92

R16-1 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE 96

R16-2 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST ... 100

R16-3 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST 104

R17 CENTRE DE SANTÉ INUULITSIVIK 108

R17 CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK 111

R18 CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE JAMES 114

ANNEXE 117

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

ADEM	Encéphalomyélite aigüe disséminée
CH	Centre hospitalier
CHU	Centre hospitalier universitaire
CHUM	Centre hospitalier de l'Université de Montréal
CHUS	Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
CISSS	Centre intégré de santé et de services sociaux
CIUSSS	Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
CLSC	Centre local de services communautaires
CMSSS	Centre multiservices de santé et de services sociaux
CMV	Cytomégalovirus
CRSSS	Centre régional de santé et de services sociaux
CSSS	Centre de santé et de services sociaux
CUSM	Centre universitaire de santé McGill
DIP	Déficit immunitaire primaire
DIS	Déficit immunitaire secondaire
Ig	Immunoglobulines
IgIV	Immunoglobulines intraveineuses
IgM	Immunoglobulines de type M
IgSC	Immunoglobulines sous-cutanées
INSPQ	Institut national de santé publique du Québec
LED	Lupus érythémateux disséminé
MIS-A	Syndrome inflammatoire multisystémique chez l'adulte
MSSS	Ministère de la Santé et des Services sociaux
NMO	Neuromyélite optique
PANDAS	Troubles neuropsychiatriques infantiles auto-immuns associés aux infections streptococciques
PIDC	Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique
PIMS	Syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique
PTI	Purpura thrombopénique immun ou thrombopénie immune (anciennement purpura thrombopénique idiopathique ou thrombopénie immune primaire)
SC	Sous-cutanée
SNP	Syndrome neurologique paranéoplasique

CONTEXTE

Les immunoglobulines (Ig) sont des produits sanguins préparés à partir de plasma provenant d'un grand nombre de donneurs. Elles sont utilisées principalement en immunologie, en hématologie et en neurologie, mais également pour d'autres conditions cliniques, pour le traitement de maladies à médiation immunitaire ou attribuables à un mécanisme pathogénique inconnu.

OBJECTIFS

Le présent document vise à répondre au mandat que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confié à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) afin de réaliser des analyses sur l'utilisation des Ig au Québec. L'objectif spécifique est de présenter les données par établissement de santé et de services sociaux afin de mettre en lumière les pratiques transfusionnelles au sein de chacun. Ce portrait sommaire peut inciter à revoir la gestion des activités transfusionnelles par le personnel de la banque de sang et cibler des stratégies personnalisées à privilégier, le cas échéant.

MÉTHODES

Ce document présente une analyse descriptive de l'utilisation des Ig non spécifiques entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, selon les données saisies par le personnel de de chaque établissement dans le système eTrace Line en date du 28 mars 2025. Ce document inclut les données de 32 des 34 établissements au Québec. Deux établissements n'ont pas de banque de sang - Institut Philipe-Pinel de Montréal et Centre local de services communautaires (CLSC) Naskapi de la Côte-Nord - et ne se retrouvent donc pas dans les données présentées dans ce rapport. Les 32 établissements totalisent 91 installations (banques de sang) qui ont administré des Ig au cours de la période concernée.

Les méthodes d'analyse détaillées ainsi que les considérations méthodologiques peuvent être consultées dans le rapport provincial 2023-2024.

RÉSULTATS

Les données d'utilisation des immunoglobulines non spécifiques intraveineuses et sous-cutanées pour l'ensemble du Québec sont disponibles à : https://www.inspq.qc.ca/biovigilance.

Les données d'utilisation des Ig non spécifiques par établissement sont en complément du rapport provincial et sont présentées dans les sections qui suivent, par ordre de région sociosanitaire. Pour chaque établissement, les résultats concernent le profil des usagers (tableau 1), les quantités d'Ig par installation (tableau 2), les spécialités médicales et indications (tableau 3), ainsi que la quantité moyenne d'Ig administrées par usager et le coût des Ig administrées par l'établissement (encadré). Un résumé regroupant tous les établissements est disponible en annexe (tableau A-1).

R01 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CISSS du Bas-Saint-Laurent, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	1	1,0	2	2,5	3	1,7
Adultes (18 à 64 ans)	41	41,0	43	53,8	84	46,7
Aînés (≥ 65 ans)	58	58,0	35	43,8	93	51,7
0-4	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	1	1,0	-	-	1	0,6
15-19	-	-	2	2,5	2	1,1
20-24	1	1,0	2	2,5	3	1,7
25-29	2	2,0	1	1,3	3	1,7
30-34	1	1,0	3	3,8	4	2,2
35-39	1	1,0	6	7,5	7	3,9
40-44	6	6,0	1	1,3	7	3,9
45-49	6	6,0	3	3,8	9	5,0
50-54	7	7,0	4	5,0	11	6,1
55-59	8	8,0	7	8,8	15	8,3
60-64	9	9,0	16	20,0	25	13,9
65-69	13	13,0	9	11,3	22	12,2
70-74	14	14,0	7	8,8	21	11,7
75-79	17	17,0	10	12,5	27	15,0
80-84	10	10,0	7	8,8	17	9,4
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**100**	**100,0**	**80**	**100,0**	**180**	**100,0**
Âge moyen	64,8		60,8		63,1	
Écart-type	15,7		17,5		16,6	
Étendue	14,03 - 89,2		17,6 - 91,8		14,03 - 91,8	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CISSS du Bas-Saint-Laurent, 2023-2024

Installations – CISSS du Bas-Saint-Laurent	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Centre hospitalier régional du Grand-Portage	47	16 135	12	4 734	55	30,6	20 869	30,1
Hôpital d'Amqui	12	5 893	4	3 114	16	8,9	9 007	13,0
Hôpital de Matane	12	6 190	2	1 006	14	7,8	7 196	10,4
Hôpital de Notre-Dame-du-Lac	9	3 855	-	-	9	5,0	3 855	5,6
Hôpital Notre-Dame-de-Fatima	12	5 733	1	416	13	7,2	6 149	8,9
Hôpital régional de Rimouski	71	22 078	2	234	73	40,6	22 312	32,2
Total	**163**	**59 883**	**21**	**9 504**	**180**	**100,0**	**69 387**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 385,5 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CISSS du Bas-Saint-Laurent, représentant un budget de 6 114 649 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS du Bas-Saint-Laurent, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**20**	**11,1**	**2 755**	**4,0**
Cytopénies immunes	*18*	*10,0*	*2 265*	*3,3*
Thrombopénie immune (PTI)	10	5,6	1 390	2,0
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	8	4,4	755	1,1
Thrombopénie/thrombocytopénie	1	0,6	120	0,2
Allogreffe de cellules souches	1	0,6	390	0,6
Autre - hématologie non précisée	1	0,6	100	0,1
Immunologie	**84**	**46,7**	**24 204**	**34,9**
Déficiences immunitaires primaires	*38*	*21,1*	*10 988*	*15,8*
Agammaglobulinémie	1	0,6	25	0,0
Déficit immunitaire commun variable	1	0,6	50	0,1
Déficit immunitaire primaire (DIP)	38	21,1	10 913	15,7
Déficiences immunitaires secondaires	*55*	*30,6*	*13 216*	*19,0*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	55	30,6	13 181	19,0
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	1	0,6	35	0,1
Neurologie	**67**	**37,2**	**38 412**	**55,4**
Myasthénies	*25*	*13,9*	*11 053*	*15,9*
Myasthénie grave	25	13,9	11 053	15,9
Myosites	*4*	*2,2*	*710*	*1,0*
Dermatomyosite	4	2,2	660	1,0
Myopathie auto-immune nécrosante	1	0,6	50	0,1
Neuropathies	*23*	*12,8*	*22 759*	*32,8*
Neuropathie motrice multifocale	5	2,8	7 235	10,4
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	20	11,1	15 524	22,4
Maladie des anticorps anti-glycoprotéine myélinique oligodendrocytaire	1	0,6	160	0,2
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	5	2,8	600	0,9
Syndrome de la personne raide	2	1,1	370	0,5
Autre - neurologie non précisée	10	5,6	2 760	4,0
Infectiologie	**2**	**1,1**	**285**	**0,4**
Syndrome du choc toxique	2	1,1	285	0,4
Dermatologie	**1**	**0,6**	**312**	**0,4**
Dermatose auto-immune	1	0,6	312	0,4
Autres indications	**13**	**7,2**	**3 420**	**4,9**
Transplantation d'organes solides	*2*	*1,1*	*438*	*0,6*
Prévention d'un rejet de greffe	2	1,1	438	0,6
Autre - non précisé	11	6,1	2 982	4,3
Total	**180**	**100,0**	**69 387**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R02 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	2	2,2	2	1,1
Enfants (29 jours à 17 ans)	3	3,4	10	11,1	13	7,3
Adultes (18 à 64 ans)	39	44,8	38	42,2	77	43,5
Aînés (≥ 65 ans)	45	51,7	40	44,4	85	48,0
0-4	2	2,3	5	5,6	7	4,0
5-9	-	-	2	2,2	2	1,1
10-14	-	-	4	4,4	4	2,3
15-19	1	1,1	3	3,3	4	2,3
20-24	3	3,4	2	2,2	5	2,8
25-29	4	4,6	2	2,2	6	3,4
30-34	2	2,3	4	4,4	6	3,4
35-39	3	3,4	2	2,2	5	2,8
40-44	3	3,4	3	3,3	6	3,4
45-49	5	5,7	6	6,7	11	6,2
50-54	4	4,6	3	3,3	7	4,0
55-59	5	5,7	5	5,6	10	5,6
60-64	10	11,5	9	10,0	19	10,7
65-69	12	13,8	14	15,6	26	14,7
70-74	11	12,6	8	8,9	19	10,7
75-79	11	12,6	4	4,4	15	8,5
80-84	10	11,5	10	11,1	20	11,3
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**87**	**100,0**	**90**	**100,0**	**177**	**100,0**
Âge moyen	60,0		54,3		57,1	
Écart-type	19,9		24,9		22,7	
Étendue	1,31 - 89,9		0,01 - 87,7		0,01 - 89,9	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2023-2024

Installations – CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital d'Alma	34	14 610	-	-	34	19,2	14 610	22,0
Hôpital de Chicoutimi	97	30 335	-	-	97	54,8	30 335	45,7
Hôpital de Dolbeau-Mistassini	2	55	-	-	2	1,1	55	0,1
Hôpital et centre de réadaptation de Jonquière	23	16 860	-	-	23	13,0	16 860	25,4
Hôpital et centre d'hébergement de Roberval	20	4 415	1	64	21	11,9	4 479	6,8
Total	**176**	**66 275**	**1**	**64**	**177**	**100,0**	**66 339**	**100,0**

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 374,8 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, représentant un budget de 5 907 714 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**31**	**17,5**	**6 730**	**10,1**
Cytopénies immunes	*23*	*13,0*	*5 540*	*8,4*
Thrombopénie immune (PTI)	10	5,6	3 800	5,7
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	12	6,8	1 340	2,0
Thrombopénie/thrombocytopénie	4	2,3	400	0,6
Allogreffe de cellules souches	4	2,3	500	0,8
Inhibiteurs de la coagulation	1	0,6	75	0,1
Autre - hématologie non précisée	7	4,0	615	0,9
Immunologie	**51**	**28,8**	**13 689**	**20,6**
Déficiences immunitaires primaires	*17*	*9,6*	*4 379*	*6,6*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	17	9,6	4 379	6,6
Déficiences immunitaires secondaires	*19*	*10,7*	*4 860*	*7,3*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	19	10,7	4 860	7,3
Syndrome de fuite capillaire	1	0,6	270	0,4
Autre - immunologie non précisée	17	9,6	4 180	6,3
Neurologie	**89**	**50,3**	**39 870**	**60,1**
Myasthénies	*14*	*7,9*	*3 865*	*5,8*
Myasthénie grave	12	6,8	3 490	5,3
Syndrome myasthénique de Lambert-Eaton	2	1,1	375	0,6
Myosites	*10*	*5,6*	*5 625*	*8,5*
Dermatomyosite	7	4,0	5 430	8,2
Myopathie auto-immune nécrosante	2	1,1	115	0,2
Myosite inflammatoire	1	0,6	80	0,1
Neuropathies	*35*	*19,8*	*22 810*	*34,4*
Neuropathie motrice multifocale	5	2,8	1 665	2,5
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	31	17,5	21 145	31,9
Sclérose en plaques	1	0,6	120	0,2
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	16	9,0	2 080	3,1
Autre - neurologie non précisée	20	11,3	5 370	8,1
Infectiologie	**11**	**6,2**	**1 155**	**1,7**
Syndrome du choc toxique	11	6,2	1 155	1,7
Dermatologie	**8**	**4,5**	**3 455**	**5,2**
Pyoderma gangrenosum	1	0,6	150	0,2
Autre - dermatologie non précisée	8	4,5	3 305	5,0
Rhumatologie	**2**	**1,1**	**60**	**0,1**
Maladie de Kawasaki	2	1,1	60	0,1
Autres indications	**11**	**6,2**	**1 380**	**2,1**
Autre - non précisé	11	6,2	1 380	2,1
Total	**177**	**100,0**	**66 339**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R03 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CIUSSS de la Capitale-Nationale, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	-	-	-	-	-	-
Adultes (18 à 64 ans)	4	57,1	5	71,4	9	64,3
Aînés (≥ 65 ans)	3	42,9	2	28,6	5	35,7
0-4	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-
30-34	1	14,3	-	-	1	7,1
35-39	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-
55-59	1	14,3	3	42,9	4	28,6
60-64	2	28,6	2	28,6	4	28,6
65-69	1	14,3	1	14,3	2	14,3
70-74	-	-	-	-	-	-
75-79	1	14,3	1	14,3	2	14,3
80-84	1	14,3	-	-	1	7,1
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**7**	**100,0**	**7**	**100,0**	**14**	**100,0**
Âge moyen	63,9		63,3		63,6	
Écart-type	15,9		8,2		12,2	
Étendue	34,33 - 84,8		55,51 - 78,7		34,33 - 84,8	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CIUSSS de la Capitale-Nationale, 2023-2024

Installations – CIUSSS de la Capitale-Nationale	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital de Baie-Saint-Paul	7	3 355	4	2 106	11	78,6	5 461	92,5
Hôpital de La Malbaie	2	130	1	312	3	21,4	442	7,5
Total	**9**	**3 485**	**5**	**2 418**	**14**	**100,0**	**5 903**	**100,0**

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 421,6 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CIUSSS de la Capitale-Nationale, représentant un budget de 509 206 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS de la Capitale-Nationale, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**2**	**14,3**	**245**	**4,2**
Cytopénies immunes	*1*	*7,1*	*70*	*1,2*
Thrombopénie immune (PTI)	1	7,1	70	1,2
Allogreffe de cellules souches	1	7,1	175	3,0
Immunologie	**7**	**50,0**	**2 623**	**44,4**
Déficiences immunitaires primaires	*3*	*21,4*	*1 794*	*30,4*
Déficit en anticorps spécifiques	1	7,1	312	5,3
Déficit immunitaire primaire (DIP)	2	14,3	1 482	25,1
Déficiences immunitaires secondaires	*4*	*28,6*	*829*	*14,0*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	3	21,4	601	10,2
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	1	7,1	150	2,5
Hypogammaglobulinémie secondaire aux anti-lymphocytes B / immunosuppresseurs / médicaments	1	7,1	78	1,3
Neurologie	**6**	**42,9**	**3 035**	**51,4**
Myasthénies	*2*	*14,3*	*1 740*	*29,5*
Myasthénie grave	2	14,3	1 740	29,5
Neuropathies	*4*	*28,6*	*1 295*	*21,9*
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	4	28,6	1 295	21,9
Total	**14**	**100,0**	**5 903**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, le nombre total d'usagers et les nombres d'usagers par spécialité pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R03 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL

Description des usagers

Tableau 1A Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CHU de Québec – Université Laval, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	11	3,1	6	1,7	17	2,4
Enfants (29 jours à 17 ans)	43	12,1	45	12,8	88	12,4
Adultes (18 à 64 ans)	140	39,4	142	40,3	282	39,9
Aînés (≥ 65 ans)	161	45,4	159	45,2	320	45,3
0-4	28	7,9	23	6,5	51	7,2
5-9	10	2,8	10	2,8	20	2,8
10-14	10	2,8	11	3,1	21	3,0
15-19	10	2,8	10	2,8	20	2,8
20-24	7	2,0	4	1,1	11	1,6
25-29	4	1,1	11	3,1	15	2,1
30-34	6	1,7	9	2,6	15	2,1
35-39	16	4,5	19	5,4	35	5,0
40-44	17	4,8	15	4,3	32	4,5
45-49	14	3,9	17	4,8	31	4,4
50-54	14	3,9	18	5,1	32	4,5
55-59	20	5,6	19	5,4	39	5,5
60-64	38	10,7	27	7,7	65	9,2
65-69	61	17,2	52	14,8	113	16,0
70-74	29	8,2	48	13,6	77	10,9
75-79	27	7,6	31	8,8	58	8,2
80-84	31	8,7	19	5,4	50	7,1
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**355**	**100,0**	**352**	**100,0**	**707**	**100,0**
Âge moyen	53,9		53,4		53,7	
Écart-type	25,5		24,6		25,0	
Étendue	0 - 93,7		0 - 92,6		0 - 93,7	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Tableau 1B Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge pédiatrique – CHU de Québec – Université Laval, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-né (0 à 28 jours)	11	3,1	6	1,7	17	2,4
29 jours à <1 an	6	1,7	4	1,1	10	1,4
1-2	9	2,5	5	1,4	14	2,0
3-4	2	0,6	8	2,3	10	1,4
5-6	4	1,1	4	1,1	8	1,1
7-8	3	0,8	3	0,9	6	0,8
9-10	5	1,4	4	1,1	9	1,3
11-12	2	0,6	6	1,7	8	1,1
13-14	6	1,7	4	1,1	10	1,4
15-16	2	0,6	6	1,7	8	1,1
17-18	6	1,7	3	0,9	9	1,3
≥ 19	299	84,2	299	84,9	598	84,6
Total	**355**	**100,0**	**352**	**100,0**	**707**	**100,0**
Âge moyen	53,9		53,4		53,7	
Écart-type	25,5		24,6		25,0	
Étendue	0 - 93,7		0 - 92,6		0 - 93,7	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CHU de Québec – Université Laval, 2023-2024

Installations – CHU de Québec – Université Laval	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital de l'Enfant-Jésus	257	82 415	57	22 175	306	43,3	104 590	48,8
Hôpital du Saint-Sacrement	50	12 908	-	-	50	7,1	12 908	6,0
Pavillon Centre hospitalier de l'Université Laval	186	47 300	93	31 774	269	38,0	79 074	36,9
Pavillon L'Hôtel-Dieu de Québec	68	15 565	3	257	71	10,0	15 822	7,4
Pavillon Saint-François-d'Assise	10	925	1	960	11	1,6	1 885	0,9
Total	**571**	**159 113**	**154**	**55 166**	**707**	**100,0**	**214 279**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 303,1 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CHU de Québec – Université Laval, représentant un budget de 18 706 859 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CHU de Québec – Université Laval, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**145**	**20,5**	**19 490**	**9,1**
Cytopénies immunes	*113*	*16,0*	*15 928*	*7,4*
Anémie hémolytique auto-immune	1	0,1	25	0,0
Aplasie érythrocytaire associée au parvovirus B19	1	0,1	180	0,1
Aplasie érythrocytaire pure	1	0,1	350	0,2
Cytopénie immune	1	0,1	175	0,1
Maladie hémolytique du nouveau-né	7	1,0	35	0,0
Neutropénie auto-immune	1	0,1	100	0,0
Thrombopénie allo-immune foetale/néonatale	5	0,7	2 050	1,0
Thrombopénie immune (PTI)	5	0,7	290	0,1
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	95	13,4	9 863	4,6
Thrombopénie immune (PTI) chronique	5	0,7	1 080	0,5
Thrombopénie immune (PTI) grossesse	2	0,3	1 680	0,8
Thrombopénie/thrombocytopénie	2	0,3	100	0,0
Allogreffe de cellules souches	23	3,3	1 832	0,9
Hémophilie acquise	5	0,7	930	0,4
Inhibiteurs de la coagulation	2	0,3	515	0,2
Autre - hématologie non précisée	3	0,4	285	0,1
Immunologie	**323**	**45,7**	**90 500**	**42,2**
Déficiences immunitaires primaires	*144*	*20,4*	*50 188*	*23,4*
Agammaglobulinémie	1	0,1	160	0,1
Déficit immunitaire affectant l'immunité cellulaire et humorale	2	0,3	182	0,1
Déficit immunitaire commun variable	29	4,1	2 691	1,3
Déficit immunitaire primaire (DIP)	137	19,4	46 355	21,6
Déficit isolé en IgG primaire	1	0,1	50	0,0
Hypogammaglobulinémie transitoire (enfant)	1	0,1	5	0,0
Maladies de la dysrégulation immunitaire	5	0,7	615	0,3
Syndrome d'hyper-IgM	2	0,3	131	0,1
Déficiences immunitaires secondaires	*186*	*26,3*	*39 357*	*18,4*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	159	22,5	31 285	14,6
Hypogammaglobulinémie secondaire à chylothorax, entéropathie exsudative ou autres	1	0,1	10	0,0
Hypogammaglobulinémie secondaire à plasmaphérèse	1	0,1	50	0,0
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	57	8,1	5 949	2,8
Hypogammaglobulinémie secondaire aux anti-lymphocytes B / immunosuppresseurs / médicaments	21	3,0	2 018	0,9
Hypogammaglobulinémie secondaire aux CAR-T	2	0,3	45	0,0
Autre - immunologie non précisée	7	1,0	955	0,4

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CHU de Québec – Université Laval, 2023-2024 (suite)

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Neurologie	**185**	**26,2**	**91 705**	**42,8**
Encéphalites	*22*	*3,1*	*6 710*	*3,1*
Encéphalite auto-immune	15	2,1	4 415	2,1
Encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM)	10	1,4	2 295	1,1
Myasthénies	*48*	*6,8*	*18 213*	*8,5*
Myasthénie grave	47	6,6	18 143	8,5
Syndrome myasthénique de Lambert-Eaton	1	0,1	70	0,0
Myélites	*1*	*0,1*	*180*	*0,1*
Myélite transverse	1	0,1	180	0,1
Myosites	*13*	*1,8*	*7 745*	*3,6*
Dermatomyosite	7	1,0	5 245	2,4
Myopathie auto-immune nécrosante	4	0,6	950	0,4
Myosite inflammatoire	1	0,1	750	0,3
Polymyosite	2	0,3	800	0,4
Neuropathies	*60*	*8,5*	*48 865*	*22,8*
Neuropathie motrice multifocale	16	2,3	11 505	5,4
Neuropathie paranéoplasique	2	0,3	500	0,2
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	44	6,2	36 860	17,2
Maladie des anticorps anti-glycoprotéine myélinique oligodendrocytaire	8	1,1	2 675	1,2
Sclérose en plaques	1	0,1	75	0,0
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	22	3,1	2 625	1,2
Syndrome de la personne raide	2	0,3	600	0,3
Syndrome opsomyoclonique	1	0,1	15	0,0
Autre - neurologie non précisée	19	2,7	4 002	1,9
Infectiologie	**25**	**3,5**	**1 840**	**0,9**
Cardiomyopathie virale	1	0,1	10	0,0
Sepsis néonatal à entérovirus	1	0,1	3	0,0
Syndrome du choc toxique	23	3,3	1 828	0,9
Dermatologie	**9**	**1,3**	**3 105**	**1,4**
Dermatose auto-immune	2	0,3	1 140	0,5
Pemphigoïdes	2	0,3	670	0,3
Scléroedème	1	0,1	50	0,0
Scléromyxœdème	1	0,1	540	0,3
Urticaire	3	0,4	645	0,3
Autre - dermatologie non précisée	1	0,1	60	0,0
Rhumatologie	**16**	**2,3**	**2 090**	**1,0**
Fasciite éosinophilique	1	0,1	1 020	0,5
Lupus érythémateux disséminé (LED)	1	0,1	590	0,3
Maladie de Kawasaki	12	1,7	310	0,1
Sclérodermie	1	0,1	100	0,0
Syndrome de Sjögren	1	0,1	70	0,0

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CHU de Québec – Université Laval, 2023-2024 (suite)

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Autres indications	**32**	**4,5**	**5 725**	**2,7**
Transplantation d'organes solides	*11*	*1,6*	*1 975*	*0,9*
Prévention d'un rejet de greffe	4	0,6	455	0,2
Traitement d'un rejet de greffe	6	0,8	1 215	0,6
Traitement d'une infection	3	0,4	305	0,1
Cardiologie	*4*	*0,6*	*55*	*0,0*
Myocardite	4	0,6	55	0,0
Obstétrique/Fertilité	*14*	*2,0*	*1 745*	*0,8*
Allo-immunisation maternelle	1	0,1	5	0,0
Avortements spontanés à répétition	5	0,7	585	0,3
Échec d'implantation	8	1,1	615	0,3
Hémochromatose néonatale	1	0,1	540	0,3
Autre - non précisé	3	0,4	1 950	0,9
Total	**707**	**100,0**	**214 454**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R03 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	-	-	-	-	-	-
Adultes (18 à 64 ans)	9	40,9	11	68,8	20	52,6
Aînés (≥ 65 ans)	13	59,1	5	31,3	18	47,4
0-4	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-
25-29	1	4,5	2	12,5	3	7,9
30-34	1	4,5	-	-	1	2,6
35-39	2	9,1	-	-	2	5,3
40-44	1	4,5	1	6,3	2	5,3
45-49	1	4,5	1	6,3	2	5,3
50-54	-	-	1	6,3	1	2,6
55-59	2	9,1	4	25,0	6	15,8
60-64	1	4,5	2	12,5	3	7,9
65-69	6	27,3	1	6,3	7	18,4
70-74	1	4,5	1	6,3	2	5,3
75-79	5	22,7	2	12,5	7	18,4
80-84	1	4,5	1	6,3	2	5,3
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**22**	**100,0**	**16**	**100,0**	**38**	**100,0**
Âge moyen	61,7		58,6		60,4	
Écart-type	16,6		16,4		16,4	
Étendue	29,92 - 81		26,97 - 84,1		26,97 - 84,1	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2023-2024

Installation – Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval	36	7 455	2	16	38	100,0	7 471	100,0
Total	**36**	**7 455**	**2**	**16**	**38**	**100,0**	**7 471**	**100,0**

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 196,6 grammes d'Ig par usager ont été administrés à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, représentant un budget de 665 258 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**5**	**13,2**	**705**	**9,4**
Cytopénies immunes	*4*	*10,5*	*675*	*9,0*
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	4	10,5	675	9,0
Allogreffe de cellules souches	1	2,6	30	0,4
Immunologie	**6**	**15,8**	**491**	**6,6**
Déficiences immunitaires primaires	*1*	*2,6*	*8*	*0,1*
Déficit immunitaire affectant l'immunité cellulaire et humorale	1	2,6	8	0,1
Déficiences immunitaires secondaires	*4*	*10,5*	*458*	*6,1*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	2	5,3	220	2,9
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	1	2,6	30	0,4
Hypogammaglobulinémie secondaire aux anti-lymphocytes B / immunosuppresseurs / médicaments	2	5,3	208	2,8
Autre - immunologie non précisée	1	2,6	25	0,3
Neurologie	**9**	**23,7**	**3 400**	**45,5**
Myasthénies	*4*	*10,5*	*2 765*	*37,0*
Myasthénie grave	3	7,9	305	4,1
Syndrome myasthénique de Lambert-Eaton	1	2,6	2 460	32,9
Myélites	*1*	*2,6*	*110*	*1,5*
Myélite transverse	1	2,6	110	1,5
Neuropathies	*2*	*5,3*	*335*	*4,5*
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	2	5,3	335	4,5
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	2	5,3	190	2,5
Infectiologie	**9**	**23,7**	**1 605**	**21,5**
Cardiomyopathie virale	5	13,2	1 305	17,5
Syndrome du choc toxique	3	7,9	220	2,9
Autre - infectiologie non précisée	1	2,6	80	1,1
Autres indications	**9**	**23,7**	**1 270**	**17,0**
Cardiologie	*8*	*21,1*	*1 125*	*15,1*
Myocardite	8	21,1	1 125	15,1
Autre - non précisé	1	2,6	145	1,9
Total	**38**	**100,0**	**7 471**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, le nombre total d'usagers et les nombres d'usagers par spécialité pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R04 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	1	0,7	1	0,4
Enfants (29 jours à 17 ans)	13	9,0	10	7,4	23	8,2
Adultes (18 à 64 ans)	71	49,3	62	45,6	133	47,5
Aînés (≥ 65 ans)	60	41,7	63	46,3	123	43,9
0-4	3	2,1	2	1,5	5	1,8
5-9	2	1,4	3	2,2	5	1,8
10-14	6	4,2	4	2,9	10	3,6
15-19	4	2,8	2	1,5	6	2,1
20-24	2	1,4	3	2,2	5	1,8
25-29	6	4,2	7	5,1	13	4,6
30-34	8	5,6	6	4,4	14	5,0
35-39	14	9,7	6	4,4	20	7,1
40-44	4	2,8	12	8,8	16	5,7
45-49	9	6,3	4	2,9	13	4,6
50-54	7	4,9	5	3,7	12	4,3
55-59	8	5,6	5	3,7	13	4,6
60-64	11	7,6	14	10,3	25	8,9
65-69	18	12,5	16	11,8	34	12,1
70-74	15	10,4	18	13,2	33	11,8
75-79	12	8,3	21	15,4	33	11,8
80-84	9	6,3	4	2,9	13	4,6
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**144**	**100,0**	**136**	**100,0**	**280**	**100,0**
Âge moyen	54,1		56,1		55,1	
Écart-type	22,4		21,6		22,0	
Étendue	1,63 - 93,8		0 - 89,7		0 - 93,8	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, 2023-2024

Installations – CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Centre hospitalier affilié universitaire régional (Pavillon Sainte-Marie)	124	35 573	2	288	126	45,0	35 861	36,9
Centre multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS) Avellin-Dalcourt	3	440	-	-	3	1,1	440	0,5
CMSSS Christ-Roi	8	3 745	-	-	8	2,9	3 745	3,9
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Haut-Saint-Maurice	5	2 190	1	416	6	2,1	2 606	2,7
Hôpital du Centre-de-la-Mauricie	34	14 685	5	1 876	39	13,9	16 561	17,0
Hôpital Sainte-Croix	42	13 928	18	7 234	57	20,4	21 162	21,8
Hôtel-Dieu d'Arthabaska	34	13 370	9	3 388	41	14,6	16 758	17,3
Total	**250**	**83 930**	**35**	**13 202**	**280**	**100,0**	**97 132**	**100,0**

Note : Un usager pourrait avoir reçu des Ig par les deux voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 346,9 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, représentant un budget de 8 560 406 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**40**	**14,3**	**6 866**	**7,1**
Cytopénies immunes	*34*	*12,1*	*5 935*	*6,1*
Anémie hémolytique auto-immune	1	0,4	320	0,3
Thrombopénie immune (PTI)	1	0,4	280	0,3
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	30	10,7	5 030	5,2
Thrombopénie immune (PTI) chronique	1	0,4	25	0,0
Thrombopénie/thrombocytopénie	4	1,4	280	0,3
Allogreffe de cellules souches	2	0,7	325	0,3
Autre - hématologie non précisée	4	1,4	606	0,6
Immunologie	**84**	**30,0**	**23 625**	**24,3**
Déficiences immunitaires primaires	*42*	*15,0*	*13 731*	*14,1*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	42	15,0	13 731	14,1
Déficiences immunitaires secondaires	*37*	*13,2*	*8 940*	*9,2*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	37	13,2	8 850	9,1
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	1	0,4	90	0,1
Autre - immunologie non précisée	8	2,9	954	1,0
Neurologie	**133**	**47,5**	**60 989**	**62,8**
Encéphalites	*5*	*1,8*	*845*	*0,9*
Encéphalite auto-immune	5	1,8	845	0,9
Myasthénies	*24*	*8,6*	*10 688*	*11,0*
Myasthénie grave	23	8,2	10 283	10,6
Syndrome myasthénique de Lambert-Eaton	1	0,4	405	0,4
Myosites	*19*	*6,8*	*8 561*	*8,8*
Dermatomyosite	7	2,5	2 515	2,6
Myopathie auto-immune nécrosante	4	1,4	2 856	2,9
Myosite à corps d'inclusion	1	0,4	160	0,2
Myosite inflammatoire	9	3,2	3 030	3,1
Neuropathies	*64*	*22,9*	*34 745*	*35,8*
Neuropathie motrice multifocale	12	4,3	6 606	6,8
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	53	18,9	28 139	29,0

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, 2023-2024 (suite)

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Neurologie (suite)				
Amyotrophie diabétique	1	0,4	40	0,0
Maladie cérébrale inflammatoire	1	0,4	180	0,2
Maladie des anticorps anti-glycoprotéine myélinique oligodendrocytaire	1	0,4	60	0,1
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	15	5,4	1 610	1,7
Syndrome de la personne raide	1	0,4	2 015	2,1
Syndrome d'obésité infantile d'installation rapide-dysfonctionnement hypothalamique-hypoventilation-dysautonomie	1	0,4	720	0,7
Syndrome opsomyoclonique	2	0,7	125	0,1
Autre - neurologie non précisée	6	2,1	1 400	1,4
Infectiologie	**22**	**7,9**	**2 105**	**2,2**
Syndrome du choc toxique	20	7,1	1 955	2,0
Autre - infectiologie non précisée	2	0,7	150	0,2
Dermatologie	**1**	**0,4**	**1 110**	**1,1**
Scléroedème	1	0,4	1 110	1,1
Rhumatologie	**7**	**2,5**	**2 278**	**2,3**
Maladie de Kawasaki	5	1,8	178	0,2
Syndrome de Sjögren	2	0,7	2 100	2,2
Autres indications	**1**	**0,4**	**160**	**0,2**
Obstétrique/Fertilité	*1*	*0,4*	*160*	*0,2*
Échec d'implantation	1	0,4	160	0,2
Total	**280**	**100,0**	**97 132**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, le nombre total d'usagers et les nombres d'usagers par spécialité pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R05 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE

Description des usagers

Tableau 1A Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CIUSSS de l'Estrie – CHU de Sherbrooke, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	1	0,4	1	0,2
Enfants (29 jours à 17 ans)	30	12,2	23	9,6	53	10,9
Adultes (18 à 64 ans)	81	32,9	108	45,2	189	39,0
Aînés (≥ 65 ans)	135	54,9	107	44,8	242	49,9
0-4	6	2,4	5	2,1	11	2,3
5-9	5	2,0	8	3,3	13	2,7
10-14	10	4,1	4	1,7	14	2,9
15-19	9	3,7	11	4,6	20	4,1
20-24	3	1,2	6	2,5	9	1,9
25-29	3	1,2	4	1,7	7	1,4
30-34	3	1,2	8	3,3	11	2,3
35-39	4	1,6	13	5,4	17	3,5
40-44	5	2,0	8	3,3	13	2,7
45-49	3	1,2	13	5,4	16	3,3
50-54	14	5,7	10	4,2	24	4,9
55-59	18	7,3	14	5,9	32	6,6
60-64	28	11,4	28	11,7	56	11,5
65-69	26	10,6	30	12,6	56	11,5
70-74	43	17,5	29	12,1	72	14,8
75-79	41	16,7	25	10,5	66	13,6
80-84	18	7,3	16	6,7	34	7,0
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**246**	**100,0**	**239**	**100,0**	**485**	**100,0**
Âge moyen	60,0		55,9		58,0	
Écart-type	22,5		22,6		22,7	
Étendue	1,93 - 94,3		0 - 98,6		0 - 98,6	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Tableau 1B Usagers ayant reçu des immunoglobulines selon le sexe et l'âge pédiatrique – CIUSSS de l'Estrie – CHU de Sherbrooke, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-né (0 à 28 jours)	0	0,0	1	0,4	1	0,2
29 jours à <1 an	0	0,0	1	0,4	1	0,2
1-2	3	1,2	0	0,0	3	0,6
3-4	3	1,2	3	1,3	6	1,2
5-6	4	1,6	5	2,1	9	1,9
7-8	1	0,4	3	1,3	4	0,8
9-10	4	1,6	0	0,0	4	0,8
11-12	3	1,2	1	0,4	4	0,8
13-14	3	1,2	3	1,3	6	1,2
15-16	8	3,3	5	2,1	13	2,7
17-18	1	0,4	3	1,3	4	0,8
≥ 19	216	87,8	214	89,5	430	88,7
Total	**246**	**100,0**	**239**	**100,0**	**485**	**100,0**
Âge moyen	60,0		55,9		58,0	
Écart-type	22,5		22,6		22,7	
Étendue	1,93 - 94,3		0 - 98,6		0 - 98,6	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CIUSSS de l'Estrie – CHU de Sherbrooke, 2023-2024

Installations – CIUSSS de l'Estrie–Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) - Hôpital Fleurimont	247	66 523	82	33 712	323	66,6	100 235	61,3
CSSS de Memphrémagog	19	4 380	6	1 532	25	5,2	5 912	3,6
CSSS du Granit	6	1 565	4	1 554	10	2,1	3 119	1,9
Hôpital Brôme-Missisquoi-Perkins	41	18 020	9	2 436	50	10,3	20 456	12,5
Hôpital de Granby	60	26 310	19	7 518	77	15,9	33 828	20,7
Total	**373**	**116 798**	**120**	**46 752**	**485**	**100,0**	**163 550**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 337,2 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CIUSSS de l'Estrie–Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, représentant un budget de 14 246 438 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS de l'Estrie – CHU de Sherbrooke, 2023-2024

Indication	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**76**	**15,7**	**15 044**	**9,2**
Cytopénies immunes	*67*	*13,8*	*12 249*	*7,5*
Syndrome hyperhémolytique	1	0,2	25	0,0
Thrombopénie allo-immune foetale/néonatale	3	0,6	733	0,4
Thrombopénie immune (PTI)	2	0,4	125	0,1
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	55	11,3	9 281	5,7
Thrombopénie immune (PTI) chronique	6	1,2	1 865	1,1
Thrombopénie induite par l'héparine	1	0,2	90	0,1
Thrombopénie/thrombocytopénie	1	0,2	130	0,1
Allogreffe de cellules souches	7	1,4	1 285	0,8
Inhibiteurs de la coagulation	1	0,2	370	0,2
Autre - hématologie non précisée	1	0,2	1 140	0,7
Immunologie	**211**	**43,5**	**64 048**	**39,2**
Déficiences immunitaires primaires	*99*	*20,4*	*34 243*	*20,9*
Déficit en anticorps spécifiques	1	0,2	60	0,0
Déficit immunitaire affectant l'immunité cellulaire et humorale	1	0,2	315	0,2
Déficit immunitaire combiné avec caractéristiques associées ou syndromiques	1	0,2	96	0,1
Déficit immunitaire commun variable	29	6,0	7 305	4,5
Déficit immunitaire primaire (DIP)	81	16,7	25 439	15,6
Déficit isolé en IgA confirmé	1	0,2	45	0,0
Déficit isolé en IgG primaire	2	0,4	177	0,1
Maladies de la dysrégulation immunitaire	1	0,2	27	0,0
Syndrome d'hyper-IgM	2	0,4	635	0,4
Syndrome lymphoprolifératif auto-immun	1	0,2	144	0,1
Déficiences immunitaires secondaires	*113*	*23,3*	*28 503*	*17,4*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	68	14,0	18 434	11,3
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	46	9,5	8 855	5,4
Hypogammaglobulinémie secondaire aux anti-lymphocytes B / immunosuppresseurs / médicaments	5	1,0	830	0,5
Hypogammaglobulinémie secondaire aux CAR-T	1	0,2	384	0,2
Déficience en Ig non précisée	1	0,2	96	0,1
Syndrome de Good	1	0,2	144	0,1
Autre - immunologie non précisée	2	0,4	1 062	0,6
Neurologie	**151**	**31,1**	**69 769**	**42,7**
Encéphalites	*13*	*2,7*	*2 647*	*1,6*
Encéphalite	1	0,2	490	0,3
Encéphalite auto-immune	9	1,9	1 845	1,1
Encéphalite de Rasmussen	1	0,2	165	0,1
Encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM)	2	0,4	147	0,1

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS de l'Estrie – CHU de Sherbrooke, 2023-2024 (suite)

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Neurologie (suite)				
Myasthénies	*27*	*5,6*	*10 776*	*6,6*
Myasthénie grave	27	5,6	10 776	6,6
Myélites	*1*	*0,2*	*150*	*0,1*
Neuromyélite optique (NMO)	1	0,2	150	0,1
Myosites	*26*	*5,4*	*20 167*	*12,3*
Dermatomyosite	7	1,4	6 736	4,1
Myopathie auto-immune nécrosante	13	2,7	8 855	5,4
Myosite inflammatoire	6	1,2	4 576	2,8
Neuropathies	*62*	*12,8*	*32 124*	*19,6*
Neuropathie motrice multifocale	5	1,0	5 420	3,3
Neuropathie paraprotéinémique	1	0,2	96	0,1
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	56	11,5	26 608	16,3
Maladie des anticorps anti-glycoprotéine myélinique oligodendrocytaire	1	0,2	325	0,2
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	24	4,9	3 455	2,1
Infectiologie	**14**	**2,9**	**1 038**	**0,6**
Entérocolite à *Clostridioides difficile*	1	0,2	20	0,0
Rougeole – post exposition	1	0,2	30	0,0
Syndrome du choc toxique	11	2,3	888	0,5
Syndrome inflammatoire multisystémique associé à la COVID chez l'enfant	1	0,2	100	0,1
Dermatologie	**10**	**2,1**	**6 475**	**4,0**
Pemphigoïdes	7	1,4	5 135	3,1
Pyoderma gangrenosum	1	0,2	320	0,2
Autre - dermatologie non précisée	2	0,4	1 020	0,6
Rhumatologie	**19**	**3,9**	**6 701**	**4,1**
Fasciite éosinophilique	1	0,2	1 620	1,0
Maladie de Kawasaki	7	1,4	326	0,2
Sclérodermie	4	0,8	2 495	1,5
Syndrome de chevauchement	4	0,8	905	0,6
Syndrome de Sjögren	1	0,2	615	0,4
Vasculite	1	0,2	220	0,1
Autre - rhumatologie non précisée	1	0,2	520	0,3
Autres indications	**6**	**1,2**	**475**	**0,3**
Transplantation d'organes solides	*4*	*0,8*	*260*	*0,2*
Traitement d'un rejet de greffe	3	0,6	190	0,1
Traitement d'une infection	1	0,2	70	0,0
Autre - non précisé	2	0,4	215	0,1
Total	**485**	**100,0**	**163 550**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R06-1 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE L'OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	-	-	-	-	-	-
Adultes (18 à 64 ans)	43	41,3	39	41,9	82	41,6
Aînés (≥ 65 ans)	61	58,7	54	58,1	115	58,4
0-4	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-
20-24	1	1,0	3	3,2	4	2,0
25-29	1	1,0	4	4,3	5	2,5
30-34	1	1,0	5	5,4	6	3,0
35-39	1	1,0	6	6,5	7	3,6
40-44	4	3,8	4	4,3	8	4,1
45-49	6	5,8	1	1,1	7	3,6
50-54	6	5,8	2	2,2	8	4,1
55-59	10	9,6	4	4,3	14	7,1
60-64	13	12,5	10	10,8	23	11,7
65-69	14	13,5	8	8,6	22	11,2
70-74	14	13,5	18	19,4	32	16,2
75-79	14	13,5	15	16,1	29	14,7
80-84	10	9,6	6	6,5	16	8,1
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**104**	**100,0**	**93**	**100,0**	**197**	**100,0**
Âge moyen	66,7		63,3		65,1	
Écart-type	14,4		18,9		16,7	
Étendue	21,24 - 93,7		21,95 - 93,5		21,24 - 93,7	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Installations – CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Centre hospitalier de St. Mary	89	21 940	-	-	89	45,2	21 940	50,1
Hôpital de LaSalle	10	2 405	-	-	10	5,1	2 405	5,5
Hôpital général du Lakeshore	56	8 405	42	11 036	98	49,7	19 441	44,4
Total	**155**	**32 750**	**42**	**11 036**	**197**	**100,0**	**43 786**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 222,3 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, représentant un budget de 3 824 205 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**51**	**25,9**	**7 705**	**17,6**
Cytopénies immunes	*30*	*15,2*	*5 150*	*11,8*
Anémie hémolytique auto-immune	1	0,5	200	0,5
Thrombopénie immune (PTI)	8	4,1	1 360	3,1
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	12	6,1	2 245	5,1
Thrombopénie immune (PTI) grossesse	1	0,5	80	0,2
Thrombopénie/thrombocytopénie	13	6,6	1 265	2,9
Anémie	2	1,0	290	0,7
Inhibiteurs de la coagulation	1	0,5	50	0,1
Autre - hématologie non précisée	23	11,7	2 215	5,1
Immunologie	**90**	**45,7**	**15 935**	**36,4**
Déficiences immunitaires primaires	*20*	*10,2*	*3 749*	*8,6*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	20	10,2	3 749	8,6
Déficiences immunitaires secondaires	*46*	*23,4*	*9 646*	*22,0*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	37	18,8	8 491	19,4
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	9	4,6	1 155	2,6
Déficience en Ig non précisée	6	3,0	400	0,9
Autre - immunologie non précisée	25	12,7	2 140	4,9
Neurologie	**62**	**31,5**	**13 565**	**31,0**
Myasthénies	*18*	*9,1*	*4 250*	*9,7*
Myasthénie grave	18	9,1	4 250	9,7
Myosites	*15*	*7,6*	*2 215*	*5,1*
Dermatomyosite	9	4,6	1 360	3,1
Myosite à corps d'inclusion	3	1,5	135	0,3
Myosite inflammatoire	6	3,0	375	0,9
Polymyosite	5	2,5	345	0,8
Neuropathies	*21*	*10,7*	*4 985*	*11,4*
Neuropathie motrice multifocale	3	1,5	430	1,0
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	18	9,1	4 555	10,4
Démyélinisation	1	0,5	130	0,3
Sclérose en plaques	1	0,5	45	0,1
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	4	2,0	580	1,3
Syndrome de la personne raide	1	0,5	240	0,5
Autre - neurologie non précisée	14	7,1	1 120	2,6
Infectiologie	**16**	**8,1**	**1 285**	**2,9**
Prophylaxie infectieuse	3	1,5	100	0,2
Syndrome du choc toxique	3	1,5	295	0,7
Autre - infectiologie non précisée	11	5,6	890	2,0

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024 (suite)

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Dermatologie	**4**	**2,0**	**170**	**0,4**
Dermatose auto-immune	1	0,5	25	0,1
Pemphigoïdes	1	0,5	45	0,1
Autre - dermatologie non précisée	2	1,0	100	0,2
Autres indications	**51**	**25,9**	**5 126**	**11,7**
Transplantation d'organes solides	*2*	*1,0*	*50*	*0,1*
Prévention d'un rejet de greffe	2	1,0	50	0,1
Autre - non *précisé*	49	24,9	5 076	11,6
Total	**197**	**100,0**	**43 786**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R06-2 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	1	1,1	-	-	1	0,5
Enfants (29 jours à 17 ans)	-	-	1	0,8	1	0,5
Adultes (18 à 64 ans)	39	44,3	66	52,8	105	49,3
Aînés (≥ 65 ans)	48	54,5	58	46,4	106	49,8
0-4	1	1,1	1	0,8	2	0,9
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	1	1,1	2	1,6	3	1,4
20-24	5	5,7	2	1,6	7	3,3
25-29	1	1,1	5	4,0	6	2,8
30-34	1	1,1	5	4,0	6	2,8
35-39	4	4,5	7	5,6	11	5,2
40-44	4	4,5	3	2,4	7	3,3
45-49	1	1,1	8	6,4	9	4,2
50-54	7	8,0	4	3,2	11	5,2
55-59	7	8,0	13	10,4	20	9,4
60-64	8	9,1	17	13,6	25	11,7
65-69	10	11,4	14	11,2	24	11,3
70-74	15	17,0	14	11,2	29	13,6
75-79	9	10,2	12	9,6	21	9,9
80-84	7	8,0	11	8,8	18	8,5
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**88**	**100,0**	**125**	**100,0**	**213**	**100,0**
Âge moyen	62,5		60,7		61,5	
Écart-type	19,5		18,5		18,9	
Étendue	0,01 - 91		0,08 - 94,8		0,01 - 94,8	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Installation – CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital général juif	205	74 340	9	2 338	213	100,0	76 678	100,0
Total	**205**	**74 340**	**9**	**2 338**	**213**	**100,0**	**76 678**	**100,0**

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 360,0 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, représentant un budget de 6 812 974 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**36**	**16,9**	**5 520**	**7,2**
Cytopénies immunes	*32*	*15,0*	*5 170*	*6,7*
Anémie hémolytique auto-immune	2	0,9	270	0,4
Cytopénie immune	1	0,5	40	0,1
Thrombopénie allo-immune foetale/néonatale	1	0,5	5	0,0
Thrombopénie immune (PTI)	3	1,4	310	0,4
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	25	11,7	4 040	5,3
Thrombopénie/thrombocytopénie	5	2,3	505	0,7
Allogreffe de cellules souches	1	0,5	125	0,2
Autre - hématologie non précisée	3	1,4	225	0,3
Immunologie	**99**	**46,5**	**28 477**	**37,1**
Déficiences immunitaires primaires	*22*	*10,3*	*6 744*	*8,8*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	22	10,3	6 744	8,8
Déficiences immunitaires secondaires	*72*	*33,8*	*18 568*	*24,2*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	72	33,8	18 418	24,0
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	4	1,9	150	0,2
Autre - immunologie non précisée	10	4,7	3 165	4,1
Neurologie	**76**	**35,7**	**38 670**	**50,4**
Encéphalites	*2*	*0,9*	*200*	*0,3*
Encéphalite auto-immune	1	0,5	40	0,1
Encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM)	1	0,5	160	0,2
Myasthénies	*19*	*8,9*	*7 585*	*9,9*
Myasthénie grave	19	8,9	7 585	9,9
Myosites	*30*	*14,1*	*18 390*	*24,0*
Dermatomyosite	17	8,0	9 800	12,8
Myopathie auto-immune nécrosante	2	0,9	230	0,3
Polymyosite	14	6,6	8 360	10,9
Neuropathies	*13*	*6,1*	*9 705*	*12,7*
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	13	6,1	9 705	12,7
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	11	5,2	1 205	1,6
Autre - neurologie non précisée	7	3,3	1 585	2,1
Infectiologie	**3**	**1,4**	**280**	**0,4**
Entérocolite à *Clostridioides difficile*	1	0,5	25	0,0
Syndrome du choc toxique	2	0,9	255	0,3

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024 (suite)

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Dermatologie	**11**	**5,2**	**3 265**	**4,3**
Pemphigoïdes	3	1,4	585	0,8
Pemphigus	3	1,4	1 360	1,8
Scléroedème	1	0,5	100	0,1
Autre - dermatologie non précisée	5	2,3	1 220	1,6
Rhumatologie	**3**	**1,4**	**310**	**0,4**
Lupus érythémateux disséminé (LED)	2	0,9	190	0,2
Sclérodermie	1	0,5	120	0,2
Autres indications	**2**	**0,9**	**156**	**0,2**
Autre - non précisé	2	0,9	156	0,2
Total	**213**	**100,0**	**76 678**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R06-3 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	-	-	-	-	-	-
Adultes (18 à 64 ans)	27	64,3	28	62,2	55	63,2
Aînés (≥ 65 ans)	15	35,7	17	37,8	32	36,8
0-4	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-
20-24	3	7,1	2	4,4	5	5,7
25-29	3	7,1	1	2,2	4	4,6
30-34	4	9,5	5	11,1	9	10,3
35-39	5	11,9	2	4,4	7	8,0
40-44	1	2,4	2	4,4	3	3,4
45-49	2	4,8	1	2,2	3	3,4
50-54	2	4,8	4	8,9	6	6,9
55-59	5	11,9	5	11,1	10	11,5
60-64	2	4,8	6	13,3	8	9,2
65-69	5	11,9	3	6,7	8	9,2
70-74	4	9,5	6	13,3	10	11,5
75-79	3	7,1	2	4,4	5	5,7
80-84	-	-	5	11,1	5	5,7
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**42**	**100,0**	**45**	**100,0**	**87**	**100,0**
Âge moyen	54,1		58,0		56,1	
Écart-type	20,1		18,4		19,2	
Étendue	21,88 - 99,1		22,04 - 86,5		21,88 - 99,1	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Installations – CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital de Verdun	31	7 685	9	2 930	39	44,8	10 615	38,2
Hôpital Notre-Dame	23	8 230	25	8 919	48	55,2	17 149	61,8
Total	**54**	**15 915**	**34**	**11 849**	**87**	**100,0**	**27 764**	**100,0**

Note : Un usager pourrait avoir reçu des Ig par les deux voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 319,1 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, représentant un budget de 2 391 733 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**8**	**9,2**	**790**	**2,8**
Cytopénies immunes	*6*	*6,9*	*715*	*2,6*
Anémie hémolytique auto-immune	1	1,1	160	0,6
Thrombopénie immune (PTI)	3	3,4	460	1,7
Thrombopénie/thrombocytopénie	2	2,3	95	0,3
Autre - hématologie non précisée	2	2,3	75	0,3
Immunologie	**55**	**63,2**	**13 239**	**47,7**
Déficiences immunitaires primaires	*45*	*51,7*	*10 827*	*39,0*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	45	51,7	10 827	39,0
Déficiences immunitaires secondaires	*12*	*13,8*	*2 042*	*7,4*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	12	13,8	2 042	7,4
Autre - immunologie non précisée	6	6,9	370	1,3
Neurologie	**29**	**33,3**	**8 724**	**31,4**
Myasthénies	*2*	*2,3*	*255*	*0,9*
Myasthénie grave	2	2,3	255	0,9
Myosites	*2*	*2,3*	*915*	*3,3*
Dermatomyosite	2	2,3	915	3,3
Neuropathies	*16*	*18,4*	*5 529*	*19,9*
Neuropathie motrice multifocale	2	2,3	240	0,9
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	15	17,2	5 289	19,0
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	7	8,0	1 410	5,1
Autre - neurologie non précisée	6	6,9	615	2,2
Infectiologie	**1**	**1,1**	**40**	**0,1**
Syndrome du choc toxique	1	1,1	40	0,1
Rhumatologie	**1**	**1,1**	**45**	**0,2**
Fasciite éosinophilique	1	1,1	45	0,2
Autres indications	**35**	**40,2**	**4 926**	**17,7**
Autre - non précisé	35	40,2	4 926	17,7
Total	**87**	**100,0**	**27 764**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R06-4 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	-	-	-	-	-	-
Adultes (18 à 64 ans)	57	47,9	47	46,5	104	47,3
Aînés (≥ 65 ans)	62	52,1	54	53,5	116	52,7
0-4	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	2	1,7	-	-	2	0,9
20-24	3	2,5	2	2,0	5	2,3
25-29	3	2,5	2	2,0	5	2,3
30-34	2	1,7	5	5,0	7	3,2
35-39	9	7,6	5	5,0	14	6,4
40-44	7	5,9	4	4,0	11	5,0
45-49	6	5,0	5	5,0	11	5,0
50-54	4	3,4	7	6,9	11	5,0
55-59	12	10,1	12	11,9	24	10,9
60-64	9	7,6	5	5,0	14	6,4
65-69	16	13,4	7	6,9	23	10,5
70-74	17	14,3	13	12,9	30	13,6
75-79	14	11,8	19	18,8	33	15,0
80-84	9	7,6	7	6,9	16	7,3
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**119**	**100,0**	**101**	**100,0**	**220**	**100,0**
Âge moyen	61,5		63,2		62,3	
Écart-type	17,6		17,7		17,6	
Étendue	18,19 - 88,1		20,88 - 91,4		18,19 - 91,4	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Installations – CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal	161	38 175	54	15 445	205	93,2	53 620	97,1
Hôpital Fleury	8	725	-	-	8	3,6	725	1,3
Hôpital Jean-Talon	7	885	-	-	7	3,2	885	1,6
Total	**176**	**39 785**	**54**	**15 445**	**220**	**100,0**	**55 230**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 251,0 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, représentant un budget de 4 813 294 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**61**	**27,7**	**8 912**	**16,1**
Cytopénies immunes	*40*	*18,2*	*6 922*	*12,5*
Thrombopénie immune (PTI)	5	2,3	642	1,2
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	31	14,1	5 170	9,4
Thrombopénie/thrombocytopénie	13	5,9	1 110	2,0
Autre - hématologie non précisée	24	10,9	1 990	3,6
Immunologie	**113**	**51,4**	**25 430**	**46,0**
Déficiences immunitaires primaires	*23*	*10,5*	*6 683*	*12,1*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	23	10,5	6 683	12,1
Déficiences immunitaires secondaires	*74*	*33,6*	*17 297*	*31,3*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	74	33,6	17 297	31,3
Autre - immunologie non précisée	22	10,0	1 450	2,6
Neurologie	**42**	**19,1**	**10 201**	**18,5**
Encéphalites	*1*	*0,5*	*40*	*0,1*
Encéphalite auto-immune	1	0,5	40	0,1
Myasthénies	*10*	*4,5*	*1 685*	*3,1*
Myasthénie grave	10	4,5	1 685	3,1
Myosites	*11*	*5,0*	*3 560*	*6,4*
Dermatomyosite	11	5,0	3 560	6,4
Neuropathies	*5*	*2,3*	*3 196*	*5,8*
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	5	2,3	3 196	5,8
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	8	3,6	900	1,6
Autre - neurologie non précisée	9	4,1	820	1,5
Infectiologie	**20**	**9,1**	**2 195**	**4,0**
Syndrome du choc toxique	17	7,7	1 975	3,6
Autre - infectiologie non précisée	3	1,4	220	0,4
Dermatologie	**7**	**3,2**	**510**	**0,9**
Pemphigoïdes	1	0,5	90	0,2
Autre - dermatologie non précisée	7	3,2	420	0,8
Rhumatologie	**3**	**1,4**	**160**	**0,3**
Fasciite éosinophilique	1	0,5	45	0,1
Autre - rhumatologie non précisée	2	0,9	115	0,2
Autres indications	**42**	**19,1**	**7 822**	**14,2**
Transplantation d'organes solides	*1*	*0,5*	*60*	*0,1*
Traitement d'un rejet de greffe	1	0,5	60	0,1
Autre - non précisé	42	19,1	7 762	14,1
Total	**220**	**100,0**	**55 230**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R06-5 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	4	2,0	-	-	4	1,0
Enfants (29 jours à 17 ans)	4	2,0	2	1,1	6	1,6
Adultes (18 à 64 ans)	116	59,2	98	51,9	214	55,6
Aînés (≥ 65 ans)	72	36,7	89	47,1	161	41,8
0-4	8	4,1	2	1,1	10	2,6
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	2	1,0	2	1,1	4	1,0
20-24	5	2,6	3	1,6	8	2,1
25-29	5	2,6	3	1,6	8	2,1
30-34	7	3,6	7	3,7	14	3,6
35-39	6	3,1	15	7,9	21	5,5
40-44	13	6,6	11	5,8	24	6,2
45-49	8	4,1	12	6,3	20	5,2
50-54	16	8,2	16	8,5	32	8,3
55-59	24	12,2	11	5,8	35	9,1
60-64	30	15,3	18	9,5	48	12,5
65-69	25	12,8	26	13,8	51	13,2
70-74	18	9,2	16	8,5	34	8,8
75-79	14	7,1	24	12,7	38	9,9
80-84	9	4,6	15	7,9	24	6,2
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**196**	**100,0**	**189**	**100,0**	**385**	**100,0**
Âge moyen	56,9		60,0		58,4	
Écart-type	19,6		18,1		19,0	
Étendue	0 - 98,4		0,63 - 92,5		0 - 98,4	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Installations – CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital Maisonneuve-Rosemont	301	70 240	91	25 539	372	96,6	95 779	97,9
Hôpital Santa Cabrini	13	2 030	-	-	13	3,4	2 030	2,1
Total	**314**	**72 270**	**91**	**25 539**	**385**	**100,0**	**97 809**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 254,0 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, représentant un budget de 8 536 438 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**15**	**3,9**	**705**	**0,7**
Cytopénies immunes	*8*	*2,1*	*465*	*0,5*
Thrombopénie immune (PTI)	1	0,3	65	0,1
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	6	1,6	315	0,3
Thrombopénie/thrombocytopénie	2	0,5	85	0,1
Allogreffe de cellules souches	3	0,8	80	0,1
Anémie	1	0,3	45	0,0
Autre - hématologie non précisée	3	0,8	115	0,1
Immunologie	**5**	**1,3**	**425**	**0,4**
Déficiences immunitaires secondaires	*3*	*0,8*	*80*	*0,1*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	3	0,8	80	0,1
Autre - immunologie non précisée	2	0,5	345	0,4
Neurologie	**2**	**0,5**	**450**	**0,5**
Myasthénies	*1*	*0,3*	*90*	*0,1*
Myasthénie grave	1	0,3	90	0,1
Neuropathies	*1*	*0,3*	*270*	*0,3*
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	1	0,3	270	0,3
Autre - neurologie non précisée	1	0,3	90	0,1
Infectiologie	**2**	**0,5**	**180**	**0,2**
Syndrome du choc toxique	2	0,5	180	0,2
Autres indications	**2**	**0,5**	**505**	**0,5**
Autre - non précisé	2	0,5	505	0,5
Non répondu	**368**	**95,6**	**95 544**	**97,7**
Total	**385**	**100,0**	**97 809**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R06 CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM)

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CHU de Montréal, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	1	0,8	1	1,0	2	0,9
Enfants (29 jours à 17 ans)	1	0,8	1	1,0	2	0,9
Adultes (18 à 64 ans)	83	68,0	65	63,7	148	66,1
Aînés (≥ 65 ans)	37	30,3	35	34,3	72	32,1
0-4	1	0,8	1	1,0	2	0,9
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	6	4,9	2	2,0	8	3,6
20-24	1	0,8	4	3,9	5	2,2
25-29	9	7,4	6	5,9	15	6,7
30-34	7	5,7	5	4,9	12	5,4
35-39	4	3,3	12	11,8	16	7,1
40-44	13	10,7	2	2,0	15	6,7
45-49	5	4,1	8	7,8	13	5,8
50-54	12	9,8	9	8,8	21	9,4
55-59	14	11,5	9	8,8	23	10,3
60-64	13	10,7	9	8,8	22	9,8
65-69	7	5,7	17	16,7	24	10,7
70-74	6	4,9	9	8,8	15	6,7
75-79	10	8,2	6	5,9	16	7,1
80-84	7	5,7	3	2,9	10	4,5
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**122**	**100,0**	**102**	**100,0**	**224**	**100,0**
Âge moyen	54,9		53,2		54,1	
Écart-type	20,2		17,8		19,1	
Étendue	0,01 - 98,5		0,01 - 83		0,01 - 98,5	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CHU de Montréal, 2023-2024

Installation – Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)	224	73 550	-	-	224	100,0	73 550	100,0
Total	**224**	**73 550**	**0**	**0**	**224**	**100,0**	**73 550**	**100,0**

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 328,3 grammes d'Ig par usager ont été administrés au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), représentant un budget de 6 550 363 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CHU de Montréal, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**32**	**14,3**	**3 745**	**5,1**
Cytopénies immunes	*32*	*14,3*	*3 745*	*5,1*
Thrombopénie allo-immune foetale/néonatale	2	0,9	10	0,0
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	30	13,4	3 735	5,1
Immunologie	**86**	**38,4**	**25 180**	**34,2**
Déficiences immunitaires primaires	*51*	*22,8*	*19 535*	*26,6*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	51	22,8	19 535	26,6
Déficiences immunitaires secondaires	*36*	*16,1*	*5 645*	*7,7*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	36	16,1	5 645	7,7
Neurologie	**48**	**21,4**	**25 410**	**34,5**
Myasthénies	*15*	*6,7*	*9 355*	*12,7*
Myasthénie grave	15	6,7	9 355	12,7
Neuropathies	*27*	*12,1*	*15 045*	*20,5*
Neuropathie motrice multifocale	3	1,3	1 240	1,7
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	25	11,2	13 805	18,8
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	7	3,1	1 010	1,4
Infectiologie	**7**	**3,1**	**725**	**1,0**
Syndrome du choc toxique	7	3,1	725	1,0
Dermatologie	**1**	**0,4**	**160**	**0,2**
Pemphigoïdes	1	0,4	160	0,2
Autres indications	**54**	**24,1**	**18 330**	**24,9**
Transplantation d'organes solides	*12*	*5,4*	*1 705*	*2,3*
Prévention d'un rejet de greffe	4	1,8	300	0,4
Traitement d'un rejet de greffe	8	3,6	1 405	1,9
Autre - non précisé	42	18,8	16 625	22,6
Total	**224**	**100,0**	**73 550**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R06 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINTE-JUSTINE

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CHU Sainte-Justine, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-né (0 à 28 jours)	9	4,7	4	2,5	13	3,7
29 jours à <1 an	6	3,2	7	4,5	13	3,7
1-2	29	15,3	20	12,7	49	14,1
3-4	25	13,2	17	10,8	42	12,1
5-6	19	10,0	18	11,5	37	10,7
7-8	14	7,4	14	8,9	28	8,1
9-10	19	10,0	11	7,0	30	8,6
11-12	23	12,1	7	4,5	30	8,6
13-14	14	7,4	19	12,1	33	9,5
15-16	14	7,4	14	8,9	28	8,1
17-18	16	8,4	12	7,6	28	8,1
≥ 19	2	1,1	14	8,9	16	4,6
Total	**190**	**100,0**	**157**	**100,0**	**347**	**100,0**
Âge moyen	8,4		10,7		9,4	
Écart-type	5,7		8,8		7,3	
Étendue	0 - 19,8		0,01 - 43,4		0 - 43,4	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, en date du 30 août 2023.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CHU Sainte-Justine, 2023-2024

Installation – Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	303	32 578	60	7 408	347	100,0	39 986	100,0
Total	**303**	**32 578**	**60**	**7 408**	**347**	**100,0**	**39 986**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 115,2 grammes d'Ig par usager ont été administrés au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, représentant un budget de 3 510 512 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CHU Sainte-Justine, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**109**	**31,4**	**12 158**	**30,4**
Cytopénies immunes	*38*	*11,0*	*6 498*	*16,2*
Anémie hémolytique auto-immune	2	0,6	50	0,1
Maladie hémolytique du nouveau-né	4	1,2	13	0,0
Syndrome d'Evans	2	0,6	570	1,4
Syndrome hémophagocytaire	1	0,3	5	0,0
Syndrome hyperhémolytique	1	0,3	130	0,3
Thrombopénie allo-immune foetale/néonatale	6	1,7	3 933	9,8
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	20	5,8	1 613	4,0
Thrombopénie immune (PTI) chronique	3	0,9	185	0,5
Allogreffe de cellules souches	67	19,3	5 498	13,7
Autre - hématologie non précisée	12	3,5	163	0,4
Immunologie	**117**	**33,7**	**12 376**	**30,9**
Déficiences immunitaires primaires	*50*	*14,4*	*5 908*	*14,8*
Déficit en sous-classe IgG2	1	0,3	145	0,4
Déficit immunitaire combiné avec caractéristiques associées ou syndromiques	9	2,6	630	1,6
Déficit immunitaire commun variable	2	0,6	360	0,9
Déficit immunitaire primaire (DIP)	45	13,0	4 713	11,8
Syndrome de DiGeorge	1	0,3	60	0,2
Déficiences immunitaires secondaires	*56*	*16,1*	*3 878*	*9,7*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	35	10,1	2 554	6,4
Hypogammaglobulinémie secondaire à chylothorax, entéropathie exsudative ou autres	2	0,6	45	0,1
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	2	0,6	63	0,2
Hypogammaglobulinémie secondaire aux anti-lymphocytes B / immunosuppresseurs / médicaments	16	4,6	575	1,4
Hypogammaglobulinémie secondaire aux CAR-T	10	2,9	642	1,6
Déficience en Ig non précisée	6	1,7	616	1,5
Maladie auto-immune	1	0,3	60	0,2
Syndrome de fuite capillaire	1	0,3	25	0,1
Autre - immunologie non précisée	19	5,5	1 890	4,7
Neurologie	**67**	**19,3**	**10 751**	**26,9**
Encéphalites	*21*	*6,1*	*1 673*	*4,2*
Encéphalite auto-immune	14	4,0	945	2,4
Encéphalite de Rasmussen	1	0,3	218	0,5
Encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM)	7	2,0	510	1,3
Myasthénies	*7*	*2,0*	*831*	*2,1*
Myasthénie grave	7	2,0	831	2,1
Myélites	*7*	*2,0*	*775*	*1,9*
Myélite transverse	4	1,2	365	0,9
Neuromyélite optique (NMO)	3	0,9	410	1,0

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CHU Sainte-Justine, 2023-2024 (suite)

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Neurologie (suite)				
Myosites	*9*	*2,6*	*3 248*	*8,1*
Dermatomyosite	9	2,6	3 248	8,1
Neuropathies	*5*	*1,4*	*1 098*	*2,7*
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	5	1,4	1 098	2,7
Maladie des anticorps anti-glycoprotéine myélinique oligodendrocytaire	4	1,2	680	1,7
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	8	2,3	623	1,6
Syndrome opsomyoclonique	2	0,6	83	0,2
Trouble du spectre de l'autisme	1	0,3	170	0,4
Troubles neuropsychiatriques infantiles auto-immuns associés aux infections streptococciques (PANDAS)	3	0,9	1 320	3,3
Autre - neurologie non précisée	4	1,2	253	0,6
Infectiologie	**29**	**8,4**	**1 100**	**2,8**
Fasciite nécrosante	1	0,3	20	0,1
Prophylaxie infectieuse	1	0,3	3	0,0
Rougeole – post exposition	3	0,9	65	0,2
Sepsis néonatal à entérovirus	6	1,7	33	0,1
Syndrome du choc toxique	14	4,0	810	2,0
Syndrome inflammatoire multisystémique associé à la COVID chez l'enfant	2	0,6	100	0,3
Syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS)	2	0,6	70	0,2
Rhumatologie	**34**	**9,8**	**1 729**	**4,3**
Arthrite juvénile idiopathique	1	0,3	11	0,0
Lupus érythémateux disséminé (LED)	2	0,6	255	0,6
Lupus néonatal	3	0,9	373	0,9
Maladie de Kawasaki	25	7,2	743	1,9
Polyartérite noueuse	2	0,6	340	0,9
Autre - rhumatologie non précisée	1	0,3	8	0,0
Autres indications	**18**	**5,2**	**1 873**	**4,7**
Transplantation d'organes solides	*12*	*3,5*	*1 365*	*3,4*
Prévention d'un rejet de greffe	6	1,7	195	0,5
Traitement d'un rejet de greffe	6	1,7	1 158	2,9
Traitement d'une infection	2	0,6	13	0,0
Cardiologie	*3*	*0,9*	*153*	*0,4*
Myocardite	3	0,9	153	0,4
Obstétrique/Fertilité	*3*	*0,9*	*355*	*0,9*
Avortements spontanés à répétition	1	0,3	240	0,6
Hémochromatose néonatale	2	0,6	115	0,3
Total	**347**	**100,0**	**39 986**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R06 CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL

Description des usagers

Tableau 1A Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – Centre universitaire de santé McGill, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	1	0,3	3	0,8	4	0,6
Enfants (29 jours à 17 ans)	66	22,3	44	12,3	110	16,8
Adultes (18 à 64 ans)	126	42,6	208	58,1	334	51,0
Aînés (≥ 65 ans)	103	34,8	103	28,8	206	31,5
0-4	26	8,8	21	5,9	47	7,2
5-9	18	6,1	14	3,9	32	4,9
10-14	17	5,7	8	2,2	25	3,8
15-19	7	2,4	8	2,2	15	2,3
20-24	5	1,7	5	1,4	10	1,5
25-29	8	2,7	8	2,2	16	2,4
30-34	11	3,7	33	9,2	44	6,7
35-39	10	3,4	40	11,2	50	7,6
40-44	14	4,7	31	8,7	45	6,9
45-49	9	3,0	25	7,0	34	5,2
50-54	18	6,1	16	4,5	34	5,2
55-59	21	7,1	15	4,2	36	5,5
60-64	29	9,8	31	8,7	60	9,2
65-69	28	9,5	32	8,9	60	9,2
70-74	27	9,1	29	8,1	56	8,5
75-79	29	9,8	20	5,6	49	7,5
80-84	12	4,1	10	2,8	22	3,4
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Inconnu[a]	-	-	-	-	1	0,2
Total	**296**	**100,0**	**358**	**100,0**	**655**	**100,0**
Âge moyen	48,4		47,9		48,1	
Écart-type	26,7		23,0		24,7	
Étendue	0,02 - 91,9		0,01 - 89,7		0,01 - 91,9	

[a] L'âge et le sexe sont tous deux inconnus pour un usager.

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Tableau 1B Usagers ayant reçu des immunoglobulines selon le sexe et l'âge pédiatrique – Centre universitaire de santé McGill, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-né (0 à 28 jours)	1	0,3	3	0,8	4	0,6
29 jours à <1 an	2	0,7	2	0,6	4	0,6
1-2	12	4,1	6	1,7	18	2,7
3-4	11	3,7	10	2,8	21	3,2
5-6	11	3,7	3	0,8	14	2,1
7-8	6	2,0	9	2,5	15	2,3
9-10	2	0,7	3	0,8	5	0,8
11-12	8	2,7	5	1,4	13	2,0
13-14	8	2,7	2	0,6	10	1,5
15-16	4	1,4	3	0,8	7	1,1
17-18	2	0,7	4	1,1	6	0,9
≥ 19	229	77,4	308	86,0	537	82,0
Inconnu[a]	0	0,0	0	0,0	1	0,2
Total	**296**	**100,0**	**358**	**100,0**	**655**	**100,0**
Âge moyen	48,4		47,9		48,1	
Écart-type	26,7		23,0		24,7	
Étendue	0,02 - 91,9		0,01 - 89,7		0,01 - 91,9	

[a] L'âge et le sexe sont tous deux inconnus pour un usager.

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – Centre universitaire de santé McGill, 2023-2024

Installation – Centre universitaire de santé McGill (CUSM)	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital général de Montréal	556	170 008	108	37 008	655	100,0	207 016	100,0
Total	**556**	**170 008**	**108**	**37 008**	**655**	**100,0**	**207 016**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 316,1 grammes d'Ig par usager ont été administrés au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), représentant un budget de 18 184 036 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – Centre universitaire de santé McGill, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**83**	**12,7**	**9 559**	**4,6**
Cytopénies immunes	*74*	*11,3*	*9 154*	*4,4*
Anémie hémolytique auto-immune	2	0,3	240	0,1
Aplasie érythrocytaire associée au parvovirus B19	2	0,3	365	0,2
Maladie hémolytique du nouveau-né	1	0,2	5	0,0
Neutropénie auto-immune	1	0,2	75	0,0
Syndrome hémophagocytaire	3	0,5	455	0,2
Thrombopénie allo-immune foetale/néonatale	2	0,3	13	0,0
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	60	9,2	7 753	3,7
Thrombopénie immune (PTI) chronique	2	0,3	111	0,1
Thrombopénie immune (PTI) grossesse	1	0,2	138	0,1
Allogreffe de cellules souches	9	1,4	405	0,2
Immunologie	**206**	**31,5**	**52 322**	**25,3**
Déficiences immunitaires primaires	*89*	*13,6*	*25 252*	*12,2*
Agammaglobulinémie	4	0,6	740	0,4
Déficit immunitaire combiné avec caractéristiques associées ou syndromiques	1	0,2	195	0,1
Déficit immunitaire commun variable	17	2,6	3 185	1,5
Déficit immunitaire primaire (DIP)	71	10,8	20 898	10,1
Syndrome d'hyper-IgM	1	0,2	234	0,1
Déficiences immunitaires secondaires	*114*	*17,4*	*26 410*	*12,8*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	85	13,0	20 309	9,8
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	51	7,8	5 981	2,9
Hypogammaglobulinémie secondaire aux anti-lymphocytes B / immunosuppresseurs / médicaments	1	0,2	120	0,1
Déficience en Ig non précisée	3	0,5	575	0,3
Syndrome de Good	1	0,2	85	0,0
Neurologie	**205**	**31,3**	**119 994**	**58,0**
Encéphalites	*27*	*4,1*	*6 000*	*2,9*
Encéphalite	2	0,3	80	0,0
Encéphalite auto-immune	18	2,7	4 193	2,0
Encéphalite de Rasmussen	3	0,5	1 320	0,6
Encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM)	5	0,8	408	0,2
Myasthénies	*36*	*5,5*	*13 645*	*6,6*
Myasthénie grave	36	5,5	13 645	6,6
Myélites	2	0,3	430	0,2
Myélite transverse	2	0,3	430	0,2

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – Centre universitaire de santé McGill, 2023-2024 (suite)

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Myosites	*36*	*5,5*	*23 310*	*11,3*
Dermatomyosite	12	1,8	9 540	4,6
Myopathie auto-immune nécrosante	7	1,1	2 635	1,3
Myosite à corps d'inclusion	2	0,3	2 520	1,2
Myosite inflammatoire	13	2,0	6 210	3,0
Polymyosite	5	0,8	2 405	1,2
Neuropathies	*62*	*9,5*	*52 991*	*25,6*
Neuropathie motrice multifocale	21	3,2	16 906	8,2
Névrite optique	2	0,3	300	0,1
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	40	6,1	35 785	17,3
Épilepsie	2	0,3	423	0,2
Maladie cérébrale inflammatoire	2	0,3	355	0,2
Maladie des anticorps anti-glycoprotéine myélinique oligodendrocytaire	10	1,5	3 938	1,9
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	17	2,6	1 908	0,9
Syndrome de la personne raide	3	0,5	545	0,3
Syndrome opsomyoclonique	2	0,3	420	0,2
Syndrome post-poliomyélitique	8	1,2	9 360	4,5
Autre - neurologie non précisée	6	0,9	6 670	3,2
Infectiologie	**17**	**2,6**	**1 335**	**0,6**
Anti-cytomégalovirus (CMV) prophylaxie	1	0,2	10	0,0
Fasciite nécrosante	1	0,2	20	0,0
Rougeole – post exposition	1	0,2	30	0,0
Syndrome du choc toxique	13	2,0	1 160	0,6
Syndrome inflammatoire multisystémique associé à la COVID chez l'adulte	1	0,2	45	0,0
Syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS)	1	0,2	70	0,0
Dermatologie	**3**	**0,5**	**1 240**	**0,6**
Pemphigoïdes	1	0,2	510	0,2
Pemphigus	2	0,3	730	0,4
Rhumatologie	**34**	**5,2**	**3 188**	**1,5**
Lupus érythémateux disséminé (LED)	1	0,2	1 440	0,7
Maladie de Kawasaki	28	4,3	1 133	0,5
Syndrome de chevauchement	1	0,2	175	0,1
Syndrome de Sjögren	1	0,2	160	0,1
Syndrome des antiphospholipides	1	0,2	110	0,1
Vasculite	1	0,2	60	0,0
Autre - rhumatologie non précisée	1	0,2	110	0,1

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – Centre universitaire de santé McGill, 2023-2024 (suite)

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Autres indications	**112**	**17,1**	**19 380**	**9,4**
Transplantation d'organes solides	*27*	*4,1*	*8 780*	*4,2*
Prévention d'un rejet de greffe	3	0,5	705	0,3
Traitement d'un rejet de greffe	23	3,5	7 855	3,8
Traitement d'une infection	1	0,2	220	0,1
Cardiologie	*1*	*0,2*	*65*	*0,0*
Myocardite	1	0,2	65	0,0
Obstétrique/Fertilité	*76*	*11,6*	*6 022*	*2,9*
Avortements spontanés à répétition	37	5,6	2 982	1,4
Échec d'implantation	44	6,7	2 995	1,4
Grossesse/naissance	1	0,2	45	0,0
Autre - non précisé	8	1,2	4 513	2,2
Total	**655**	**100,0**	**207 016**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R06 INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – Institut de cardiologie de Montréal, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	1	8,3	-	-	1	4,8
Adultes (18 à 64 ans)	8	66,7	8	88,9	16	76,2
Aînés (≥ 65 ans)	3	25,0	1	11,1	4	19,0
0-4	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	2	16,7	-	-	2	9,5
20-24	-	-	2	22,2	2	9,5
25-29	-	-	-	-	-	-
30-34	1	8,3	-	-	1	4,8
35-39	1	8,3	1	11,1	2	9,5
40-44	-	-	1	11,1	1	4,8
45-49	1	8,3	1	11,1	2	9,5
50-54	-	-	1	11,1	1	4,8
55-59	1	8,3	1	11,1	2	9,5
60-64	3	25,0	1	11,1	4	19,0
65-69	1	8,3	1	11,1	2	9,5
70-74	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-
80-84	1	8,3	-	-	1	4,8
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**12**	**100,0**	**9**	**100,0**	**21**	**100,0**
Âge moyen	53,3		46,1		50,3	
Écart-type	23,0		16,7		20,4	
Étendue	17,82 - 88,7		21,13 - 69,8		17,82 - 88,7	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – Institut de cardiologie de Montréal, 2023-2024

Installation – Institut de cardiologie de Montréal	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Institut de cardiologie de Montréal	21	2 015	-	-	21	100,0	2 015	100,0
Total	**21**	**2 015**	**0**	**0**	**21**	**100,0**	**2 015**	**100,0**

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 96,0 grammes d'Ig par usager ont été administrés à l'Institut de cardiologie de Montréal, représentant un budget de 179 456 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – Institut de cardiologie de Montréal, 2023-2024

Indication	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**13**	**61,9**	**1 125**	**55,8**
Cytopénies immunes	*13*	*61,9*	*1 125*	*55,8*
Neutropénie auto-immune	2	9,5	160	7,9
Thrombopénie immune (PTI)	10	47,6	845	41,9
Thrombopénie/thrombocytopénie	1	4,8	120	6,0
Immunologie	**2**	**9,5**	**165**	**8,2**
Déficiences immunitaires secondaires	*2*	*9,5*	*165*	*8,2*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	2	9,5	165	8,2
Infectiologie	**1**	**4,8**	**60**	**3,0**
Syndrome du choc toxique	1	4,8	60	3,0
Autres indications	**8**	**38,1**	**665**	**33,0**
Transplantation d'organes solides	*1*	*4,8*	*140*	*6,9*
Traitement d'un rejet de greffe	1	4,8	140	6,9
Autre - non précisé	7	33,3	525	26,1
Total	**21**	**100,0**	**2 015**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R07 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CIUSSS de l'Outaouais, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	1	0,8	-	-	1	0,4
Enfants (29 jours à 17 ans)	10	8,0	1	0,8	11	4,4
Adultes (18 à 64 ans)	68	54,4	68	55,3	136	54,8
Aînés (≥ 65 ans)	46	36,8	54	43,9	100	40,3
0-4	3	2,4	-	-	3	1,2
5-9	4	3,2	-	-	4	1,6
10-14	1	0,8	1	0,8	2	0,8
15-19	3	2,4	3	2,4	6	2,4
20-24	1	0,8	1	0,8	2	0,8
25-29	1	0,8	-	-	1	0,4
30-34	6	4,8	9	7,3	15	6,0
35-39	6	4,8	3	2,4	9	3,6
40-44	7	5,6	6	4,9	13	5,2
45-49	4	3,2	9	7,3	13	5,2
50-54	12	9,6	6	4,9	18	7,3
55-59	15	12,0	16	13,0	31	12,5
60-64	16	12,8	15	12,2	31	12,5
65-69	12	9,6	23	18,7	35	14,1
70-74	13	10,4	13	10,6	26	10,5
75-79	10	8,0	10	8,1	20	8,1
80-84	9	7,2	7	5,7	16	6,5
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**125**	**100,0**	**123**	**100,0**	**248**	**100,0**
Âge moyen	55,9		59,3		57,6	
Écart-type	20,7		16,1		18,6	
Étendue	0,02 - 91,9		10,11 - 85,6		0,02 - 91,9	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CIUSSS de l'Outaouais, 2023-2024

Installation – CISSS de l'Outaouais	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital de Gatineau	18	2 460	7	3 459	25	10,1	5 919	3,1
Hôpital de Hull	162	146 460	16	7 022	176	71,0	153 482	79,2
Hôpital de Maniwaki	12	5 210	-	-	12	4,8	5 210	2,7
Hôpital de Papineau	21	22 390	3	1 358	24	9,7	23 748	12,3
Hôpital du Pontiac	10	5 225	1	240	11	4,4	5 465	2,8
Total	**223**	**181 745**	**27**	**12 079**	**248**	**100,0**	**193 824**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 781,5 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CISSS de l'Outaouais, représentant un budget de 17 179 466 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS de l'Outaouais, 2023-2024

Indication	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**32**	**12,9**	**6 634**	**3,4**
Cytopénies immunes	*25*	*10,1*	*5 545*	*2,9*
Anémie hémolytique auto-immune	3	1,2	1 100	0,6
Thrombopénie allo-immune foetale/néonatale	2	0,8	70	0,0
Thrombopénie immune (PTI)	6	2,4	610	0,3
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	9	3,6	1 515	0,8
Thrombopénie immune (PTI) chronique	2	0,8	1 570	0,8
Thrombopénie/thrombocytopénie	8	3,2	680	0,4
Allogreffe de cellules souches	1	0,4	329	0,2
Autre - hématologie non précisée	8	3,2	760	0,4
Immunologie	**44**	**17,7**	**10 999**	**5,7**
Déficiences immunitaires primaires	*16*	*6,5*	*5 449*	*2,8*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	16	6,5	5 449	2,8
Déficiences immunitaires secondaires	*17*	*6,9*	*3 675*	*1,9*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	13	5,2	2 825	1,5
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	4	1,6	850	0,4
Déficience en Ig non précisée	1	0,4	100	0,1
Autre - immunologie non précisée	11	4,4	1 775	0,9
Neurologie	**146**	**58,9**	**143 125**	**73,8**
Encéphalites	*2*	*0,8*	*3 470*	*1,8*
Encéphalite auto-immune	1	0,4	1 650	0,9
Encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM)	1	0,4	1 820	0,9
Myasthénies	*40*	*16,1*	*37 790*	*19,5*
Myasthénie grave	39	15,7	35 330	18,2
Syndrome myasthénique de Lambert-Eaton	3	1,2	2 460	1,3
Myélites	*2*	*0,8*	*3 240*	*1,7*
Neuromyélite optique (NMO)	2	0,8	3 240	1,7
Myosites	*16*	*6,5*	*15 630*	*8,1*
Dermatomyosite	12	4,8	13 040	6,7
Myopathie auto-immune nécrosante	3	1,2	2 290	1,2
Myosite à corps d'inclusion	1	0,4	300	0,2
Neuropathies	54	21,8	64 795	33,4
Neuropathie motrice multifocale	14	5,6	27 350	14,1
Neuropathie paranéoplasique	1	0,4	1 700	0,9
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	40	16,1	35 745	18,4
Maladie des anticorps anti-glycoprotéine myélinique oligodendrocytaire	1	0,4	350	0,2
Sclérose en plaques	6	2,4	7 770	4,0
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	9	3,6	750	0,4
Syndrome de la personne raide	4	1,6	2 890	1,5
Autre - neurologie non précisée	19	7,7	6 440	3,3

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS de l'Outaouais, 2023-2024 (suite)

Indication	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Infectiologie	**2**	**0,8**	**220**	**0,1**
Syndrome du choc toxique	2	0,8	220	0,1
Rhumatologie	**11**	**4,4**	**12 655**	**6,5**
Lupus érythémateux disséminé (LED)	1	0,4	2 240	1,2
Maladie de Kawasaki	2	0,8	80	0,0
Syndrome de Sjögren	2	0,8	4 060	2,1
Syndrome des antiphospholipides	1	0,4	335	0,2
Vasculite	4	1,6	3 840	2,0
Vasculite primaire du système nerveux central	1	0,4	2 100	1,1
Autres indications	**61**	**24,6**	**20 191**	**10,4**
Transplantation d'organes solides	*2*	*0,8*	*1 180*	*0,6*
Traitement d'un rejet de greffe	2	0,8	1 180	0,6
Obstétrique/Fertilité	*1*	*0,4*	*70*	*0,0*
Grossesse/naissance	1	0,4	70	0,0
Autre - non précisé	59	23,8	18 941	9,8
Total	**248**	**100,0**	**193 824**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R08 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CIUSSS de l'Abitibi-Témiscamingue, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	-	-	5	8,3	5	4,6
Adultes (18 à 64 ans)	22	44,9	32	53,3	54	49,5
Aînés (≥ 65 ans)	27	55,1	23	38,3	50	45,9
0-4	-	-	1	1,7	1	0,9
5-9	-	-	1	1,7	1	0,9
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	4	6,7	4	3,7
20-24	1	2,0	-	-	1	0,9
25-29	1	2,0	1	1,7	2	1,8
30-34	3	6,1	3	5,0	6	5,5
35-39	-	-	4	6,7	4	3,7
40-44	-	-	-	-	-	-
45-49	6	12,2	3	5,0	9	8,3
50-54	2	4,1	5	8,3	7	6,4
55-59	3	6,1	8	13,3	11	10,1
60-64	6	12,2	7	11,7	13	11,9
65-69	4	8,2	5	8,3	9	8,3
70-74	9	18,4	11	18,3	20	18,3
75-79	5	10,2	2	3,3	7	6,4
80-84	5	10,2	3	5,0	8	7,3
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**49**	**100,0**	**60**	**100,0**	**109**	**100,0**
Âge moyen	64,6		56,2		60,0	
Écart-type	16,9		20,4		19,3	
Étendue	21,08 - 90,9		4,78 - 87,7		4,78 - 90,9	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CIUSSS de l'Abitibi-Témiscamingue, 2023-2024

Installations – CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Centre de soins de courte durée La Sarre	9	3 415	3	1 026	11	10,1	4 441	12,7
Hôpital d'Amos	25	9 505	-	-	25	22,9	9 505	27,1
Hôpital de Rouyn-Noranda	27	5 805	2	1 948	29	26,6	7 753	22,1
Hôpital et centre local de services communautaires (CLSC) de Val-d'Or	29	9 245	5	1 727	34	31,2	10 972	31,3
Pavillon Sainte-Famille (Ville-Marie)	7	1 750	3	604	10	9,2	2 354	6,7
Total	**97**	**29 720**	**13**	**5 305**	**109**	**100,0**	**35 025**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 321,3 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, représentant un budget de 3 083 093 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CIUSSS de l'Abitibi-Témiscamingue, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**12**	**11,0**	**1 405**	**4,0**
Cytopénies immunes	*11*	*10,1*	*1 225*	*3,5*
Cytopénie immune	1	0,9	120	0,3
Thrombopénie allo-immune foetale/néonatale	1	0,9	120	0,3
Thrombopénie immune (PTI)	2	1,8	205	0,6
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	8	7,3	715	2,0
Thrombopénie/thrombocytopénie	1	0,9	65	0,2
Allogreffe de cellules souches	1	0,9	180	0,5
Immunologie	**50**	**45,9**	**15 326**	**43,8**
Déficiences immunitaires primaires	*15*	*13,8*	*5 341*	*15,2*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	15	13,8	5 341	15,2
Déficiences immunitaires secondaires	*35*	*32,1*	*7 580*	*21,6*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	35	32,1	7 580	21,6
Syndrome de fuite capillaire	1	0,9	2 405	6,9
Neurologie	**39**	**35,8**	**17 324**	**49,5**
Myasthénies	*10*	*9,2*	*4 055*	*11,6*
Myasthénie grave	10	9,2	4 055	11,6
Neuropathies	*18*	*16,5*	*11 054*	*31,6*
Neuropathie motrice multifocale	1	0,9	615	1,8
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	17	15,6	10 439	29,8
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	8	7,3	675	1,9
Autre - neurologie non précisée	3	2,8	1 540	4,4
Infectiologie	**7**	**6,4**	**535**	**1,5**
Fasciite nécrosante	1	0,9	20	0,1
Syndrome du choc toxique	5	4,6	420	1,2
Autre - infectiologie non précisée	2	1,8	95	0,3
Dermatologie	**1**	**0,9**	**300**	**0,9**
Pemphigus	1	0,9	300	0,9
Rhumatologie	**1**	**0,9**	**50**	**0,1**
Autre - rhumatologie non précisée	1	0,9	50	0,1
Autres indications	**1**	**0,9**	**85**	**0,2**
Obstétrique/Fertilité	*1*	*0,9*	*85*	*0,2*
Autre - obstétrique/fertilité non précisée	1	0,9	85	0,2
Total	**109**	**100,0**	**35 025**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R09 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CISSS de la Côte-Nord, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	-	-	1	4,3	1	2,2
Adultes (18 à 64 ans)	8	36,4	12	52,2	20	44,4
Aînés (≥ 65 ans)	14	63,6	10	43,5	24	53,3
0-4	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	1	4,3	1	2,2
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	1	4,5	-	-	1	2,2
20-24	1	4,5	-	-	1	2,2
25-29	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	2	8,7	2	4,4
40-44	-	-	3	13,0	3	6,7
45-49	1	4,5	-	-	1	2,2
50-54	3	13,6	2	8,7	5	11,1
55-59	1	4,5	1	4,3	2	4,4
60-64	1	4,5	4	17,4	5	11,1
65-69	6	27,3	4	17,4	10	22,2
70-74	5	22,7	2	8,7	7	15,6
75-79	-	-	2	8,7	2	4,4
80-84	3	13,6	1	4,3	4	8,9
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**22**	**100,0**	**23**	**100,0**	**45**	**100,0**
Âge moyen	62,7		59,3		61,0	
Écart-type	16,8		18,5		17,5	
Étendue	18,69 - 84,1		6,14 - 88,7		6,14 - 88,7	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CISSS de la Côte-Nord, 2023-2024

Installations – CISSS de la Côte-Nord	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
CMSSS de la Minganie	3	795	1	151	4	8,9	946	3,7
CMSSS des Escoumins	1	70	-	-	1	2,2	70	0,3
Hôpital et CLSC de Sept-Îles	18	9 150	1	400	19	42,2	9 550	37,8
Hôpital Le Royer	20	14 265	1	406	21	46,7	14 671	58,1
Total	**42**	**24 280**	**3**	**957**	**45**	**100,0**	**25 237**	**100,0**

Note : Le CMSSS de la Basse-Côte-Nord n'a pas administré d'Ig en 2023-2024.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 560,8 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CISSS de la Côte-Nord, représentant un budget de 2 241 071 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS de la Côte-Nord, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**10**	**22,2**	**1 375**	**5,4**
Cytopénies immunes	*9*	*20,0*	*1 215*	*4,8*
Thrombopénie immune (PTI)	4	8,9	715	2,8
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	5	11,1	500	2,0
Allogreffe de cellules souches	1	2,2	160	0,6
Immunologie	**19**	**42,2**	**5 523**	**21,9**
Déficiences immunitaires primaires	*7*	*15,6*	*1 520*	*6,0*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	7	15,6	1 520	6,0
Déficiences immunitaires secondaires	*13*	*28,9*	*4 003*	*15,9*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	13	28,9	4 003	15,9
Neurologie	**13**	**28,9**	**17 115**	**67,8**
Myasthénies	*2*	*4,4*	*3 460*	*13,7*
Myasthénie grave	2	4,4	3 460	13,7
Myosites	*2*	*4,4*	*2 285*	*9,1*
Dermatomyosite	2	4,4	2 285	9,1
Neuropathies	*7*	*15,6*	*11 080*	*43,9*
Neuropathie motrice multifocale	1	2,2	150	0,6
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	6	13,3	10 930	43,3
Maladie des anticorps anti-glycoprotéine myélinique oligodendrocytaire	1	2,2	120	0,5
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	2	4,4	170	0,7
Rhumatologie	**1**	**2,2**	**40**	**0,2**
Granulomatose avec polyangéite	1	2,2	40	0,2
Autres indications	**6**	**13,3**	**1 184**	**4,7**
Autre - non précisé	6	13,3	1 184	4,7
Total	**45**	**100,0**	**25 237**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R10 CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CRSSS) DE LA BAIE JAMES

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CRSSS de la Baie James, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Enfants (29 jours à 17 ans)	1	50,0	-	-	1	20,0
Adultes (18 à 64 ans)	-	-	3	100,0	3	60,0
Aînés (≥ 65 ans)	1	50,0	-	-	1	20,0
0-4	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	1	50,0	-	-	1	20,0
15-19	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	1	33,3	1	20,0
35-39	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	1	33,3	1	20,0
60-64	-	-	1	33,3	1	20,0
65-69	1	50,0	-	-	1	20,0
70-74	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**2**	**100,0**	**3**	**100,0**	**5**	**100,0**
Âge moyen	39,4		51,2		46,4	
Écart-type	36,7		14,9		22,1	
Étendue	13,41 - 65,3		34,36 - 62,6		13,41 - 65,3	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CRSSS de la Baie James, 2023-2024

Installation – Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie James	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Centre de santé de Chibougamau	4	605	-	-	4	80,0	605	33,1
Centre de santé Lebel	-	-	1	1 224	1	20,0	1 224	66,9
Total	**4**	**605**	**1**	**1 224**	**5**	**100,0**	**1 829**	**100,0**

Note : Le Centre de santé Isle-Dieu n'a pas administré d'Ig en 2023-2024.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 365,8 grammes d'Ig par usager ont été administrés au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, représentant un budget de 154 531 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CRSSS de la Baie James, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**1**	**20,0**	**35**	**1,9**
Cytopénies immunes	*1*	*20,0*	*35*	*1,9*
Thrombopénie immune (PTI)	1	20,0	35	1,9
Neurologie	**3**	**60,0**	**1 664**	**91,0**
Myasthénies	*1*	*20,0*	*60*	*3,3*
Myasthénie grave	1	20,0	60	3,3
Neuropathies	*1*	*20,0*	*1 224*	*66,9*
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	1	20,0	1 224	66,9
Syndrome de la personne raide	1	20,0	380	20,8
Autres indications	**1**	**20,0**	**130**	**7,1**
Transplantation d'organes solides	*1*	*20,0*	*130*	*7,1*
Traitement d'un rejet de greffe	1	20,0	130	7,1
Total	**5**	**100,0**	**1 829**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, le nombre total d'usagers et les nombres d'usagers par spécialité pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R11-1 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CISSS de la Gaspésie, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	2	8,3	-	-	2	3,8
Adultes (18 à 64 ans)	8	33,3	16	57,1	24	46,2
Aînés (≥ 65 ans)	14	58,3	12	42,9	26	50,0
0-4	1	4,2	-	-	1	1,9
5-9	1	4,2	-	-	1	1,9
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	2	8,3	-	-	2	3,8
20-24	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	1	3,6	1	1,9
35-39	-	-	1	3,6	1	1,9
40-44	-	-	-	-	-	-
45-49	1	4,2	4	14,3	5	9,6
50-54	4	16,7	1	3,6	5	9,6
55-59	-	-	4	14,3	4	7,7
60-64	1	4,2	5	17,9	6	11,5
65-69	3	12,5	1	3,6	4	7,7
70-74	5	20,8	2	7,1	7	13,5
75-79	6	25,0	6	21,4	12	23,1
80-84	-	-	1	3,6	1	1,9
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**24**	**100,0**	**28**	**100,0**	**52**	**100,0**
Âge moyen	57,9		64,0		61,2	
Écart-type	23,6		14,4		19,3	
Étendue	1,26 - 78,7		32,86 - 89,8		1,26 - 89,8	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CISSS de la Gaspésie, 2023-2024

Installations – CISSS de la Gaspésie	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital de Chandler	10	2 810	1	312	11	21,2	3 122	18,3
Hôpital de Maria	19	5 175	2	888	21	40,4	6 063	35,6
Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts	5	1 865	1	24	5	9,6	1 889	11,1
Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé	14	5 608	1	360	15	28,8	5 968	35,0
Total	**48**	**15 458**	**5**	**1 584**	**52**	**100,0**	**17 042**	**100,0**

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 327,7 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CISSS de la Gaspésie, représentant un budget de 1 506 897 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS de la Gaspésie, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**12**	**23,1**	**2 250**	**13,2**
Cytopénies immunes	*10*	*19,2*	*2 165*	*12,7*
Anémie hémolytique auto-immune	2	3,8	200	1,2
Thrombopénie immune (PTI)	5	9,6	1 160	6,8
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	3	5,8	805	4,7
Allogreffe de cellules souches	2	3,8	85	0,5
Immunologie	**24**	**46,2**	**7 064**	**41,5**
Déficiences immunitaires primaires	*6*	*11,5*	*2 355*	*13,8*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	6	11,5	2 355	13,8
Déficiences immunitaires secondaires	*18*	*34,6*	*4 709*	*27,6*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	18	34,6	4 709	27,6
Neurologie	**13**	**25,0**	**7 338**	**43,1**
Myasthénies	*3*	*5,8*	*2 155*	*12,6*
Myasthénie grave	3	5,8	2 155	12,6
Myosites	*1*	*1,9*	*220*	*1,3*
Myopathie auto-immune nécrosante	1	1,9	220	1,3
Neuropathies	*5*	*9,6*	*3 043*	*17,9*
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	5	9,6	3 043	17,9
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	3	5,8	420	2,5
Autre - neurologie non précisée	1	1,9	1 500	8,8
Infectiologie	**2**	**3,8**	**150**	**0,9**
Syndrome du choc toxique	2	3,8	150	0,9
Autres indications	**1**	**1,9**	**240**	**1,4**
Obstétrique/Fertilité	*1*	*1,9*	*240*	*1,4*
Avortements spontanés à répétition	1	1,9	240	1,4
Total	**52**	**100,0**	**17 042**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R11-2 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES ÎLES

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CISSS des Îles, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	-	-	1	8,3	1	3,8
Adultes (18 à 64 ans)	7	50,0	3	25,0	10	38,5
Aînés (≥ 65 ans)	7	50,0	8	66,7	15	57,7
0-4	-	-	1	8,3	1	3,8
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-
35-39	2	14,3	1	8,3	3	11,5
40-44	1	7,1	-	-	1	3,8
45-49	-	-	1	8,3	1	3,8
50-54	-	-	-	-	-	-
55-59	2	14,3	-	-	2	7,7
60-64	2	14,3	1	8,3	3	11,5
65-69	3	21,4	1	8,3	4	15,4
70-74	3	21,4	4	33,3	7	26,9
75-79	1	7,1	1	8,3	2	7,7
80-84	-	-	-	-	-	-
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**14**	**100,0**	**12**	**100,0**	**26**	**100,0**
Âge moyen	60,5		62,7		61,5	
Écart-type	13,0		23,7		18,3	
Étendue	35,42 - 76,1		1,26 - 86		1,26 - 86	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CISSS des Îles, 2023-2024

Installation – CISSS des Îles	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital de l'Archipel	25	8 710	1	490	26	100,0	9 200	100,0
Total	**25**	**8 710**	**1**	**490**	**26**	**100,0**	**9 200**	**100,0**

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 353,8 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CISSS des Îles, représentant un budget de 816 005 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS des Îles, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**5**	**19,2**	**935**	**10,2**
Cytopénies immunes	*5*	*19,2*	*935*	*10,2*
Thrombopénie immune (PTI)	1	3,8	45	0,5
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	4	15,4	290	3,2
Thrombopénie immune (PTI) chronique	1	3,8	600	6,5
Immunologie	**8**	**30,8**	**2 175**	**23,6**
Déficiences immunitaires primaires	*4*	*15,4*	*1 245*	*13,5*
Déficit immunitaire combiné avec caractéristiques associées ou syndromiques	1	3,8	70	0,8
Déficit immunitaire primaire (DIP)	4	15,4	1 175	12,8
Déficiences immunitaires secondaires	*4*	*15,4*	*880*	*9,6*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	3	11,5	605	6,6
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	3	11,5	275	3,0
Déficience en Ig non précisée	1	3,8	50	0,5
Neurologie	**10**	**38,5**	**5 690**	**61,8**
Myasthénies	*1*	*3,8*	*85*	*0,9*
Myasthénie grave	1	3,8	85	0,9
Myosites	*4*	*15,4*	*1 000*	*10,9*
Dermatomyosite	2	7,7	540	5,9
Myopathie auto-immune nécrosante	1	3,8	70	0,8
Myosite inflammatoire	1	3,8	390	4,2
Neuropathies	*5*	*19,2*	*3 885*	*42,2*
Neuropathie motrice multifocale	1	3,8	270	2,9
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	4	15,4	3 615	39,3
Syndrome de la personne raide	1	3,8	720	7,8
Infectiologie	**3**	**11,5**	**400**	**4,3**
Entérocolite à *Clostridioides difficile*	1	3,8	80	0,9
Syndrome du choc toxique	2	7,7	320	3,5
Total	**26**	**100,0**	**9 200**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R12 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CISSS de Chaudière-Appalaches, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	4	2,9	3	2,2	7	2,5
Enfants (29 jours à 17 ans)	1	0,7	2	1,4	3	1,1
Adultes (18 à 64 ans)	51	36,7	70	50,4	121	43,5
Aînés (≥ 65 ans)	83	59,7	64	46,0	147	52,9
0-4	5	3,6	3	2,2	8	2,9
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	2	1,4	2	0,7
15-19	1	0,7	1	0,7	2	0,7
20-24	3	2,2	3	2,2	6	2,2
25-29	-	-	3	2,2	3	1,1
30-34	3	2,2	4	2,9	7	2,5
35-39	2	1,4	5	3,6	7	2,5
40-44	7	5,0	4	2,9	11	4,0
45-49	9	6,5	5	3,6	14	5,0
50-54	5	3,6	9	6,5	14	5,0
55-59	10	7,2	11	7,9	21	7,6
60-64	11	7,9	25	18,0	36	12,9
65-69	23	16,5	15	10,8	38	13,7
70-74	21	15,1	19	13,7	40	14,4
75-79	19	13,7	17	12,2	36	12,9
80-84	16	11,5	8	5,8	24	8,6
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**139**	**100,0**	**139**	**100,0**	**278**	**100,0**
Âge moyen	63,0		60,5		61,7	
Écart-type	19,2		19,1		19,1	
Étendue	0 - 92,8		0 - 92,3		0 - 92,8	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CISSS de Chaudière-Appalaches, 2023-2024

Installations – CISSS de Chaudière-Appalaches	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital de Montmagny	26	9 315	5	1 816	30	10,8	11 131	11,9
Hôpital de Saint-Georges	52	20 925	11	4 443	63	22,7	25 368	27,2
Hôpital de Thetford Mines	35	9 115	2	844	37	13,3	9 959	10,7
Hôtel-Dieu de Lévis	138	42 175	14	4 687	148	53,2	46 862	50,2
Total	**251**	**81 530**	**32**	**11 790**	**278**	**100,0**	**93 320**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 335,7 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CISSS de Chaudière-Appalaches, représentant un budget de 8 230 554 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS de Chaudière-Appalaches, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**63**	**22,7**	**12 210**	**13,1**
Cytopénies immunes	*59*	*21,2*	*11 570*	*12,4*
Anémie hémolytique auto-immune	1	0,4	20	0,0
Cytopénie immune	3	1,1	450	0,5
Maladie hémolytique du nouveau-né	6	2,2	25	0,0
Syndrome hémophagocytaire	1	0,4	25	0,0
Thrombopénie allo-immune foetale/néonatale	1	0,4	100	0,1
Thrombopénie immune (PTI)	15	5,4	4 070	4,4
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	32	11,5	6 880	7,4
Allogreffe de cellules souches	4	1,4	640	0,7
Immunologie	**103**	**37,1**	**31 618**	**33,9**
Déficiences immunitaires primaires	*32*	*11,5*	*11 154*	*12,0*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	31	11,2	11 039	11,8
Maladies de la dysrégulation immunitaire	1	0,4	115	0,1
Déficiences immunitaires secondaires	*69*	*24,8*	*19 674*	*21,1*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	69	24,8	19 674	21,1
Syndrome de fuite capillaire	2	0,7	790	0,8
Neurologie	**94**	**33,8**	**45 357**	**48,6**
Encéphalites	*6*	*2,2*	*870*	*0,9*
Encéphalite auto-immune	5	1,8	720	0,8
Encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM)	1	0,4	150	0,2
Myasthénies	*17*	*6,1*	*3 950*	*4,2*
Myasthénie grave	17	6,1	3 950	4,2
Myosites	*13*	*4,7*	*10 407*	*11,2*
Dermatomyosite	10	3,6	9 275	9,9
Myopathie auto-immune nécrosante	2	0,7	942	1,0
Myosite inflammatoire	1	0,4	190	0,2
Neuropathies	*33*	*11,9*	*25 390*	*27,2*
Neuropathie motrice multifocale	7	2,5	4 075	4,4
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	26	9,4	21 315	22,8
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	21	7,6	2 745	2,9
Syndrome neurologique paranéoplasique (SNP)	1	0,4	50	0,1
Autre - neurologie non précisée	4	1,4	1 945	2,1

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS de Chaudière-Appalaches, 2023-2024 (suite)

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Infectiologie	**8**	**2,9**	**950**	**1,0**
Syndrome du choc toxique	5	1,8	790	0,8
Autre - infectiologie non précisée	3	1,1	160	0,2
Dermatologie	**4**	**1,4**	**2 235**	**2,4**
Scléromyxœdème	1	0,4	1 690	1,8
Xanthogranulome nécrobiotique	2	0,7	255	0,3
Autre - dermatologie non précisée	1	0,4	290	0,3
Rhumatologie	**6**	**2,2**	**950**	**1,0**
Maladie de Kawasaki	3	1,1	270	0,3
Syndrome de Susac	1	0,4	200	0,2
Syndrome des antiphospholipides	1	0,4	150	0,2
Vasculopathie livédoïde	1	0,4	330	0,4
Total	**278**	**100,0**	**93 320**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R13 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LAVAL

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CISSS de Laval, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	1	1,3	1	1,2	2	1,3
Enfants (29 jours à 17 ans)	3	4,0	3	3,6	6	3,8
Adultes (18 à 64 ans)	35	46,7	38	45,2	73	45,9
Aînés (≥ 65 ans)	36	48,0	42	50,0	78	49,1
0-4	2	2,7	1	1,2	3	1,9
5-9	1	1,3	2	2,4	3	1,9
10-14	-	-	1	1,2	1	0,6
15-19	1	1,3	2	2,4	3	1,9
20-24	1	1,3	1	1,2	2	1,3
25-29	2	2,7	2	2,4	4	2,5
30-34	5	6,7	3	3,6	8	5,0
35-39	3	4,0	3	3,6	6	3,8
40-44	4	5,3	3	3,6	7	4,4
45-49	2	2,7	6	7,1	8	5,0
50-54	5	6,7	3	3,6	8	5,0
55-59	5	6,7	7	8,3	12	7,5
60-64	8	10,7	8	9,5	16	10,1
65-69	11	14,7	11	13,1	22	13,8
70-74	8	10,7	17	20,2	25	15,7
75-79	7	9,3	5	6,0	12	7,5
80-84	5	6,7	6	7,1	11	6,9
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**75**	**100,0**	**84**	**100,0**	**159**	**100,0**
Âge moyen	58,6		58,8		58,7	
Écart-type	21,4		20,7		20,9	
Étendue	0 - 94,3		0 - 97,5		0 - 97,5	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CISSS de Laval, 2023-2024

Installation – CISSS de Laval	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital de la Cité-de-la-Santé	126	46 388	33	11 634	159	100,0	58 022	100,0
Total	**126**	**46 388**	**33**	**11 634**	**159**	**100,0**	**58 022**	**100,0**

Note : Un usager pourrait avoir reçu des Ig par les deux voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 364,9 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CISSS de Laval, représentant un budget de 5 087 935 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS de Laval, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**23**	**14,5**	**2 770**	**4,8**
Cytopénies immunes	*19*	*11,9*	*1 970*	*3,4*
Thrombopénie immune (PTI)	2	1,3	90	0,2
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	17	10,7	1 880	3,2
Allogreffe de cellules souches	1	0,6	240	0,4
Autre - hématologie non précisée	3	1,9	560	1,0
Immunologie	**75**	**47,2**	**20 358**	**35,1**
Déficiences immunitaires primaires	*33*	*20,8*	*9 904*	*17,1*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	33	20,8	9 904	17,1
Déficiences immunitaires secondaires	*37*	*23,3*	*8 194*	*14,1*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	37	23,3	8 194	14,1
Autre - immunologie non précisée	7	4,4	2 260	3,9
Neurologie	**59**	**37,1**	**34 582**	**59,6**
Encéphalites	*1*	*0,6*	*148*	*0,3*
Encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM)	1	0,6	148	0,3
Myasthénies	*11*	*6,9*	*8 150*	*14,0*
Myasthénie grave	11	6,9	8 150	14,0
Myosites	*11*	*6,9*	*8 640*	*14,9*
Dermatomyosite	11	6,9	8 640	14,9
Neuropathies	*21*	*13,2*	*15 299*	*26,4*
Neuropathie motrice multifocale	3	1,9	1 658	2,9
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	18	11,3	13 642	23,5
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	11	6,9	1 830	3,2
Autre - neurologie non précisée	4	2,5	515	0,9
Infectiologie	**2**	**1,3**	**265**	**0,5**
Syndrome du choc toxique	2	1,3	265	0,5
Rhumatologie	**2**	**1,3**	**48**	**0,1**
Maladie de Kawasaki	2	1,3	48	0,1
Total	**159**	**100,0**	**58 022**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R14 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CISSS de Lanaudière, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	13	8,8	6	4,5	19	6,8
Adultes (18 à 64 ans)	58	39,5	66	49,6	124	44,3
Aînés (≥ 65 ans)	76	51,7	61	45,9	137	48,9
0-4	4	2,7	1	0,8	5	1,8
5-9	6	4,1	1	0,8	7	2,5
10-14	2	1,4	3	2,3	5	1,8
15-19	2	1,4	1	0,8	3	1,1
20-24	3	2,0	4	3,0	7	2,5
25-29	3	2,0	4	3,0	7	2,5
30-34	2	1,4	4	3,0	6	2,1
35-39	6	4,1	4	3,0	10	3,6
40-44	4	2,7	3	2,3	7	2,5
45-49	5	3,4	3	2,3	8	2,9
50-54	11	7,5	10	7,5	21	7,5
55-59	11	7,5	17	12,8	28	10,0
60-64	12	8,2	17	12,8	29	10,4
65-69	15	10,2	15	11,3	30	10,7
70-74	21	14,3	22	16,5	43	15,4
75-79	14	9,5	14	10,5	28	10,0
80-84	12	8,2	4	3,0	16	5,7
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**147**	**100,0**	**133**	**100,0**	**280**	**100,0**
Âge moyen	59,7		59,5		59,6	
Écart-type	23,2		19,0		21,3	
Étendue	1,33 - 99,5		4,12 - 92,2		1,33 - 99,5	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CISSS de Lanaudière, 2023-2024

Installations – CISSS de Lanaudière	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Centre hospitalier régional de Lanaudière	90	45 463	36	12 474	125	44,6	57 937	48,5
Hôpital Pierre-Le Gardeur	118	50 000	40	11 576	155	55,4	61 576	51,5
Total	**208**	**95 463**	**76**	**24 050**	**280**	**100,0**	**119 513**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 426,8 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CISSS de Lanaudière, représentant un budget de 10 479 522 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS de Lanaudière, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**45**	**16,1**	**10 240**	**8,6**
Cytopénies immunes	*42*	*15,0*	*9 460*	*7,9*
Thrombopénie allo-immune foetale/néonatale	1	0,4	540	0,5
Thrombopénie immune (PTI)	3	1,1	515	0,4
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	39	13,9	8 405	7,0
Autre - hématologie non précisée	3	1,1	780	0,7
Immunologie	**132**	**47,1**	**47 621**	**39,8**
Déficiences immunitaires primaires	*64*	*22,9*	*23 324*	*19,5*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	64	22,9	23 324	19,5
Déficiences immunitaires secondaires	*68*	*24,3*	*24 177*	*20,2*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	65	23,2	23 007	19,3
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	1	0,4	390	0,3
Hypogammaglobulinémie secondaire aux anti-lymphocytes B / immunosuppresseurs / médicaments	1	0,4	420	0,4
Hypogammaglobulinémie secondaire aux CAR-T	1	0,4	360	0,3
Autre - immunologie non précisée	1	0,4	120	0,1
Neurologie	**79**	**28,2**	**50 794**	**42,5**
Encéphalites	*1*	*0,4*	*150*	*0,1*
Encéphalite auto-immune	1	0,4	150	0,1
Myasthénies	*9*	*3,2*	*2 529*	*2,1*
Myasthénie grave	9	3,2	2 529	2,1
Myosites	*11*	*3,9*	*6 895*	*5,8*
Dermatomyosite	4	1,4	1 915	1,6
Myopathie auto-immune nécrosante	2	0,7	870	0,7
Myosite à corps d'inclusion	1	0,4	755	0,6
Myosite inflammatoire	5	1,8	3 355	2,8
Neuropathies	*39*	*13,9*	*37 475*	*31,4*
Neuropathie motrice multifocale	4	1,4	3 020	2,5
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	37	13,2	34 455	28,8
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	19	6,8	2 575	2,2
Autre - neurologie non précisée	3	1,1	1 170	1,0

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS de Lanaudière, 2023-2024 (suite)

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Infectiologie	**15**	**5,4**	**1 810**	**1,5**
Fasciite nécrosante	1	0,4	65	0,1
Syndrome du choc toxique	14	5,0	1 745	1,5
Dermatologie	**5**	**1,8**	**7 420**	**6,2**
Pemphigus	2	0,7	4 020	3,4
Scléroedème	1	0,4	2 160	1,8
Xanthogranulome nécrobiotique	2	0,7	1 240	1,0
Rhumatologie	**9**	**3,2**	**1 628**	**1,4**
Fasciite éosinophilique	1	0,4	600	0,5
Maladie de Kawasaki	6	2,1	228	0,2
Syndrome de Susac	1	0,4	110	0,1
Vasculopathie livédoïde	1	0,4	690	0,6
Total	**280**	**100,0**	**119 513**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R15 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CISSS des Laurentides, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	1	0,7	-	-	1	0,4
Enfants (29 jours à 17 ans)	12	8,6	12	8,3	24	8,5
Adultes (18 à 64 ans)	62	44,6	64	44,1	126	44,4
Aînés (≥ 65 ans)	64	46,0	69	47,6	133	46,8
0-4	6	4,3	4	2,8	10	3,5
5-9	2	1,4	3	2,1	5	1,8
10-14	2	1,4	-	-	2	0,7
15-19	5	3,6	5	3,4	10	3,5
20-24	-	-	5	3,4	5	1,8
25-29	5	3,6	4	2,8	9	3,2
30-34	2	1,4	2	1,4	4	1,4
35-39	1	0,7	5	3,4	6	2,1
40-44	6	4,3	6	4,1	12	4,2
45-49	8	5,8	12	8,3	20	7,0
50-54	7	5,0	8	5,5	15	5,3
55-59	11	7,9	9	6,2	20	7,0
60-64	20	14,4	13	9,0	33	11,6
65-69	15	10,8	23	15,9	38	13,4
70-74	15	10,8	25	17,2	40	14,1
75-79	18	12,9	9	6,2	27	9,5
80-84	11	7,9	10	6,9	21	7,4
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**139**	**100,0**	**145**	**100,0**	**284**	**100,0**
Âge moyen	58,3		56,8		57,6	
Écart-type	22,1		20,7		21,4	
Étendue	0 - 90		3,15 - 86,2		0 - 90	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CISSS des Laurentides, 2023-2024

Installations – CISSS des Laurentides	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Centre de services de Rivière-Rouge	4	1 740	2	624	6	2,1	2 364	2,2
CMSSS d'Argenteuil	7	1 935	3	730	10	3,5	2 665	2,5
Hôpital de Mont-Laurier	10	8 345	4	1 632	14	4,9	9 977	9,4
Hôpital de Saint-Eustache	54	19 380	15	3 908	67	23,6	23 288	22,0
Hôpital Laurentien	37	14 460	8	2 592	45	15,8	17 052	16,1
Hôpital régional de Saint-Jérôme	117	40 260	27	10 200	142	50,0	50 460	47,7
Total	**229**	**86 120**	**59**	**19 686**	**284**	**100,0**	**105 806**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 372,6 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CISSS des Laurentides, représentant un budget de 9 288 627 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS des Laurentides, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**35**	**12,3**	**8 515**	**8,0**
Cytopénies immunes	*32*	*11,3*	*8 420*	*8,0*
Purpura post-transfusionnel	1	0,4	160	0,2
Thrombopénie allo-immune foetale/néonatale	1	0,4	1 400	1,3
Thrombopénie immune (PTI)	6	2,1	615	0,6
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	27	9,5	6 245	5,9
Allogreffe de cellules souches	1	0,4	20	0,0
Autre - hématologie non précisée	2	0,7	75	0,1
Immunologie	**136**	**47,9**	**38 612**	**36,5**
Déficiences immunitaires primaires	*68*	*23,9*	*19 837*	*18,7*
Déficit immunitaire commun variable	5	1,8	2 056	1,9
Déficit immunitaire primaire (DIP)	63	22,2	17 781	16,8
Déficiences immunitaires secondaires	*65*	*22,9*	*15 629*	*14,8*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	62	21,8	14 701	13,9
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	7	2,5	928	0,9
Déficience en Ig non précisée	12	4,2	2 086	2,0
Autre - immunologie non précisée	5	1,8	1 060	1,0
Neurologie	**104**	**36,6**	**54 365**	**51,4**
Encéphalites	*5*	*1,8*	*2 345*	*2,2*
Encéphalite	1	0,4	315	0,3
Encéphalite auto-immune	4	1,4	2 030	1,9
Myasthénies	*28*	*9,9*	*14 385*	*13,6*
Myasthénie grave	28	9,9	14 385	13,6
Myosites	*11*	*3,9*	*6 065*	*5,7*
Dermatomyosite	4	1,4	2 385	2,3
Myopathie auto-immune nécrosante	2	0,7	900	0,9
Myosite à corps d'inclusion	1	0,4	125	0,1
Myosite auto-immune	2	0,7	450	0,4
Myosite inflammatoire	4	1,4	1 605	1,5
Polymyosite	1	0,4	600	0,6
Neuropathies	*41*	*14,4*	*26 600*	*25,1*
Neuropathie motrice multifocale	6	2,1	3 965	3,7
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	36	12,7	22 635	21,4
Encéphalopathie	1	0,4	100	0,1
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	19	6,7	2 030	1,9
Syndrome de la personne raide	1	0,4	2 480	2,3
Syndrome neurologique paranéoplasique (SNP)	1	0,4	115	0,1
Autre - neurologie non précisée	2	0,7	245	0,2

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS des Laurentides, 2023-2024 (suite)

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Infectiologie	**10**	**3,5**	**910**	**0,9**
Entérocolite à *Clostridioides difficile*	1	0,4	10	0,0
Fasciite nécrosante	2	0,7	190	0,2
Prophylaxie infectieuse	1	0,4	40	0,0
Syndrome du choc toxique	6	2,1	640	0,6
Autre - infectiologie non précisée	1	0,4	30	0,0
Dermatologie	**3**	**1,1**	**2 385**	**2,3**
Pemphigoïdes	2	0,7	2 220	2,1
Autre - dermatologie non précisée	1	0,4	165	0,2
Rhumatologie	**5**	**1,8**	**410**	**0,4**
Maladie de Kawasaki	3	1,1	110	0,1
Syndrome des antiphospholipides	1	0,4	20	0,0
Vasculite leucocytoclasique	1	0,4	280	0,3
Autres indications	**3**	**1,1**	**609**	**0,6**
Transplantation d'organes solides	*1*	*0,4*	*384*	*0,4*
Prévention d'un rejet de greffe	1	0,4	384	0,4
Autre - non précisé	2	0,7	225	0,2
Total	**284**	**100,0**	**105 806**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R16-1 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CISSS de la Montérégie-Centre, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	10	5,3	12	5,6	22	5,5
Adultes (18 à 64 ans)	73	38,6	101	47,4	174	43,3
Aînés (≥ 65 ans)	106	56,1	100	46,9	206	51,2
0-4	1	0,5	3	1,4	4	1,0
5-9	1	0,5	4	1,9	5	1,2
10-14	5	2,6	3	1,4	8	2,0
15-19	4	2,1	3	1,4	7	1,7
20-24	5	2,6	3	1,4	8	2,0
25-29	5	2,6	7	3,3	12	3,0
30-34	4	2,1	6	2,8	10	2,5
35-39	3	1,6	8	3,8	11	2,7
40-44	10	5,3	14	6,6	24	6,0
45-49	9	4,8	12	5,6	21	5,2
50-54	7	3,7	15	7,0	22	5,5
55-59	12	6,3	16	7,5	28	7,0
60-64	17	9,0	19	8,9	36	9,0
65-69	27	14,3	31	14,6	58	14,4
70-74	23	12,2	21	9,9	44	10,9
75-79	40	21,2	29	13,6	69	17,2
80-84	10	5,3	11	5,2	21	5,2
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**189**	**100,0**	**213**	**100,0**	**402**	**100,0**
Âge moyen	61,2		58,4		59,7	
Écart-type	19,8		20,0		19,9	
Étendue	1,77 - 87,8		0,98 - 93,1		0,98 - 93,1	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CISSS de la Montérégie-Centre, 2023-2024

Installations – CISSS de la Montérégie-Centre	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital Charles-Le Moyne	220	110 190	57	25 409	273	67,9	135 599	73,6
Hôpital du Haut-Richelieu	88	32 775	48	15 892	129	32,1	48 667	26,4
Total	**308**	**142 965**	**105**	**41 301**	**402**	**100,0**	**184 266**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 458,4 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CISSS de la Montérégie-Centre, représentant un budget de 16 128 644 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS de la Montérégie-Centre, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**48**	**11,9**	**7 405**	**4,0**
Cytopénies immunes	*47*	*11,7*	*7 335*	*4,0*
Thrombopénie immune (PTI)	8	2,0	430	0,2
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	43	10,7	6 510	3,5
Thrombopénie/thrombocytopénie	5	1,2	395	0,2
Anémie	1	0,2	35	0,0
Inhibiteurs de la coagulation	1	0,2	35	0,0
Immunologie	**172**	**42,8**	**46 602**	**25,3**
Déficiences immunitaires primaires	*90*	*22,4*	*24 982*	*13,6*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	90	22,4	24 982	13,6
Déficiences immunitaires secondaires	*104*	*25,9*	*21 560*	*11,7*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	104	25,9	21 560	11,7
Déficience en Ig non précisée	1	0,2	30	0,0
Autre - immunologie non précisée	1	0,2	30	0,0
Neurologie	**165**	**41,0**	**122 936**	**66,7**
Encéphalites	*4*	*1,0*	*705*	*0,4*
Encéphalite	1	0,2	20	0,0
Encéphalite auto-immune	4	1,0	685	0,4
Myasthénies	*37*	*9,2*	*20 890*	*11,3*
Myasthénie grave	36	9,0	20 795	11,3
Syndrome myasthénique de Lambert-Eaton	1	0,2	95	0,1
Myélites	*2*	*0,5*	*270*	*0,1*
Myélite	2	0,5	270	0,1
Myosites	*19*	*4,7*	*8 615*	*4,7*
Dermatomyosite	7	1,7	1 115	0,6
Myopathie auto-immune nécrosante	4	1,0	3 220	1,7
Myosite inflammatoire	10	2,5	3 485	1,9
Polymyosite	4	1,0	795	0,4
Neuropathies	*89*	*22,1*	*83 091*	*45,1*
Neuropathie motrice multifocale	14	3,5	15 960	8,7
Neuropathie paranéoplasique	2	0,5	250	0,1
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	77	19,2	66 821	36,3
Polyradiculopathie	1	0,2	60	0,0

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS de la Montérégie-Centre, 2023-2024 (suite)

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Neurologie (suite)				
Ataxie auto-immune	2	0,5	1 825	1,0
Maladie des anticorps anti-glycoprotéine myélinique oligodendrocytaire	3	0,7	2 155	1,2
Syndrome cordonal postérieur	1	0,2	300	0,2
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	19	4,7	3 725	2,0
Syndrome de la personne raide	1	0,2	1 260	0,7
Autre - neurologie non précisée	1	0,2	100	0,1
Infectiologie	**14**	**3,5**	**1 645**	**0,9**
Syndrome du choc toxique	11	2,7	1 370	0,7
Syndrome inflammatoire multisystémique chez l'adulte (MIS-A)	1	0,2	40	0,0
Autre - infectiologie non précisée	3	0,7	235	0,1
Dermatologie	**1**	**0,2**	**590**	**0,3**
Pemphigoïdes	1	0,2	420	0,2
Pemphigus	1	0,2	170	0,1
Rhumatologie	**13**	**3,2**	**3 585**	**1,9**
Granulomatose éosinophilique avec polyangéite	1	0,2	975	0,5
Maladie de Kawasaki	7	1,7	435	0,2
Sclérodermie	3	0,7	500	0,3
Syndrome de Sjögren	2	0,5	275	0,1
Uvéite	1	0,2	1 400	0,8
Autres indications	**22**	**5,5**	**1 503**	**0,8**
Transplantation d'organes solides	*1*	*0,2*	*85*	*0,0*
Traitement d'un rejet de greffe	1	0,2	85	0,0
Autre - non précisé	21	5,2	1 418	0,8
Total	**402**	**100,0**	**184 266**	**100,0**

Note : Un usager pourrait avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, le nombre total d'usagers et les nombres d'usagers par spécialité pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R16-2 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CISSS de la Montérégie-Est, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	8	6,5	10	6,0	18	6,2
Adultes (18 à 64 ans)	53	42,7	79	47,0	132	45,2
Aînés (≥ 65 ans)	63	50,8	79	47,0	142	48,6
0-4	2	1,6	1	0,6	3	1,0
5-9	3	2,4	3	1,8	6	2,1
10-14	1	0,8	4	2,4	5	1,7
15-19	3	2,4	2	1,2	5	1,7
20-24	1	0,8	1	0,6	2	0,7
25-29	3	2,4	5	3,0	8	2,7
30-34	4	3,2	4	2,4	8	2,7
35-39	4	3,2	5	3,0	9	3,1
40-44	9	7,3	4	2,4	13	4,5
45-49	5	4,0	10	6,0	15	5,1
50-54	2	1,6	10	6,0	12	4,1
55-59	8	6,5	12	7,1	20	6,8
60-64	16	12,9	28	16,7	44	15,1
65-69	15	12,1	19	11,3	34	11,6
70-74	18	14,5	20	11,9	38	13,0
75-79	15	12,1	21	12,5	36	12,3
80-84	12	9,7	10	6,0	22	7,5
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**124**	**100,0**	**168**	**100,0**	**292**	**100,0**
Âge moyen	59,7		60,6		60,2	
Écart-type	20,9		19,3		20,0	
Étendue	1,63 - 91,5		1,3 - 93,1		1,3 - 93,1	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CISSS de la Montérégie-Est, 2023-2024

Installations – CISSS de la Montérégie-Est	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital Honoré-Mercier	112	41 523	37	10 073	147	50,3	51 596	51,9
Hôpital Pierre-Boucher	85	25 605	23	6 557	105	36,0	32 162	32,4
Hôtel-Dieu de Sorel	29	12 258	12	3 402	40	13,7	15 660	15,8
Total	**226**	**79 385**	**72**	**20 032**	**292**	**100,0**	**99 417**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 340,5 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CISSS de la Montérégie-Est, représentant un budget de 8 717 259 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS de la Montérégie-Est, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**58**	**19,9**	**17 149**	**17,2**
Cytopénies immunes	*56*	*19,2*	*16 893*	*17,0*
Thrombopénie immune (PTI)	9	3,1	1 093	1,1
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	51	17,5	14 830	14,9
Thrombopénie/thrombocytopénie	12	4,1	970	1,0
Allogreffe de cellules souches	2	0,7	256	0,3
Immunologie	**133**	**45,5**	**39 863**	**40,1**
Déficiences immunitaires primaires	*93*	*31,8*	*28 554*	*28,7*
Déficit immunitaire commun variable	2	0,7	331	0,3
Déficit immunitaire primaire (DIP)	91	31,2	28 223	28,4
Déficiences immunitaires secondaires	*42*	*14,4*	*10 082*	*10,1*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	41	14,0	9 516	9,6
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	1	0,3	104	0,1
Hypogammaglobulinémie secondaire aux CAR-T	1	0,3	462	0,5
Déficience en Ig non précisée	9	3,1	1 227	1,2
Neurologie	**90**	**30,8**	**38 620**	**38,8**
Encéphalites	*4*	*1,4*	*1 260*	*1,3*
Encéphalite	1	0,3	135	0,1
Encéphalite auto-immune	3	1,0	1 125	1,1
Myasthénies	*23*	*7,9*	*5 540*	*5,6*
Myasthénie grave	23	7,9	5 540	5,6
Myélites	*1*	*0,3*	*35*	*0,0*
Myélite	1	0,3	35	0,0
Myosites	*15*	*5,1*	*9 820*	*9,9*
Dermatomyosite	5	1,7	3 740	3,8
Myopathie auto-immune nécrosante	6	2,1	2 790	2,8
Myosite auto-immune	3	1,0	955	1,0
Polymyosite	2	0,7	2 335	2,3
Neuropathies	*32*	*11,0*	*18 330*	*18,4*
Neuropathie motrice multifocale	6	2,1	5 240	5,3
Neuropathie/polyneuropathie	2	0,7	210	0,2
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	27	9,2	12 820	12,9
Polynévrite	1	0,3	60	0,1

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS de la Montérégie-Est, 2023-2024 (suite)

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Neurologie (suite)				
Ataxie auto-immune	1	0,3	355	0,4
Maladie des anticorps anti-glycoprotéine myélinique oligodendrocytaire	1	0,3	35	0,0
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	17	5,8	2 660	2,7
Syndrome de la personne raide	2	0,7	585	0,6
Infectiologie	**13**	**4,5**	**1 495**	**1,5**
Fasciite nécrosante	1	0,3	75	0,1
Prophylaxie infectieuse	1	0,3	192	0,2
Rougeole – post exposition	1	0,3	38	0,0
Syndrome du choc toxique	10	3,4	1 190	1,2
Rhumatologie	**4**	**1,4**	**920**	**0,9**
Maladie de Kawasaki	1	0,3	25	0,0
Syndrome de Sjögren	1	0,3	40	0,0
Syndrome de Susac	2	0,7	855	0,9
Autres indications	**8**	**2,7**	**1 371**	**1,4**
Autre - non précisé	8	2,7	1 371	1,4
Total	**292**	**100,0**	**99 417**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R16-3 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – CISSS de la Montérégie-Ouest, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	1	1,2	1	0,5
Enfants (29 jours à 17 ans)	6	5,9	1	1,2	7	3,8
Adultes (18 à 64 ans)	37	36,3	36	43,4	73	39,5
Aînés (≥ 65 ans)	59	57,8	45	54,2	104	56,2
0-4	1	1,0	1	1,2	2	1,1
5-9	2	2,0	-	-	2	1,1
10-14	1	1,0	1	1,2	2	1,1
15-19	2	2,0	-	-	2	1,1
20-24	1	1,0	3	3,6	4	2,2
25-29	2	2,0	1	1,2	3	1,6
30-34	3	2,9	3	3,6	6	3,2
35-39	1	1,0	5	6,0	6	3,2
40-44	8	7,8	1	1,2	9	4,9
45-49	5	4,9	2	2,4	7	3,8
50-54	2	2,0	3	3,6	5	2,7
55-59	8	7,8	9	10,8	17	9,2
60-64	7	6,9	9	10,8	16	8,6
65-69	10	9,8	8	9,6	18	9,7
70-74	19	18,6	11	13,3	30	16,2
75-79	12	11,8	9	10,8	21	11,4
80-84	12	11,8	12	14,5	24	13,0
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**102**	**100,0**	**83**	**100,0**	**185**	**100,0**
Âge moyen	62,1		63,1		62,5	
Écart-type	20,3		19,4		19,8	
Étendue	2,48 - 90,8		0,01 - 95		0,01 - 95	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – CISSS de la Montérégie-Ouest, 2023-2024

Installations – CISSS de la Montérégie-Ouest	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital Anna-Laberge	101	33 120	18	4 619	119	64,3	37 739	59,5
Hôpital Barrie Memorial	5	895	1	1 920	6	3,2	2 815	4,4
Hôpital du Suroît	48	18 845	13	3 980	60	32,4	22 825	36,0
Total	**154**	**52 860**	**32**	**10 519**	**185**	**100,0**	**63 379**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 342,6 grammes d'Ig par usager ont été administrés au CISSS de la Montérégie-Ouest, représentant un budget de 5 572 689 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS de la Montérégie-Ouest, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**35**	**18,9**	**4 077**	**6,4**
Cytopénies immunes	*33*	*17,8*	*3 925*	*6,2*
Thrombopénie allo-immune foetale/néonatale	2	1,1	65	0,1
Thrombopénie immune (PTI)	3	1,6	610	1,0
Thrombopénie immune (PTI) aiguë	27	14,6	2 965	4,7
Thrombopénie/thrombocytopénie	3	1,6	285	0,4
Allogreffe de cellules souches	1	0,5	40	0,1
Inhibiteurs de la coagulation	1	0,5	112	0,2
Immunologie	**57**	**30,8**	**15 666**	**24,7**
Déficiences immunitaires primaires	*32*	*17,3*	*9 276*	*14,6*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	32	17,3	9 276	14,6
Déficiences immunitaires secondaires	*26*	*14,1*	*5 487*	*8,7*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	25	13,5	4 900	7,7
Hypogammaglobulinémie secondaire à un cancer hématologique	3	1,6	587	0,9
Déficience en Ig non précisée	2	1,1	846	1,3
Autre - immunologie non précisée	2	1,1	57	0,1
Neurologie	**71**	**38,4**	**40 335**	**63,6**
Encéphalites	*2*	*1,1*	*790*	*1,2*
Encéphalite auto-immune	2	1,1	790	1,2
Myasthénies	*26*	*14,1*	*12 760*	*20,1*
Myasthénie grave	26	14,1	12 760	20,1
Myélites	*1*	*0,5*	*240*	*0,4*
Neuromyélite optique (NMO)	1	0,5	240	0,4
Myosites	*7*	*3,8*	*3 335*	*5,3*
Dermatomyosite	1	0,5	1 425	2,2
Myopathie auto-immune nécrosante	4	2,2	1 645	2,6
Myosite inflammatoire	3	1,6	265	0,4
Neuropathies	*27*	*14,6*	*20 825*	*32,9*
Neuropathie motrice multifocale	2	1,1	1 520	2,4
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)	26	14,1	19 305	30,5
Syndrome de Guillain-Barré (ou variantes)	11	5,9	2 265	3,6
Syndrome neurologique paranéoplasique (SNP)	1	0,5	45	0,1
Autre - neurologie non précisée	1	0,5	75	0,1
Infectiologie	**19**	**10,3**	**2 370**	**3,7**
Syndrome du choc toxique	19	10,3	2 370	3,7

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – CISSS de la Montérégie-Ouest, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Rhumatologie	**1**	**0,5**	**25**	**0,0**
Maladie de Kawasaki	1	0,5	25	0,0
Autres indications	**11**	**5,9**	**906**	**1,4**
Obstétrique/Fertilité	*1*	*0,5*	*50*	*0,1*
Grossesse/naissance	1	0,5	50	0,1
Autre - non précisé	10	5,4	856	1,4
Total	**185**	**100,0**	**63 379**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R17 CENTRE DE SANTÉ INUULITSIVIK

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – Centre de santé Inuulitsivik, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	1	100,0	2	100,0	3	100,0
Adultes (18 à 64 ans)	-	-	-	-	-	-
Aînés (≥ 65 ans)	-	-	-	-	-	-
0-4	-	-	1	50,0	1	33,3
5-9	-	-	1	50,0	1	33,3
10-14	1	100,0	-	-	1	33,3
15-19	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**1**	**100,0**	**2**	**100,0**	**3**	**100,0**
Âge moyen	12,6		6,5		8,5	
Écart-type	-		3,4		4,3	
Étendue	12,62 - 12,6		4,07 - 8,9		4,07 - 12,6	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – Centre de santé Inuulitsivik, 2023-2024

Installation – Centre de santé Inuulitsivik	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Centre de santé Inuulitsivik	1	40	2	132	3	100,0	172	100,0
Total	**1**	**40**	**2**	**132**	**3**	**100,0**	**172**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 57,3 grammes d'Ig par usager ont été administrés au Centre de santé Inuulitsivik, représentant un budget de 14 417 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – Centre de santé Inuulitsivik, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Immunologie	**2**	**66,7**	**72**	**41,9**
Déficiences immunitaires primaires	*2*	*66,7*	*52*	*30,2*
Déficit immunitaire primaire (DIP)	2	66,7	52	30,2
Déficiences immunitaires secondaires	*1*	*33,3*	*20*	*11,6*
Déficit immunitaire secondaire (DIS)	1	33,3	20	11,6
Autres indications	**2**	**66,7**	**100**	**58,1**
Autre - non précisé	2	66,7	100	58,1
Total	**3**	**100,0**	**172**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R17 CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – Centre de santé Tulattavik, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	-	-	-	-	-	-
Adultes (18 à 64 ans)	1	100,0	-	-	1	100,0
Aînés (≥ 65 ans)	-	-	-	-	-	-
0-4	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100,0	-	-	1	100,0
55-59	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**1**	**100,0**	**-**	**100,0**	**1**	**100,0**
Âge moyen	52,6		-		52,6	
Écart-type	-		-		-	
Étendue	52,58 - 52,6		-		52,58 - 52,6	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – Centre de santé Tulattavik, 2023-2024

Installation – Centre de santé Tulattavik	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Centre de santé Tulattavik	-	-	1	340	1	100,0	340	100,0
Total	**0**	**0**	**1**	**340**	**1**	**100,0**	**340**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig par différentes voies d'administration (IV et SC). Ainsi, le nombre total d'usagers pourrait ne pas égaler la somme des deux méthodes.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 340,0 grammes d'Ig par usager ont été administrés au Centre de santé Tulattavik, représentant un budget de 27 958 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – Centre de santé Tulattavik, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Neurologie	1	100,0	340	100,0
Autre - neurologie non précisée	1	100,0	340	100,0
Total	**1**	**100,0**	**340**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

R18 CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE JAMES

Description des usagers

Tableau 1 Usagers ayant reçu des immunoglobulines, selon le sexe et l'âge – Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, 2023-2024

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nouveau-nés (0 à 28 jours)	-	-	-	-	-	-
Enfants (29 jours à 17 ans)	1	33,3	-	-	1	33,3
Adultes (18 à 64 ans)	2	66,7	-	-	2	66,7
Aînés (≥ 65 ans)	-	-	-	-	-	-
0-4	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-
10-14	1	33,3	-	-	1	33,3
15-19	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-
50-54	1	33,3	-	-	1	33,3
55-59	1	33,3	-	-	1	33,3
60-64	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-
≥ 85	-	-	-	-	-	-
Total	**3**	**100,0**	**-**	**100,0**	**3**	**100,0**
Âge moyen	41,5				41,5	
Écart-type	23,3				23,3	
Étendue	14,62 - 55,6				14,62 - 55,6	

Note : Âge de l'usager lors de sa première administration d'Ig de l'année à l'étude.
Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Quantité d'immunoglobulines administrées

Tableau 2 Usagers et quantité d'immunoglobulines par voie d'administration, selon l'installation – Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, 2023-2024

Installation – Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James	Voie intraveineuse		Voie sous-cutanée		Total			
	Usagers	IgIV	Usagers	IgSC	Usagers		Ig	
	n	g	n	g	n	%	g	%
Hôpital de Chisasibi	2	800	1	70	3	100,0	870	100,0
Total	**2**	**800**	**1**	**70**	**3**	**100,0**	**870**	**100,0**

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

Au cours de l'année 2023-2024, en moyenne 290,0 grammes d'Ig par usager ont été administrés au Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, représentant un budget de 77 004 $.

Spécialités médicales et indications

Tableau 3 Usagers et quantité d'immunoglobulines administrées, selon la spécialité médicale et l'indication – Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, 2023-2024

Indications	Usagers		Immunoglobulines	
	n	%	g	%
Hématologie	**1**	**33,3**	**24**	**2,8**
Inhibiteurs de la coagulation	1	33,3	24	2,8
Dermatologie	**1**	**33,3**	**60**	**6,9**
Autre - dermatologie non précisée	1	33,3	60	6,9
Autres indications	**3**	**100,0**	**786**	**90,3**
Autre - non précisé	3	100,0	786	90,3
Total	**3**	**100,0**	**870**	**100,0**

Note : Un usager peut avoir reçu des Ig pour une ou plusieurs indications. Ainsi, les nombres d'usagers par spécialité et le nombre total d'usagers pourraient ne pas égaler la somme des indications.

Source des données : eTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, en date du 28 mars 2025.

ANNEXE

Tableau A-1 Usagers, quantité d'immunoglobulines administrées, quantité moyenne par usager et coût total, par établissement, 2023-2024

Établissements	Moyenne Ig par usager	Usagers		Immunoglobulines		Coût Ig
	g	n	%	g	%	$
CISSS de l'Outaouais	781,5	248	3,8	193 824	8,6	17 179 466
CISSS de la Côte-Nord	560,8	45	0,7	25 237	1,1	2 241 071
CISSS de la Montérégie-Centre	458,4	402	6,1	184 266	8,2	16 128 644
CISSS de Lanaudière	426,8	280	4,2	119 513	5,3	10 479 522
CIUSSS de la Capitale-Nationale	421,6	14	0,2	5 903	0,3	509 206
CISSS du Bas-Saint-Laurent	385,5	180	2,7	69 387	3,1	6 114 649
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean	374,8	177	2,7	66 339	2,9	5 907 714
CISSS des Laurentides	372,6	284	4,3	105 806	4,7	9 288 627
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie James	365,8	5	0,1	1 829	0,1	154 531
CISSS de Laval	364,9	159	2,4	58 022	2,6	5 087 935
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	360,0	213	3,2	76 678	3,4	6 812 974
CISSS des Îles	353,8	26	0,4	9 200	0,4	816 005
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	346,9	280	4,2	97 132	4,3	8 560 406
CISSS de la Montérégie-Ouest	342,6	185	2,8	63 379	2,8	5 572 689
CISSS de la Montérégie-Est	340,5	292	4,4	99 417	4,4	8 717 259
Centre de santé Tulattavik	340,0	1	0,0	340	0,0	27 958
CIUSSS de l'Estrie–Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	337,2	485	7,3	163 550	7,3	14 246 438
CISSS de Chaudière-Appalaches	335,7	278	4,2	93 320	4,1	8 230 554
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	328,3	224	3,4	73 550	3,3	6 550 363
CISSS de la Gaspésie	327,7	52	0,8	17 042	0,8	1 506 897
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	321,3	109	1,7	35 025	1,6	3 083 093
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	319,1	87	1,3	27 764	1,2	2 391 733
Centre universitaire de santé McGill	316,1	655	9,9	207 016	9,2	18 184 036
CHU de Québec – Université Laval	303,1	707	10,7	214 279	9,5	18 706 859
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James	290,0	3	0,0	870	0,0	77 004
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	254,0	385	5,8	97 809	4,3	8 536 438
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	251,0	220	3,3	55 230	2,4	4 813 294
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	222,3	197	3,0	43 786	1,9	3 824 205
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval	196,6	38	0,6	7 471	0,3	665 258
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	115,2	347	5,3	39 986	1,8	3 510 512
Institut de cardiologie de Montréal	96,0	21	0,3	2 015	0,1	179 456
Centre de santé Inuulitsivik	57,3	3	0,0	172	0,0	14 417
Total	**341,6**	**6 602**	**100,0**	**2 255 153**	**100,0**	**198 119 215**

La ligne pointillée indique où se situe la moyenne d'Ig par usager au Québec.

Note : Le coût des Ig tient compte de la proportion d'Ig administrées par méthode : le coût des IgIV est de 89,06 $ par gramme et celui des IgSC est de 82,23 $ par gramme (MSSS, 2025).

Source des données : eeTrace Line. Extraction du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 en date du 28 mars 2025.

Nº de publication : 3881

Centre d'expertise et
de référence en santé publique

www.inspq.qc.ca

Institut national
de santé publique
Québec